

Done
10-11-11 #

Get by 4h

8932
31-8-54

5182



سلسلہ کتابت علیہ السلام علیہ السلام

نشان (۳۶۷)

مینڈلیٹ

MENDELISM

مصنف

آر۔ سی۔ پینٹ
ایف۔ آر۔ ایس

مترجم

ڈاکٹر محمد رحیم اللہ صاحب

ام۔ ایس۔ سی (عثمانیہ) ڈی۔ ایس۔ سی (مدرس)

ہستم سکلیات

۱۳۶۷ھ ۱۳۵۷ھ ۱۹۴۷ء
مطبوعہ

طبع علیہ السلام علیہ السلام




یہ کتاب مسرر سکیمین اینڈ کمپنی کی اجازت سے
اردو میں ترجمہ کر کے طبع و شایع
کی گئی ہے

تعداد طبع (۵۰۰)

طبع اول

591.3
پ 37 م





گریگور مینٹل

طبع، ہفتہ کا دیباچہ

(❖)

پچھلے چند سال کے عرصہ میں تناسلیات میں جو نہایت دلچسپ اور اہم ترقیاں ہوئی ہیں ان میں سے ایک قابل ذکر وہ ہے جس کا تعلق خنثی شکل کی ایسی چند جماعتوں سے ہے جن کو بین صنف سمجھتے ہیں۔ گولڈ شمرٹ اور دوسرے ماہرین کی تحقیقات نے نہ صرف ان مظاہر کے ایک پیچیدہ سلسلہ پر نئے طور پر روشنی ڈالی بلکہ ساتھ ہی ساتھ اُنھوں نے خلوی نحرزما یہ کے اُس ممکنہ اثر کی طرف بھی توجہ دلائی ہے جو وراثت پر ہوتا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہ مرکزہ کے اثر سے بالکل جدا گانہ ہے۔ چند ابواب کی نظر ثانی کرتے وقت میں نے ان ترقیوں کی نوعیت پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔

ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دینا ضروری ہے کہ نون جسدی نظریے کی بنیاد دنیا کے مختلف حصوں میں کئی مشاہدین کے کام کی وجہ سے زیادہ مستحکم ہو گئی ہے اور اب اس علم کے ماہرین اس کو عام طور پر تسلیم کرنے لگے ہیں۔

انواع کی نوعیت کے مسئلہ سے متعلق نون جسدوں کے مطالعہ پر فی زمانہ کافی توجہ دی جا رہی ہے اور امید ہے کہ عنقریب ہی غیر معمولی اور دلچسپ نتائج برآمد ہونگے۔ بہر حال یہ تحقیقات کا ایک ایسا شعبہ ہے جو ابھی تک ابتدائی حالت میں ہے اور حالیہ نتائج ایسے نہیں کہ

ان کو عام طور پر یکجا کر کے استعمال کیا جاسکے۔ اس کا امکان ہے کہ تھوڑے عرصہ میں ان کا تسلسل اس انکشاف سے قائم ہو سکے جو مینڈل نے کیا تھا۔

ایسی چھوٹی کتاب کی مسلسل نظر ثانی جیسی کہ یہ ہے کبھی مکمل نہیں ہو سکتی اور حالانکہ میں نے مجبوراً اس کی ضخامت میں کچھ اضافہ کیا ہے۔ لیکن پھر بھی میں امید کرتا ہوں کہ اس کوشش میں اصل اور نئی طبع میں کافی طور پر مطابقت قائم ہے۔

آخر میں مکرراً ان اصحاب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس سے قبل کی طبع کی اشکال کی تیاری میں مجھے مدد دی تھی۔

کیسبرج

۶ جون ۱۹۲۴ء

فہرست مضامین

(مینڈلیت)

پہلا باب

صفحہ

۱

مضمون

موضوع

دوسرا باب

۶

تاریخی پس منظر

تیسرا باب

۱۲

مینڈل کا کام

چوتھا باب

۲۲

نظریہ حاضر و غائب

پانچواں باب

۳۶

عوامل کا باہمی عمل

چھٹا باب

۵۰

بازگشت

ساتواں باب

۵۸

غلبیت

آٹھواں باب

۷۰

جنگلی اقسام اور پالتو انواع

نواں باب

۸۰

صنعتی رابطہ

دسواں باب

۹۵

صنف

گیارہواں باب

۱۰۶

صنف اور بین صنف

بارہواں باب

۱۲۰

رابطہ

تیرہواں باب

۱۳۸

لون جسدی نظریہ

چودہواں باب

۱۴۶

چند چمیدگیاں

پندرہواں باب

صفحہ

۱۶۰

مضمون
درمیانی صورتیں

سولہواں باب

۱۷۵

تغیر اور ارتقاء

سترہواں باب

۱۹۳

معاشرتی اہمیت

اٹھارہواں باب

۲۰۹

۲۲۳

۲۲۷

انسان
ضمیمہ
اشاریہ

توضیحات تختیاں

صفحہ
سرورق
صفحہ ۵۰ کے مقابل

" " ۵۳ "
" " ۶۸ "
" " ۷۰ "
" " ۸۰ "
" " ۸۶ "
" " ۱۶۱ "
" " ۱۸۴ "

تختی
گریگورینڈل

۱۔ خرگوش
۲۔ میٹھے مشر
۳۔ بھٹ مشر
۴۔ میٹھے مشر
۵۔ سیدبرائٹ بینیم
۶۔ تتلیاں
۷۔ مرغیاں
۸۔ تتلیاں

متن کی اشکال

فکل

۱۸

۱۔ سادہ مینڈلی مثال میں وراشت کا خاکہ

۲۵

۲۔ ریشمی اور سادہ مرغی کے پر

۲۶

۳۔ معمولی سادہ اور ڈھراپری مولا (سدا بہار)

۲۸

۴۔ مرغیوں کی کلغیاں

شکل

صفحہ

۳۱

۵۔ نقشہ جو مرغیوں کی کلغیوں کی وراثت کو ظاہر کرتا ہے

۳۳

۶۔ مرغیوں کی کلغیاں

۷۔ نقشہ جن نسل کا جو دو سفید میٹھے مٹروں کی باروری

۳۹

سے حاصل ہو

۴۳

۸۔ نقشہ جو چوہوں میں ۹: ۳: ۴ کی نسبت کو ظاہر کرتا ہے

۴۷

۹۔ پریمولا پھولوں کی تراشیں

۴۸

۱۰۔ نخرہ دار کلاں چشم پریمولا

۵۷

۱۱۔ نقشہ جو کبوتروں میں بازگشت کو ظاہر کرتا ہے

۱۲۔ پوری مولانا نمنس اور پیری مولانا شیدا

۵۹

کالا پ

۱۳۔ نقشہ جو غالب سفید اور مغلوب سفید کی باہمی باروری

۶۳

کو ظاہر کرتا ہے

۶۴

۱۴۔ روئیں دار اور بے روئیں دار گیہوں

۶۷

۱۵۔ مرغیوں کے پر

۶۹

۱۶۔ بھیسروں میں سینک کی وراثت ظاہر کرنے کے لیے خاک

۷۵

۱۷۔ کرٹن میٹھاٹر

۸۵

۱۸۔ ایویکس گراسیلٹا اور قسم لکٹی کالا

۱۹۔ ڈس سو فائیلہ اور مرغیوں میں صفی رابطے کے ظہار

۸۹

کے لیے خاک

۲۰۔ مرغیوں اور ڈس سو فائیلہ میں ۲ لٹ بھیس وراثت

۹۰

کو ظاہر کرنے کے لیے خاک

۲۱۔ سیاہ بے اور زرد مادہ کی باروری کے ظاہر کرنے کے

۹۱

لیے خاک

۹۲

۲۲۔ زرد بے اور سیاہ مادہ کی باروری کو ظاہر کرنے کے لیے خاک

صفحہ

شکل

۹۳

۲۳۔ رنگ تاشناس نبی سلسلہ

۹۷

۲۴۔ چروٹینو میں لون جسدوں کا خاکہ

۹۹

۲۵۔ ڈس و سو فائیلہ کے لون جسد

۱۰۰

۲۶۔ سفید آنکھ والے ڈس و سو فائیلہ اور سرخ آنکھ والی

مادہ کے ملاپ کو ظاہر کرنے کے لیے خاکہ

۱۰۲

۲۷۔ سفید آنکھ والی مادہ ڈس و سو فائیلہ اور سرخ آنکھ

والے زر کے ملاپ کو ظاہر کرنے کے لیے خاکہ

۱۰۳

۲۸۔ مرغ اور مرغی کے لون جسد

۱۱۰

۲۹۔ لایٹمنٹریا ڈسپار

۱۱۱

۳۰۔ لایٹمنٹریا میں محاس کی اشکال

۱۱۲

۳۱۔ لایٹمنٹریا میں بین صنفیں

۳۲۔ نقشہ جو لایٹمنٹریا میں بین صنفوں کی پیداوار کو ظاہر

کرتا ہے

۱۱۵

۳۳۔ لکڑی کے لون جسد

۱۱۹

۳۴۔ لون جسدوں کی تقسیم کو ظاہر کرنے کے لیے خاکہ

۱۳۲

۳۵۔ نقشہ جو ڈس و سو فائیلہ میں لون جسدوں کی لابی

۱۳۴

ترتیب کو ظاہر کرتا ہے

۱۳۶

۳۶۔ ڈس و سو فائیلہ سیاہ باقیاتی اور مہجوری طبعی کا ملاپ

۱۳۸

۳۷۔ "ہجائنت" کو ظاہر کرنے کے لیے خاکہ

۱۴۱

۳۸۔ ڈس و سو فائیلہ سیاہ طبعی اور مہجورے باقیاتی کا ملاپ

۱۵۰

۳۹۔ بکھرے اور ڈسپرس پھول

۱۵۲

۴۰۔ خاکہ جو ہر نوع کی وراثت کو ظاہر کرتا ہے

۱۵۴

۴۱۔ خاکہ جو سن میں وراثت کو ظاہر کرتا ہے

۱۵۶

۴۲۔ خاکہ جو سن میں مادری وراثت کو ظاہر کرتا ہے

۱۵۷

۴۳۔ انٹریسٹیم پووسے

۴۴۔ بپ نسل جو ریشمی مرغی اور بھورے لیکھارن مرغ کے ملاپ سے حاصل ہوئی

۱۶۲

۴۵۔ ولندیزی خرگوشوں میں لونیت کے مدارج

۱۶۶

۴۶۔ دو ولندیزی خرگوش

۱۶۸

۴۷۔ سپرائٹ اور ہیمبورگ کے ملاپ سے ن اور ن

۱۷۲

نسلوں میں وزن کی تقسیم کو ظاہر کرنے کے لیے ترسیم

۱۹۹

۴۸۔ انتخاب کے اثر کو ظاہر کرنے کے لیے انخنا

۲۰۱

۴۹۔ خالص لکیروں کے تخیل کو ظاہر کرنے کے لیے انخنا

۲۱۰

۵۰۔ کوچک انگشتی اور طبعی ہاتھ

۲۱۱

۵۱۔ کوچک انگشتی ہاتھ کا ریڈیو گراف

۲۱۲

۵۲۔ کوچک انگشتی خاندان کا شجرہ

۲۱۵

۵۳۔ ایک نر فی خاندان کا شجرہ

۱ کائنات کی اشیا کی نوعیت کو خود اُن اشیا کے مطالعہ کے ذریعہ دریافت کرنا زیادہ نیا اور مشکل طریقہ ہے بمقابلہ اس کے کہ ہم فلسفیوں کی ان آراء پر اعتماد کریں جو کتابوں میں موجود ہیں، پھر بھی یہ ظاہر کر دینا ضروری ہے خصوصاً فلسفہء کائنات کی تحقیق کے لیے کہ پہلا طریقہ زیادہ بہتر اور کم قابلِ اعتراض ہے۔

ولیم ہاروے

اناٹومیکل اکیسٹیشنس، ۱۶۵۳ء

میں دلالت

پہلا باب

موضوع

جہاں تک مطبوعات سے ظاہر ہے تخیل انسانی کی تاریخ میں یہ عجیب بات پائی گئی کہ انسانی تعلقات کے ایک نہایت اہم موضوع کی طرف نہایت ہی کم دلچسپی ظاہر کی گئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانے کے لوگوں نے یا تو اس امر کی جانب بالکل ہی توجہ نہیں کی یا چند نے نہایت مبہم طور پر اس حصے کو بتانے کی کوشش کی جو والدین بچے کی پیدائش میں لیتے ہیں یا ان سے نہایت عجیب انتہائی قوتیں وابستہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ عرصہ دراز سے انسان کم و بیش شعوری طور پر اپنے پالتو جانوروں اور پودوں کی نسلوں کو بہتر بناتا رہا ہوگا۔ پھر بھی ارسطو (Aristotle) کے زمانے سے قبل ہمیں وراثت کے ان مظاہر کی توجیہ کے لیے کسی نظریے کی بابت کوئی بین ثبوت نہیں ملتا۔ اس وقت خیال کیا جاتا تھا کہ انسان بچے کی پیدائش ہی قسم کی ہوتی ہے جیسے کہ بیج سے فصل تیار ہوتی ہے بیج مرد سے آتا ہے اور عورت زمین فراہم کرتی ہے۔ یہ تصور مسلمہ طور پر کئی صدیوں تک قائم رہا اور وراثت کی فطری بنیاد اسی وقت تسلیم کی گئی جبکہ یہ ثابت ہو گیا کہ عورت

کی حیثیت ایک مفعول (غیر متحرک) کے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ثبوت خرد بین کی وجہ سے حاصل ہوا اس لیے کہ اس کی ایجاد کے بعد ہی نہایت چھوٹے صنفتی خلیوں کا حقیقی مشاہدہ ممکن ہو سکا۔ ایک سو سال سے زائد کے اختلاف کے بعد جو اٹھارہویں صدی کے ختم تک جاری رہا سائنس دان اس خیال پر متفق ہو گئے کہ دونوں صنفتوں میں سے ہر ایک صنف ایک معین مادی جز اُس بچے کو پہنچاتی ہے جو اس کی مجموعی کوششوں سے پیدا ہوتا ہے جانوروں میں مادہ انڈا فراہم کرتی ہے اور نر منوی حوین۔ بلند تر پودوں میں متناظر خلیے بیض دانوں اور زیرہ دانوں سے فراہم ہوتے ہیں۔

(۲)

ایک عام اصول کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ مادہ کے پیدا کردہ تولیدی خلیے مقابلہ بڑے ہوتے ہیں اور ان میں از خود حرکت کرنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی۔ علاوہ اُس زندہ مادے کے جو ایک نئے فرد کی تیاری میں حصہ لیگا، بیضوں میں کم و بیش دردی کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے جو نمو پانے والے جنین کے لیے اس کی بقا کے ابتدائی مراح میں غذائیت فراہم کرتی ہے۔ مختلف جانوروں میں بیضوں کی جسامت بہت زیادہ متغیر ہوتی ہے۔ پرندوں اور ہوا میں جن کے انڈے کے اندرونی اجزاء ہی نمو پانے والے نوخیز کے ذرائع غذائیت ہیں۔ انڈے ان جانوروں کی جسامت کا لحاظ کرتے ہوئے نسبتاً نہایت بڑے ہوتے ہیں۔ برخلاف ان کے پستانوں میں جہاں اپنی پرورش کے ابتدائی مراح میں بچے ماں پر تھیلی ہوتے ہیں۔ انڈے نہایت چھوٹے ہوتے ہیں اور ان میں صرف اتنی ہی دردی رہتی ہے جو ان کو اس درجہ تک پہنچنے کے قابل بنا سکتی ہے جس پر وہ ماں کے رحم کی دیوار سے چھٹنے کے لیے صمیم پیدا کر سکیں۔ لیکن مختلف جانوروں کے پیدا کردہ بیضوں کی جسامت اور شکل میں خواہ کتنے ہی فرق کیوں نہ ہوں تاہم یہ ایک دوسرے سے اس لحاظ سے مشابہ ہیں کہ ہر ایک ایک نمایاں اور جداگانہ طبعی خلیہ ہے جو عموماً اپنی نوع کے ایک فرد کی شکل میں اُس وقت تک نمو نہیں پاسکتا جب تک کہ اس کی باروری ایک ایسے صنفتی خلیے کے ملاپ سے نہ ہو جو نر سے پیدا ہوا ہے۔

(۳)

نر خلیے ہمیشہ خرد بین جسامت کے ہوتے اور تولیدی غدہ یا اُنٹھی کے اندر کثیر تعداد میں پیدا ہوتے ہیں۔ علاوہ اپنی نہایت چھوٹی جسامت کے یہ بیضوں سے اس لحاظ سے

مختلف ہوتے ہیں کہ ان میں تیز حرکت کرنے کی قوت موجود ہوتی ہے۔ جانور مختلف ایسی میکانیتیں ظاہر کرتے ہیں جن کے ذریعے صنفی عناصر کا اتصال عمل میں آسکتا ہے۔ لیکن تمام صورتوں میں ایک سیالی یا نیم سیالی واسطے کے اندر تھوڑا فاصلہ (اکثر مادہ فرد کے اندر) ضروری اتصال کے وقوع سے پہلے کرنا لازمی ہے۔ اپنے سفر کے آخری حصے کو پورا کرنے کے لیے منوی خون میں کسی نہ کسی قسم کا تحریکی آلہ موجود ہوتا ہے اور یہ اکثر ایک لائے سوط یا کورہ نما صلیب کی شکل کی ہوتی ہے جس کی پھر گن سے یہ چھوٹا فرد اسی طرح متحرک ہو جاتا ہے جس طرح کہ ایک غوکچہ اپنی دم کی مدد سے حرکت کرتا ہے۔

جیسا کہ جانوروں میں ہوتا ہے اسی طرح پودوں میں بھی مادہ خلیہ بمقابلہ نر خلیوں کے بڑے ہوتے ہیں حالانکہ جسامت میں اتنا نمایاں اختلاف نہیں رہتا پھر بھی یہ ہمیشہ نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ ماں پودہ پر طفیلی کی طرح نمو پاتے ہیں اور ان حالات کے تحت ان کے لیے غذائی زردی کی کثیر مقدار کا رکھنا غیر ضروری ہوتا ہے۔ بیض خانے کے اندر بیض دان مادہ بافت سے گھرے رہتے ہیں۔ لیکن نر خلیہ کے داخلے کے لیے کلنی کے اندر ہو کر مادگیں کے نیچے سے ایک نمایاں ملی رہتی ہے۔ بیشتر پھول نشتی مشکل ہوتے ہیں اور اکثر صورتوں میں یہ خود یاروری بھی کرتے ہیں۔ زرد دان پھٹتے اور ان کے اندر موجود زرد دانے کلنی کے اوپر جھڑ جاتے ہیں۔ جب یہ عمل ہوتا ہے تو نر خلیہ اپنی پوشش میں کے ایک چھوٹے روزن میں سے باہر نکلتا اور (۴) کلنی کے اندر سوراخ کر کے نیچے کی جانب جاتا اور بیض خانے میں ایک بیض دان تک پہنچتا ہے۔ مکمل انضمام عمل میں آتا اور ایک نئے پودہ کا نہایت چھوٹا جنین فوراً تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ عرصے تک یہ آزاد زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں ہوتا اور پستانہ کے جنین کی طرح مادہ پودہ پر مثل طفیلی کے رہتا ہے۔ ماں پودے سے اس کو ایک محافظ پوشش ملتی ہے جس کو بیج پوشش کہتے ہیں اور اس کے اندر یہ چھوٹا جنین ایک خاص جسامت اختیار کرنے تک پھولتا رہتا ہے۔ تب یہ ایک پختہ بیج بن کر مادہ عضوی سے اپنا تعلق منقطع کر لیتا ہے۔ یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ پودے کا بیج صنفی خلیہ نہیں بلکہ ایک نو خیز فرد ہے جو سوائے اس پوشش کے جو اس کے اوپر رہتی ہے کلیتہً دوسری نسل سے تعلق

رکھتا ہے۔ یہ صورت یکسالہ ٲودوں میں ٲند لھاٲ سے اسی طرح ٲانی جاتی ہے جس طرح کہ ٲیتریوں میں۔ ایک موسم گرما میں یہ دو صنفی خلیوں کے ٲلاٲ کی وجہ سے شروع ہوتی اور سُروی نمو کے ٲند مدارج میں سے زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی ٲیتری میں مثل ایک سُرفہ کے اور ٲودہ میں ماں ٲودے کے اوٲر مثل لُفلی کے۔ جوں جوں گرما کا موسم ختم ہونے لگتا ہے ان میں سے ہر ایک ایک درجہ سکونت میں سرما کی سردی سے محفوظ رہنے کے لیے داخل ہو جاتا ہے۔ ٲیتری ایک سُرفہ اور ٲودہ ایک بیج کی شکل میں۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ سُرفہ خود اپنی ٲوشش فراہم کر لیتا ہے۔ مگر ٲودے کو یہ ماں ٲودے سے ملتی ہے۔ موسم بہار کے آغاز کے ساتھ ہی ٲیتری اور ٲودہ دونوں باہر نکلتے۔ بالغ ہوتے اور خود ایسے نابٲی خلیوں کو ٲختہ کر لیتے ہیں جن سے ایک نئی نسل تیار ہوتی ہے۔

نمو کی تفصیلات خواہ کچھ بھی ہوں ایک بنیادی امر واضح ہے۔ سوائے اٲموت ٲیدائش کی ٲند ناہ مثالوں کے ایک نیا فرد خواہ وہ جانور ہو یا ٲودہ دو ایسے صنفی خلیوں کی مشرکہ ٲیداوار ہے جو مختلف صنفوں کے افراد سے حاصل ہوتے ہیں۔ ایسے صنفی خلیے خواہ وہ بیٹھے ہوں یا منوی خون زواجوں یا شادی کرنے والے خلیوں کے نام سے مشہور ہیں (۵) اور وہ فرد جو دو زواجوں کے انضمام یا آپس میں جُفت سے حاصل ہوتا ہے جُفتہ کہلاتا ہے۔ ٲونکہ ایک جُفتہ دو جداگانہ زواجوں کی جُفت سے بنتا ہے۔ اس لیے اس فرد کو جو اس طرح تیار ہوا ہے اس کی زندگی کے ٲورے دور میں ایک دوہری ساخت تصور کرنا ٲاٲیے جس میں وہ اجزائے ترکیبی جو ہر زواج اپنے ہمراہ لاتا ہے ٲوری طرح ایک قسم کے اشتراک میں ضم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب جُفتہ اپنی باری میں زواجے بناتا ہے تو یہ اشتراک ٹوٹ جاتا اور عمل الٹ جاتا ہے۔ یعنی دوہری ساخت کے اجزاء ترکیبی تحلیل ہو کر منفرد ساختوں یا زواجوں کا ایک جُٹ ٲیدا ہوتا ہے۔

بلند تر ٲودوں یا جانوروں میں ایک نوع کے دور حیات کو ذیل کے تین دوروں میں منقسم کر سکتے ہیں :- (۱) زواجوں کی شکل میں علحدگی کا ایک دور جن میں سے ہر ایک ایک جاندار اکائی ہے جو متضاد صنف کے تیار کیے ہوئے زواج کے ساتھ اتصال کے بغیر مزید نمو نہیں ٲا سکتی۔ (۲) اُتلاف کا ایک دور جس میں دو زواجے ایک جُفتہ کی شکل میں ضم ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوٲر

اس طرح ردّ عمل کرتے ہیں کہ تقسیم خلیے کے عمل کے ذریعے ایک فرد حاصل ہوتا ہے جس میں اس کے تمام مختلف خصائل اور خصوصیات موجود ہوتی ہیں اور (۳) افتراق کا ایک دور جبکہ منفرد ساخت والے زواجے دوہرے ساخت والے جفتے کے اُس حصے سے جدا ہوتے ہیں جس پر اُس کا مولدی غدّہ مشتمل ہوتا ہے۔ زواجہ اور جُفتہ اور جُفتہ اور زواجہ کے مابین کیا تعلق ہے؟ جفتہ کی خصوصیات کی نمائندگی زواجے کے اندر کس طرح ہوتی ہے اور وہ کس طرح ایک دوسرے میں جُبتی ہیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو اُس مسئلے کی نوعیت کو ظاہر کرتے ہیں جس کا تعلق عمل وراثت سے ہے۔

اپنی بالیدگی کی عجیب قوت اور متقابلتاً اس بڑی جسامت کے لحاظ سے جو وہ حاصل کرتے ہیں جفتوں کی کئی خصوصیات صرف مشاہدے سے نمایاں ہو جاتی ہیں۔ کسی جانور یا پھول کا رنگ کسی بیج کی شکل یا کسی پروانے کے پروں پر کی تشکیل یہ تمام جفتی خصوصیات ہیں اور ان تمام کو راست مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ زواجوں کی خصوصیات ان کے برخلاف ہیں۔ حالانکہ ایک سیاہ اور ایک سفید مرغی کا فرق کافی طور پر نمایاں ہے۔ لیکن کوئی شخص انڈوں کو دیکھ کر یہ نہیں بتا سکتا کہ کس سے سیاہ اور کس سے سفید پرند نکلے گا۔ اور نہ زردانوں کے ایک ڈھیر سے کوئی ایسے زردانے علیحدہ علیحدہ چُن سکتا ہے جن سے سفید پھول پیدا ہوں گے اور نہ ان کو بتا سکتا ہے کہ جن سے رنگین پھول بنیں گے۔ پھر بھی ہم جانتے ہیں کہ باوجود ظاہر یکسانیت کے زواجوں کے مابین بنیادی امتیازات کا موجود ہونا لازمی ہے۔ نیز ان زواجوں کے مابین بھی جو ایک ہی فرد سے حاصل ہوئے ہوں۔ موجودہ حالات میں ان امتیازات کو دیکھنے کا صرف ایک طریقہ یہ ہے کہ اُن جفتوں کی خصوصیات کا مشاہدہ کیا جائے جن کو یہ بناتے ہیں۔ اور چونکہ دو زواجے مل کر ایک جفتہ بناتے ہیں۔ اس لیے ہم ایسی نویت پر ہیں کہ ایک معلومہ سے دو غیر معلومہ کی خصوصیات کو جاننے کی کوشش کریں۔ خوش قسمتی سے یہ مسئلہ کلیتہً سادہ ریاضی کا نہیں ہے۔ یہ صرف تجربی طریقے سے حل ہو سکتا ہے اور اس میں کس حد تک کامیابی ہو سکتی ہے وہ بعد کے صفحات سے ظاہر ہو جائیگا۔

دوسرا باب

تاریخی پس منظر

گریگرمینڈل (Gregor Mendel) کو جو ایک پادری اور
 راہب تھا اس بات کا امتیاز حاصل ہے کہ اس نے وراثت کے موجودہ علم کی بنیاد
 ڈالی۔ اُسی کے تجربوں کے ذریعے جاندار اشیاء کی نوعیت کے متعلق ان مسائل
 میں ایک بالکل نیا خیال اور بالکل ہی اچھوتا تخیل پیدا ہوا۔ مینڈل کی
 پیدائش ۱۸۲۲ء میں آسٹریائی اور سائیشائی والدین سے ہوئی۔ وہ ابتدائی
 سن میں ہی بروٹن کے گرجے میں داخل ہوا اور وہاں باغ کی تنہائی میں اُس نے
 معمولی مٹر کے ذریعے اُن تجربوں کا سلسلہ شروع کیا جو بعد میں شہرہ آفاق
 ہو گئے۔ ۱۸۶۵ء میں آٹھ سال کے کام کے بعد اُس نے اپنے تجربوں کے نتائج کو
 پروسیڈنگس آف دی نیچرل ہسٹری سوسائٹی آف بروٹن
 میں تقریباً چالیس صفحات کے ایک مختصر مقالہ کی شکل میں شائع کیا۔ حالانکہ
 یہ مختصر تھا لیکن نتائج کی اہمیت اور اظہار کی وضاحت کیوجہ سے اُس کے اس

کام کو علم حیاتیات کے بلند پایہ معیار کی تصنیفات میں ہمیشہ شمار کیا جائیگا۔
 پینتیس سال تک میںڈلٹ کا مقالہ تاریخی میں رہا۔ جس کے بعد سن ۱۷۹۳ء میں اس کو
 کئی ممتاز ماہرین نباتیات نے بہ یک وقت معلوم کیا۔ اس عجیب لا پرواہی کے
 وجہ دیکھپی سے خالی نہیں ہیں۔ میںڈلٹ سے قبل دو غلیت پر کافی تعداد
 میں تجربے کیے جا چکے تھے۔ اٹھارہویں صدی کے آخری نصف میں لینئیس
 (Linnaeus) کے درجہ بندی کے کام سے لفظ نوع کا ایک خاص مفہوم
 پیدا ہوا اور سائنس دانوں نے اپنی توجہ یہ معلوم کرنے کے لیے مبذول کی کہ
 ایک نوع کا دوسری سے کیا تعلق ہے۔ اور ایک ظاہرہ طریقہ اس مسئلے کو حل کرنے کا یہ تھا
 کہ مختلف انواع کو آپس میں بارور کرنے کے بعد نتیجوں کو دیکھا جائے۔ انیسویں صدی کے
 ابتدائی نصف میں یہ کام زیادہ تر کیا گیا حالانکہ اس قسم کا کام تقریباً پوری طرح
 نباتیات دانوں تک ہی محدود رہا۔ علاوہ اس واقع کے دو غلیت کے کام کے لیے
 پورے بمقابلہ جانوروں کے زیادہ آسانی کے ساتھ استعمال کیے جاسکتے ہیں غالباً
 ایک دوسرا سبب بھی تھا جس کی وجہ سے حیوانیات دانوں نے اس قسم کی تحقیق کی جا
 توجہ نہ کی۔ حیوانیات کا میدان عمل بمقابلہ نباتیات کے زیادہ وسیع ہے جس میں
 زیادہ اقسام کے نمونے اور ساختیں پائے جاتے ہیں۔ کچھ اس وجہ سے بھی کہ پودوں کی
 اہمیت طب کے علم میں ضروری تھی اور کچھ اس لیے بھی کہ ان کی تعداد میں کمی کے باعث
 نباتیاتی علم کی تشریح بمقابلہ حیوانیاتی کے زیادہ بہتر طور پر معلوم تھی۔ اس لیے یہ
 تعجب کی بات نہیں ہے کہ انیسویں صدی کے ابتدائی دور میں حیوانیات داں
 کووئیے (Cuvier) اور اس کے شاگردوں کے زیر اثر تھے اور اپنی پوری قوت
 ان نئے قسم کے جانوروں کی تشریح بیان کرنے میں صرف کر رہے تھے جو غائر تلاش
 کے بعد اندرون ملک اور بیرون ملک معلومات کے نئے سفر اور جستجو کے ذریعہ مسلسل علم میں
 آ رہے تھے۔ اس دور میں حیوانیات داں دو غلیت کی ایسی تحقیقات کی جانب کم رجحان
 یا دیکھپی رکھتے تھے جو نباتیات دانوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھیں۔ علاوہ بریں
 نباتیات دانوں کی کوششوں کے نتیجے کچھ زیادہ ہمت افزا نہ تھے اس لیے کہ
 وجود تجربوں پر لگاتار محنت کرنے کے حاصل شدہ نتائج واقعات کا ایک

(۹) جھیلہ بن کر رہ گئے تھے اور اس مسئلے کے حل کا کوئی ظاہرہ طریقہ نہیں بتا سکتے تھے جس کے لیے ان پر کام کیا جا رہا تھا۔ دو غلطیت پر نصف صدی کے تجربوں کے بعد بھی ایک دوسرے کے ساتھ انواع اور اقسام کے ارتباط کی تخصیص ایسی ہی پائی گئی جو پہلے سے موجود تھی۔ اس کے بعد ۱۸۵۹ء میں ڈارون نے اپنی کتاب ”مبدأ انواع“ میں دنیا کے سامنے ایک مستقل نظریہ اس طریقے کو سمجھانے کے لیے پیش کیا جس کے ذریعہ ایک نوع دوسری نوع سے تدریجی ارتقاء کے ایک عمل سے حاصل ہوئی ہے۔ مختصراً اس نظریے کو اس طرح بیان کر سکتے ہیں:۔ پودے یا جانور کے کسی نوع میں تولیدی صلاحیت موجودہ غذائی رسد کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی ہے اور نتیجتاً جو مقابلہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے لازمی طور پر بقاء کے لیے کشمکش ہوتی ناگزیر ہے۔ ان تمام افراد میں سے جو پیدا ہوں گے صرف ایک حصہ اور وہ بھی نہایت کم تعداد میں اولاد پیدا کرنے کے لیے زندہ رہتا ہے۔ ڈارون کے نظریہ کے مطابق باقی ماندہ حصہ کی نوعیت کا اندازہ صرف اتفاقاً نہیں ہوتا۔ ایک ہی نوع کے کوئی بھی دو افراد بالکل مشابہ نہیں ہوتے اور وہ فرق جو پیدا ہوتے ہیں مقابلہ کے حالات میں قائم رہنے کے لیے ان میں سے چند کو زیادہ بہتر طور پر اہل بنا دیتے ہیں۔ بمقابلہ کم اہلیت رکھنے والے ساتھیوں کے ان کو بقاء کی کشمکش میں باقی رہنے اور نتیجے کے طور پر اولاد چھوڑنے کا بہتر موقع حاصل ہوتا ہے۔ یہ بحث وراثت کے ایک مزید اصول کو فرض کر لینے سے بالکل مکمل ہو جاتی ہے جس کے لحاظ سے بچہ نوع کے دوسرے افراد کے مقابلے میں اپنے والدین سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ ایسے والدین جو ایک موزوں اور موافق تغیر کے حامل ہوتے ہیں اُس تغیر کو اپنی اولاد میں منتقل کر دیتے ہیں جو چند میں زیادہ اور دوسروں میں کمتر درجے کا ہوتا ہے۔ وہ اولاد جن میں یہ تغیر زیادہ درجے میں موجود ہوتا ہے زندہ رہنے کے زیادہ اہل ہونگے اور موافق تغیر کو اور بھی زیادہ درجے میں اپنے چند اولاد میں منتقل کر دیں گے۔ بقاء کے لیے مقابلے کی کشمکش تغیر اور وراثت کے بعض اصولوں

(۱۰)

کے ساتھ ساتھ عمل پیرا ہونے سے نوع کی آہستہ اور مسلسل تبدیلی ایک خاص عمل کے ذریعے وقوع پذیر ہوتی ہے جس کو ڈارون نے طبعی انتخاب کے نام سے موسوم کیا۔

اس نظریہ کے ربط اور سادگی نے جس کی تائید میں وہ بے شمار واقعات تھے جن کو ڈارون نے نہایت استقلال کے ساتھ جمع کیا تھا مرمت کے ساتھ بیشتر ماہرین حیاتیات کی پر جوش حمایت حاصل کر لی۔ آخر کار انواع کے ربط کا مسئلہ حل شدہ معلوم ہونے لگا اور آئندہ چالیس سال تک ڈارون کے نظریے کی روشنی میں حیوانیات اور نباتیات داں انہماک کے ساتھ اُن کثیر تشریحی امور کی درجہ بندی کرنے میں مصروف رہے جو اب تک جمع ہو چکے تھے اور مزید نئے امور کو جمع کرنے اور ان کی درجہ بندی کرنے لگے۔ تقابلی تشریح اور جنینیات کے مطالعے کو ایک نئی ترغیب حاصل ہوئی اس لیے کہ تبدیلی کے ساتھ توارث کے نظریے کو تسلیم کرنے کے بعد حیاتیات داں پر لازم ہو گیا کہ وہ اس طریقے کو بتائے جس کے تحت جانوروں اور پودوں کو جو ساخت اور شکل میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہیں ایک حد تک آپس میں مربوط خیال کیا جاسکے۔ اس کے بعد نباتیات اور حیوانیات داں دونوں کی توجہ اُن فرضی نسبی شجروں کی طرف مرکوز ہو گئی جو ارتقاء کی ایسی مختلف سمتوں کو ظاہر کرتے ہیں جن کے ذریعے جانوروں یا پودوں کا ایک گروہ طبعی انتخاب کے طویل مسلسل عمل سے ایک دوسرے گروہ سے حاصل ہوا ہو۔ مجموعی طور پر ایسے کام کے نتیجے کو اس طرح ظاہر کر سکتے ہیں کہ مختلف و متضاد حالات جن کے تحت جاندار چیزیں آجکل موجود ہیں اور گزشتہ زمانہ میں موجود تھیں جہاں تک کہ عتیقیات کے علم سے معلوم ہو سکا ہے تمام اس نقطہ نظر کے حامی ہیں کہ یہ توارث کے اُس مشترک خاصیت کے ذریعے آپس میں (۱۱) مربوط ہیں جس کا مسئلہ نظریہ ارتقاء متقاضی ہے۔ حالانکہ جانوروں کے کسی ایک خاص گروہ کے توارث کے صحیح سلسلے کی بابت اکثر ناقابل لحاظ اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس تمام کام کا اُس طریقے سے مطلق کوئی سروکار نہیں ہے جس کے ذریعے انواع تیار ہوئی ہیں۔ ڈارون کی کتاب ”مبدأ انواع“ کا

اثر دراصل یہ رہا کہ اس طریقے کی طرف سے جس کے تحت انواع ابستا کرتی ہیں توجہ منحرف ہو گئی۔ جس وقت یہ نظر یہ پیش کیا گیا تھا ڈارون کی توجیہ اس قدر اطمینان بخش معلوم ہوئی کہ حیاتیات دانوں نے اس میں بتائے ہوئے وراثت اور تغیر کے تخیل کو تسلیم کر لیا اور دو غلیت پر کام کرنے والوں کے تجربوں کی جانب متوجہ ہونا چھوڑ دیا۔ اگر مینڈل کا مقالہ اس سے بارہ سال قبل شائع ہوتا تو یہ مان لینا مشکل ہے کہ اس کی طرف وہی توجہ دیا جاتی جو اس کو بعد میں دی گئی۔ چونکہ یہ مقالہ ڈارون کے بلند پایہ کام کی اشاعت کے کئی سال بعد ظاہر ہوا جبکہ کام کرنیوالوں کے دماغ ان مسائل کو سمجھ چکے تھے جو اس میں بتائے گئے اور اس لیے ان کے خیالات اور توجہ دوسرے کاموں کی طرف منعطف ہوئی تھیں۔

تاہم اسی زمانہ میں اصطلاح وراثت میں زیادہ صحت پیدا کرنے کے لیے ایک دلچسپ اور قابل توجہ کوشش کی گئی۔ فرانسیس گالٹن (Francis Galton) نے جو ڈارون کا رشتے کا بھائی تھا۔ باسٹ کے شکاری کتوں (Basset hounds) کی افزائش نسل کے مواد پر کام کرتے ہوئے معلوم کیا کہ اعداد و شمار کے ایک مخصوص نظم کی صورت میں وہ اس تنا سب کو پیش کر سکتا ہے جس کے تحت مختلف رنگ متواتر نسلوں میں نمودار ہوئے۔ ہر ایک فرد کے لیے تصور کیا گیا کہ وہ ایک معین ورثہ کا حامل ہے جس کو اکائی سے ظاہر کیا جاسکتا ہے اس میں سے $\frac{1}{4}$ حصہ اوسطاً دونوں والدین سے حاصل ہوا تھا (یعنی $\frac{1}{4}$ ہر فرد سے) $\frac{1}{4}$ حصہ چار بڑے والدین سے۔ $\frac{1}{16}$ حصہ آٹھ اُن سے بڑے والدین سے اور علی ہذا۔ اس کو قانون اسٹامی وراثت کے نام سے موسوم کیا گیا۔ جو کافی صحت کے ساتھ چند اعداد و شماری مظاہر کو بتاتا ہے جو ایک مخلوط آبادی کی خصوصیات کی منتقلی سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ کہ خصوصیات کس طرح زواج سے جفتے ہیں اور جفتے سے زواج میں منتقل ہوتی ہیں، پہلے کی طرح نامعلوم رہا۔ وراثت دراصل ایک فعلیاتی مسئلہ ہے۔

(۱۲)

Parent Grand Parents Great grand Parents

Law of Ancestral Heredity

اور حالانکہ اعداد و شمار تجربے کے شروع کرنے کے لیے معلومات فراہم کرتے ہیں لیکن بالآخر اس کی ترقی کا دار و مدار تجرباتی نتائج کی بنیاد پر ہی ہے۔ اس وجہ سے باوجود اپنے انوکھے پن اور اصلیت کے گالٹن (Galton) کا نظریہ اور بعد کے اعداد و شماری کام جو اس پر مبنی تھے وراثتی عمل کی ماہیت کی پیچیدگیوں کو سمجھانے میں ناکام رہے۔

جب گالٹن انگلستان میں کام کر رہا تھا تو اُسی وقت جرمن ماہر حیوانیات آگست وٹزمان (August Weismann) وراثت کے پیچیدہ نظریے

کو سمجھانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ اس کا کام جو بالآخر اس کی کتاب "نابت مایہ" کی شکل میں شائع ہوا جس کو اس مضمون کے بارے میں ایک بہت اہم مقالہ خیال کیا جاتا ہے۔ وٹزمان کے کتاب کی اشاعت سے قبل عام طور پر یہ تسلیم کیا جاتا تھا کہ کسی فرد کے اندر اس کی زندگی کے دوران میں غذائیت اور ماحول کے مختلف حالات کی وجہ سے جو کچھ تبدیلیاں پیدا ہوں بچے کے اندر منتقل ہو سکتی ہیں۔ اس لحاظ سے تمام حیاتیات وراثت کے اصل دار و ن ہی کو مانتے تھے۔ جس کے مطابق سلف میں جو تبدیلیاں کسی حصے یا عضو کے زیادہ استعمال یا غیر استعمال کی وجہ سے نتیجہ ہوتی ہیں وہ بچوں میں منتقل کر دی جاتی ہیں۔ وٹزمان کے نظریے کے مطابق عام جسمانی بافتوں یا جسد مایہ اور تولیدی غدود یا نابت مایہ کے درمیان ایک نمایاں فصل کا ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ فرد محض ایک حامل ہوتا ہے اس اہم نابت مایہ کا جس کی خصوصیات کا تعین اس سے بہت قبل ہو چکا تھا جبکہ وہ جداگانہ زندگی بسر کرنے کے قابل بنا۔ چونکہ یہ تخیل "اکتسابی خاص" کی وراثت کے امکان کے خلاف تھا اس لیے وٹزمان نے اس شہادت کو غلط ثابت کرنے کا دعویٰ کیا جس پر اس کا اخصار تھا اور یہ بتلایا کہ جہاں کہیں اس تخیل کا تنقیدی طور پر امتحان کیا گیا یہ غلط ثابت ہوا۔ وٹزمان نے اس طرح

(۱۳)

حیاتیات دانوں کو استعمال اور غیر استعمال کے وراثتی اثرات کے متعلق اپنے خیالات کی نظر ثانی کرنے کے لیے مجبور کر کے نسلیات کے مطالعے کی بیش بہا خدمت انجام دی ادا آئندہ تحقیقات کے راستے کو صاف کر دیا۔

۱۸۹۵ء میں اس خصوص میں ایک قدم اور آگے بڑھایا گیا جبکہ بیٹسن (Bateson) نے پھر ایک مرتبہ مہدار انواع کے مسئلے کی جانب توجہ مبذول کرائی اور اعتراض کیا کہ تغیر اور وراثت کے مسئلہ خیالات واقعات سے کس حد تک مطابقت رکھتے ہیں۔ عمومی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ انواع ایک سے لے کر دوسری تک بتدریج درجہ دار نہیں ہوتیں لیکن ان کے درمیانی فرق نمایاں اور معین ہیں اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ عمل جس سے یہ حاصل ہوئی ہیں نہایت چھوٹے اور ناقابل محسوس اختلافات کا مجموعہ ہیں تو تسلسل میں یہ بے قاعدگی کہاں سے آئی؟ قدرتی طور پر تمام درمیانی اقسام کے افراد کیوں بکثرت پیدا نہیں ہوتے۔ بمقابلہ اس حقیقی صورت کے جو عموماً موجود ہوتی ہے؟ بیٹسن نے محسوس کیا کہ اگر ہمیں کبھی بھی اس سوال کا جواب دینا پڑے تو یہ لازمی ہوگا کہ ہمیں تغیر کی نوعیت کا اور اس وراثتی عمل کی نوعیت کا جس کے ذریعے یہ تغیرات منتقل ہوتے ہیں زیادہ صحیح معلومات ہونی چاہئیں۔ اور ان معلومات کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ مردہ کو چھوڑ کر جاندار چیزوں کے مطالعے پر واپس آئیں۔ یہ درست ہے کہ تجرباتی اور افزائش نسل کا پچھلا مواد بالکل ہی بایوس کن تھا۔ یہ بھی درست ہے کہ کوئی ایسے قابل عمل اشارے بھی موجود نہ تھے جن سے زمانہ حال میں تجربوں کو انجام دیا جاسکے۔ اس کے باوجود اس قسم کے کام ہی میں کامیابی کی کوئی امید نظر آتی تھی۔

(۱۴)

چند سال بعد ڈی وریز (de Vries) کی قابل قدر کتاب "نظریہ ناگہانی تبدل" کی پہلی جلد شائع ہوئی۔ ڈی وریز شام کے بستی پھول (Oenothera) پر وسیع کام کر کے اس نتیجہ پر پہنچا کہ نئی اقسام پُرانی سے دفعتاً یا فوری درجوں

باناگمائی تبدل سے یکایک حاصل ہوتی ہیں نہ کہ ایسے عمل سے جس میں نہایت چھوٹے اختلافات کا تدریجی اجتماع ہوتا ہے۔ مختلف اور جداگانہ پودوں میں سے متعدد نمایاں مثالوں کو حاصل کر کے اُس نے حیاتیات دانوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ تغیر میں جو عدم تسلسل پایا جاتا ہے وہ ایک نہایت وسیع منظر سے بمقابلہ اس کے جو اب تک بتایا گیا ہے اور اُس کے اس بیان سے اکثر لوگ اس بات پر شبہ کرنے لگے کہ طرز ارتقاء کا بیان جو چالیس سال سے مسئلہ تھا دراصل درست تھا یا نہیں مختصراً یہ مطلع نظر حیاتیات کے اس اہم مسئلے کی بابت مینڈل کے کام کے دوبارہ احیاء کے وقت تھا۔

تیسرا باب

مینڈل کا کام

مینڈل نے جو کام اپنے ذمے لیا وہ یہ تھا کہ اُس طریقے کا صحیح اندازہ ہو جائے جس سے ایک نوع کے اندر پائے جانے والے مخصوص اور متعین اقسام ایک دوسرے سے ربط رکھتی ہیں اور اس نے شروع سے ہی محسوس کیا کہ کامیابی کا بہترین موقع اسی نوعیت کے مواد پر کام کرنے میں ہے جس سے مسئلہ سادہ ترین صورت ظاہر کر سکے۔ اس نے تصفیہ کیا کہ پودہ جس پر وہ کام کرے طبعاً خود باروری کرنے والا ہو اور کیڑوں کے ذریعے اس کی باروری کا امکان نہ ہو ساتھ ہی ساتھ اس میں ایسے متعین اقسام موجود ہوں جو تمثیل کے مطابق مثل اصل اپنی افزائش کریں۔ معمولی مٹر میں اُسے اپنی تلاش کا پودہ مل گیا۔ یہ ایک سخت جان کیسا۔ زیادہ پھیلنے والا پودہ ہے جس پر آسانی کے ساتھ کام ہو سکتا ہے پائیسٹم میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ کیڑے جو عموماً پھولوں پر جاتے ہیں اس سے زیرہ حاصل نہیں کر سکتے اور اس طرح پار باروری کا امکان نہیں تھا۔ ساتھ ہی یہ متعدد مختلف اقسام میں


پایا جاتا ہے جن میں بہت ہی نمایاں اور معین فرق پائے جلتے ہیں۔ اس کے پھول ارغوانی یا سرخ یا سفید ہو سکتے ہیں۔ پودے اونچے یا بوٹے۔ پختہ بیج زرد یا سبز۔ گول یا شکن دار ہوتے ہیں۔ یہ ہیں چند ایسی خصوصیات جن میں مٹر (۱۶) کی مختلف جنسیں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی ہیں۔

باروری کے اپنے تجربوں کے طریقہ عمل کے لیے مینڈل نے ایسا رویہ اختیار کیا جس نے اس کو سابقہ دو غلبیت پر کام کرنے والوں سے ممتاز کر دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ پار باروری کے نتیجوں سے وراثت کے کسی عام اصول کو حاصل کرنے میں ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ انھوں نے نسلوں کے سلسلوں میں مخصوص سیرتوں پر اپنی توجہ مرکوز نہیں کی یا ان کو احتیاط کے ساتھ شناخت نہیں کیا۔ ناکامی کی اس وجہ سے اُس نے احتیاط کے ساتھ گریز کیا۔ اور اپنے تمام تجربوں میں صرف متضاد سیرتیں رکھنے والے پودوں کی ہی آپس میں باروری کرائی اور اپنی کوششوں کو مسلسل نسلوں میں ان سیرتوں کے طرز عمل کے مشاہدے میں صرف کیا۔ اس نے اپنی توجہ اس طرح تجربوں کے ایک سلسلے میں اونچے پن اور بوٹے پن جیسی سیرتوں کے منتقل ہونے پر مرکوز کی اور ان تجربوں کے دوران میں اُس نے ایسی دوسری سیرتوں کو نظر انداز کر دیا جن میں پرکھے پودے ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہوں۔ اس غرض کے لیے اُس نے مٹر کی دو اقسام کو پسند کیا جن میں سے ایک ہفٹ اور دوسری تقریباً ۱۱ فٹ اونچی تھی۔ ابتدائی امتحان سے اس کا نتیجہ کر لیا گیا تھا کہ ہر قسم سے اپنی خاص اونچائی کے لحاظ سے مشل اصل کے افزائش ہوتی ہے۔ ان دونوں قسموں کی مصنوعی باروری کرائی گئی اور یہ معلوم ہوا کہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا خواہ کسی پودے کو زیرہ پودے اور کسی کو بیضانی پودے کے طور پر استعمال کیا جائے۔ دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہی تھا۔ اونچے پودے کی بوٹے پودے سے باروری کرنے پر صرف اونچے، صرف اتنے ہی اونچے یا اونچے پرکھے سے زیادہ اونچے پودے حاصل ہوئے۔ اس لحاظ سے مینڈل نے اونچے پن کو

(16) غالب (Dominant) اور بونے پن کو مغلوب (Recessive) سیرت کے نام سے موسوم کیا۔ دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ ان اونچے دو غلوں کے بیج جمع کیے اور بوئے گئے۔ ایسے بیجوں نے آئندہ سال میں ایک مخلوط نسل پیدا کی جو اونچے اور بونے پودوں پر مشتمل تھی لیکن ان میں کوئی درمیانی پودہ موجود نہ تھا۔ ایسے پودوں کی کثیر تعداد اگانے کے بعد مینڈل اس واقعہ کو ثابت کرنے کے قابل ہوا کہ اس نسل میں اونچوں کی تعداد بونوں کی تعداد کے مقابلہ میں ٹھیک تین گنی تھی۔ سال گذشتہ کی طرح اس دوسری دوغلی نسل سے احتیاط کے ساتھ بیج جمع کیے گئے اور ہر صورت میں ہر انفرادی پودے سے بیج جدا گانہ جمع کیے گئے اور آئندہ سال جدا گانہ طور پر بوئے گئے۔ اس کا طے مختلف پودوں کی انفرادیت کو جدا رکھتے ہوئے خواہ وہ ایک دوسرے سے کتنے ہی مشابہ کیوں نہ ہوں مینڈل نے وہ گہرا معلوم کیا جو اُس کے پیش روؤں کی کوششوں سے چھٹ گیا تھا۔ مغلوب بونوں سے جمع کیے ہوئے بیجوں نے مثل اصل کے صرف بونے پیدا کیے۔ اور یہی صورت تمام بونوں کے لیے درست تھی جن کا امتحان کیا گیا۔ لیکن اونچوں کے لیے صورت حال بالکل ہی متضاد تھی۔ حالانکہ شکل میں یہ یکساں تھے لیکن ان میں سے چند نے مثل اصل کے پودے پیدا کیے تو دوسروں نے اصل اونچے دو غلوں کی طرح عمل کیا جن سے ایک ایسی نسل حاصل ہوئی جس میں اونچوں اور بونوں کا تناسب تین اونچے اور ایک بونے ہونے لگا۔ گنتی کرنے سے معلوم ہوا کہ ایسے اونچوں کی تعداد جن سے بونے حاصل ہوئے ایسے اونچوں کے مقابلے میں دو گنی تھی جنہوں نے مثل اصل کے پودے پیدا کیے۔ اگر ہم ایک بونے پودے کو ب سے۔ ایک مثل اصل اگانے والے اونچے

ظہور کے متعلق یہ تصور مینڈل کے نظریے کا نہایت اہم جز ہے۔
اب ہم متصلہ خاکہ (شکل ۱) کی مدد سے ایسے نتیجے حاصل کر سکتے ہیں جو

زواجوں کی نوعیت کے متعلق مینڈل کے خیال کے مطابق حاصل ہونے چاہئیں اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کس حد تک حقیقت سے مطابقت رکھتے ہیں۔ چونکہ اصل اونچے پودے کا تعلق اسی قسم سے تھا جو مثل اصل کے افزائش کرتا تھا اس لیے تمام زواج جو اس سے حاصل ہوں ان میں اونچا پن موجود ہونا چاہیے۔ اسی طرح اصل بونے پودے کے زواج بونے پن کے حامل ہونے چاہئیں۔



شکل ۱۔

اونچے اور بونے مٹر کی پار باروری میں دراشت کا خاکہ۔ زواجوں کو چھوٹے اور جھٹوں کو بڑے دائروں سے تعبیر کیا گیا ہے۔

ان دونوں کی باہمی باروری کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک زواج جس کے اندر اونچا پن تھا ایک دوسرے زواج سے مل گیا

جس میں بونا پن موجود تھا۔ اونچے پن کے پوری طرح غالب ہونے کی وجہ سے ایسا پودہ شکل میں خالص اونچے سے تیز نہیں کیا جاسکتا مگر یہ ان زواجوں کی نوعیت کے لحاظ سے جو اس سے تیار ہونگے خالص اونچے سے نمایاں طور پر مختلف ہوتا ہے۔ جب زواج تیار ہوتے ہیں تو عناصر جو بونے پن اور اونچے پن کی نمائندگی کرتے ہیں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں اس طرح سے کہ ان میں سے نصف زواجوں میں ایک قسم کا عنصر اور نصف میں دوسری قسم کا عنصر پایا جاتا ہے۔ کیونکہ مفروضے کی بنا پر ہر زواج ان دو سیرتوں میں سے ایک یا دوسری کے لیے خالص ہونا چاہیے اور یہ امر بیضدانوں اور زیرہ دانوں کے لیے درست ہے۔ اس لیے ایسے دو غلے یا پودوں کو ایسے بیضدانوں کا ایک سلسلہ تیار کرنا چاہیے جن میں کچھ اونچے پن اور چند بونے پن کے حامل ہوں نیز ان کو مساوی تعداد میں تیار کرنا چاہیے اور یہی صورت زیرہ دانوں کے لیے بھی ہونی چاہیے۔

(۲۰)

اب ہم یہ تخمینہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ایسے زیرہ دانوں کا ایک سلسلہ بیضدانوں کے ایک ایسے سلسلے سے مل جائے تو کیا ہوگا یعنی پیدا ہونے والی نسل کی کیا نوعیت ہوگی جبکہ دو غلے کو خود باروری کا موقع دیا جائے۔ فرض کرو کہ ہمارے پاس ۴ لا بیضدان موجود ہیں جن میں سے ۲ لا "اوپنچے" اور ۲ لا "بونے" ہیں۔ ان کو ایسے زیرہ دانوں سے بارور کیا جاتا ہے جن میں سے نصف "اوپنچے" اور نصف "بونے" ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک "اوپنچے" بیضدان کو ایک "اوپنچے" یا ایک "بونے" زیرہ دان سے باروری کا مساوی موقع حاصل ہے۔ اس طرح ہمارے ۲ لا "اوپنچے" بیضدانوں میں سے لا کی باروری "اوپنچے" زیرہ دانوں سے اور لا کی باروری "بونے" زیرہ دانوں سے ہوگی۔ پہلے ملاپ سے اوپنچے پودے پیدا ہونا لازمی ہے اور چونکہ بونا پن ان میں سے بالکل نکل گیا ہے اس لیے انکو آئندہ خاص طور پر اوپنچے پودوں کی ہی افزائش کرنی چاہیے۔ دوسرے ملاپ سے بھی اوپنچے پودے پیدا ہونے ضروری ہیں لیکن چونکہ ان میں مغلوب بونا پن بھی موجود ہے اس لیے جب ان کی نسل کو اکایا جائیگا تو اوپنچے اور بونے دونوں کا حاصل ہونا لازمی ہے۔ اسی طرح ۲ لا بونے بیضدانوں میں سے ہر ایک کو ایک "اوپنچے" یا ایک "بونے" زیرہ دان سے بارور ہونے کا مساوی موقع حاصل ہے۔ لہذا لا ایسے اوپنچے پودے پیدا کریں جن میں مغلوب بونا پن موجود ہوگا۔ برخلاف ان کے لا ایسے پودے پیدا کریں جن میں سے اوپنچا پن نکال دیا گیا ہے یعنی ان سے خالص مغلوب بونے پودے تیار ہوں گے۔ اس لحاظ سے ہمیں خود بارور شدہ دو غلوں کے ۴ لا بیضدانوں سے ۳ لا اوپنچے پودے حاصل ہونے چاہئیں اور لا بونے نیز ۳ لا اوپنچوں میں سے لا مثل اصل کے صرف اوپنچے پودے اکائیے لیکن بقیہ ۲ لا چونکہ مثل اصل دو غلے کے ایک "اوپنچے" اور ایک "بونے" زواج کے ملاپ سے تیار ہوتے ہیں اس لیے ان کو افزائش کے بعد اس طرح عمل کرنا چاہیے کہ وہ اوپنچوں اور بونوں کو ۳:۱ کے تناسب میں پیدا کرے۔ اب اگر دیکھا جائے تو دراصل یہی وہ نتیجہ ہے جو تجربے سے حاصل ہوا تھا (دیکھو صفحہ ۱۷) اور تجرباتی نتیجوں کی یہ قریبی مطابقت ان نتیجوں سے جنہیں مینڈل نے زواجوں کو خالص تصوی کر کے بیان کیا اس امر کے لیے سب سے زیادہ پُر زور شہادت ہے کہ زواجوں

کی نوعیت اور جنتوں کی سیرتوں کے ساتھ ان کے ارتباط کو اسی نظر سے دیکھا جائے جس سے کہ مینڈل نے دیکھا تھا۔

نظریے کی اور بھی زیادہ آزمائش ہو سکتی ہے۔ ن، نسل میں غالب اور مغلوب کی ۳:۱ مناسبت کی موجودگی اس وجہ سے تھی کہ ن، افراد نے ایسے زواج مساوی تعداد میں پیدا کیے جو علی الترتیب غالب اور مغلوب عناصر کے حامل تھے۔ اب اگر ن، پودے کی باروری خالص مغلوب سے کرائی جائے تو اس طرح ہم زواجوں کے ایک ایسے تسلسلے کو جو غالب اور مغلوب کی مساوی تعداد پر مشتمل ہے ایک ایسے تسلسلے سے ملارہے ہیں جو پوری طرح مغلوب پر مشتمل ہے۔ ہمیں ایسے ملاپ سے غالب اور مغلوب افراد کی مساوی تعداد حاصل ہونی چاہیے اور مزید یہ کہ ایسے تیار شدہ تمام غالب پودوں کو غالب اور مغلوب کو ۳:۱ کی نسبت میں پیدا کرنا چاہیے جبکہ خردان سے افزائش نسل کی جائیگی۔ ان دونوں توقعات کی کافی طور پر تجربے کے ذریعہ تصدیق ہو گئی اور ایک مغلوب کے ساتھ باروری کرنا یہ جانچ کرنے کا ایک مستند طریقہ ہے کہ آیا ایک پودہ یا جانور جو غالب سیرت کا حامل ہے خالص غالب ہے یا ایک ایسا غیر خالص غالب ہے جو مغلوب سیرت بھی رکھتا ہے۔ اول الذکر صورت میں بچے یا حامل تمام غائب شکل کے ہونگے لیکن ثانی الذکر صورت میں یہ غالب اور مغلوب کی اوسطاً مساوی تعداد پر مشتمل ہونگے۔

اب تک ہم نے ایسے نتائج کو دیکھا جو دو ایسے افراد کے آپس میں باروری کرنے سے حاصل ہوئے جو سیرتوں کے ایک ہی جوڑے کے لحاظ سے اختلاف رکھتے ہیں اور ان نتائج کی وضاحت کرنے اور سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن مینڈل نے ایسے بھی پودے استعمال کیے جو تفرقی سیرتوں کے ایک سے زیادہ جوڑے کے لحاظ سے مختلف تھے۔ ایسی صورتوں میں اس نے معلوم کیا کہ سیرتوں کے ہر جوڑے نے اسی معین قاعدے کی پابندی کی۔ لیکن سیرتوں کے ہر جوڑے کا توارث دوسرے سے بالکل آزاد تھا۔ مثلاً جب رنگین پھولوں والے ایک اونچے پودے کو ایک سفید پھولوں والے پودے سے بارور کرایا گیا تو حاصل شدہ مخلوط ایک اونچا پودہ تھا جس کے پھول رنگین تھے اس لیے کہ رنگین پھول سفید پر اور اونچائی بونے پن پر غالب ہے۔ بعد کی نسل میں رنگ دار

کے لیے اسی خاص قاعدے کی پابندی کرنا ہے اور اگر ابتدائی پُرکھوں کی پتاوٹ معلوم ہوتو نسل کی نوعیت یعنی ممکنہ شکلوں کی اور ان تنا سبوں کا جن میں یہ پیدا ہونگے فوراً تخمینہ لگا سکتے ہیں۔ علاوہ بریں جیسا کہ مینڈل نے ظاہر کیا ہم اس کا بھی تخمینہ لگا سکتے ہیں کہ کسی دی ہوئی شکل کے اصل کی طرح افزائش کرنے کے کیا امکانات ہیں۔ بہر حال اس بات کی طرف ہم بعد میں توجہ کریں گے۔

مینڈل کے سیم پر کیے ہوئے تجربوں کے متعلق یہ کہنا کافی ہو گا کہ ان سے اُس کے مٹر پر کیے ہوئے زیادہ وسیع کام کی توثیق ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے بہت سے دوسرے پودوں پر تجربہ کیے اور اس کے چند نتائج اتناقی طور پر اس کے خطوط کے اس سلسلے میں پائے جاتے ہیں جو اس نے نیا گلی (Nägeli) ماہر نباتیات کو لکھے تھے۔ شہد کی مکھیوں کی افزائش کرنے اور بارور کرانے میں بھی اُس نے بہت وقت اور توجہ مبذول کی لیکن بد قسمتی سے ان تجربوں کی دستاویز غالباً ضائع ہو گئی۔ وراثت پر دوسرا شائع شدہ کام جو ہمارے پاس ہے نرسل (Hieracium) کے چند باروری کے تجربوں پر ہے جو ایک ایسی جنس ہے جس کا اُس نے کام کرنے کے لیے اس وجہ سے انتخاب کیا کہ اُس کی متعدد اقسام قدرتی طور پر دستیاب ہوتی ہیں۔ زیادہ نمایاں اقسام کی آپس میں باروری کو کے وہ غالباً ان متعدد جنگلی اقسام میں سے چند کو حاصل کرنا اور اس طرح ان کی ابتداء اور نوعیت پر روشنی ڈالنا چاہتا تھا اس امید میں اس کو مایوسی ہوئی۔ ایک مدت تک بڑی فنی مشکلات کی وجہ سے جو ان پھولوں کی بار باروری کرانے میں پیش آئی تھیں اُسے چند ہی دوغلے حاصل کرنے میں کامیابی ہوئی۔ علاوہ بریں اُس نے جو کچھ حاصل کیا اُن کا طرز عمل بالکل اس کے برخلاف تھا جو اس نے مٹر میں معلوم کیا تھا۔ نسل میں بجائے مختلف قسم کی انواع پیدا کرنے کے وہ مثل اصل کے اُگے اور جب تک ان کو شاہدے میں رکھا گیا یہی صورت پیش آتی رہی۔ زیادہ حالیہ تحقیقات سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ ایک عجیب قسم کی اچھوت پیدائش کی وجہ سے تھا (صفحہ ۱۰۰) نہ کہ زواجوں میں ان سیراتوں کے ایک دوسرے سے بالکل جدا گانہ ہونے کی وجہ سے۔ بہر حال مینڈل اس کی بابت معلوم نہ کر سکا اور ہیڈیشیم میں اس قاعدے کی پابندی کی کوئی بھی علامت

(۳۲)

(۲۵)

نہ پانے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مایوس ہوا جو اُس نے مٹر اور سیم کے لیے درست پایا تھا۔
یا تو اس سبب سے یا دنیا مے سائنس کی اس کے کام کی طرف بالکل عدم توجہی کی وجہ سے
مینڈل نے اپنی زندگی کے بقیہ دنوں میں اپنی تجرباتی تحقیقات کو چھوڑ دیا۔ اس کی زندگی
کے آخری سال کچھ اس کی خرابی صحت اور کچھ اس کے گرجے کے حقوق پر حکومت کی مخالفت
کی وجہ سے نہایت خراب گزرے۔ اُس نے ۱۸۸۴ء میں ضعف گردے کی بیماری
کی وجہ سے انتقال کیا۔

نوٹ۔ مینڈل کے مقالے کے دوبارہ احیاء کے کچھ ہی بعد افراد کی بناوٹ
اقتسابی سیرتوں کے لحاظ سے ظاہر کرنے کے لیے عام نوعیت کے اصطلاحات کی ضرورت
محسوس ہوئی اور اسی لیے بیٹسن نے الفاظ ہم جفتہ (homozygote) اور دگر جفتہ
(heterozygote) پیش کیے۔ ایک فرد ایک دی ہوئی سیرت کے لیے اس وقت ہم جفتی
کہلاتا ہے جبکہ وہ ایسے دو زواجوں سے تیار ہوتا ہے جن میں سے ہر ایک میں وہ سیرت
موجود ہو اور ہر جفتے کے تمام زواجے انہیں سیرتوں کے حامل ہوتے ہیں جس لحاظ سے
وہ ہم جفتی ہے۔ برخلاف اس کے جب جفتہ دو ایسے زواجوں سے بنتا ہے جن میں
سے ایک میں معلوم شدہ سیرت ہے اور دوسرے میں وہ موجود نہیں ہے تو وہ زیر بحث
سیرت کے لیے دگر جفتی کہلاتا ہے۔ اور ایسے ایک دگر جفتے سے تیار شدہ صرف
نصف زواجے ہی اس سیرت کے حامل ہونگے۔ ایک فرد ایک یا زائد سیرتوں کے لیے ہم جفتی
اور ساتھ ہی ساتھ دوسری سیرتوں کے لیے دگر جفتی بھی ہو سکتا ہے۔


چوتھا باب

نظریہ حاضر و غائب

(۲۶)

حیاتیاتی علم کی ترقی کے لیے یہ خوش قسمتی تھی کہ جب مینڈل کے کام کا دوبارہ احیاء ہوا تو اس وقت حیاتیات دانوں کا ایک چھوٹا سا گروہ وراثت کے مسئلوں سے گہری دلچسپی رکھتا تھا اور وہ افزائش کے تجربوں میں خود مشغول تھے۔ ان ماہرین پر اس انکشاف کی غیر معمولی اہمیت فوراً نمایاں ہو گئی۔ مینڈل کے مقالے کی عدم واقفیت میں بھی اپنے تجربوں کے ذریعے دی ورنیز، کورینس (Correns) اور ٹشرماک (Tschermak) مشرور دوسرے پودوں پر اس کے نتائج کی توثیق کر سکے اور بیلسن نے پہلی مرتبہ جانوروں پر اس انکشاف کے اطلاق کو بتایا۔ اُس کے بعد اس بارے میں تدریجی ترقی ہوتی گئی۔ اور کئی سال کے کام کا نتیجہ یہ ہوا کہ مینڈل کے انکشاف کی بنیادی نوعیت زیادہ سے زیادہ پائیدار ہوتی گئی۔ وراثت کا خاکہ جس کو اُس نے پہلی مرتبہ بتایا۔ بہت زیادہ مختلف چیزوں پر حاوی تھا جیسے پودوں میں اونچائی - بالدار ہونا - پھولوں کا رنگ اور پھولوں کی شکل - دیرہ دانوں کی شکل اور پھلوں کی ساخت وغیرہ اور جانوروں میں پتائیوں کی پوشش کا رنگ - مرغیوں میں پروں اور کلغی کی شکل - جاپانی چوہوں کی قلابازی کی عادت اور انسان میں آنکھ کا رنگ

مختلف سیرتوں کی چند مثالیں ہیں جو تمام اسی اصول انتقال کی پابندی کرتے ہیں۔ (۲۷)
اور جوں جس زمانہ گزرتا گیا ایسی بہت سی صورتیں جو پہلے اس خاکے کے باہر تصور
کی جاتی تھیں زیادہ معلومات فراہم ہونے کے بعد بتدریج اسی کے تحت لائی گئیں۔
اس کتاب کے ابواب مابعد میں ان میں سے چند صورتوں پر بحث کی جائیگی۔ اس سے
قبل ہم مینڈال کے ابتدائی خیالات کی ایک ترمیم پر غور کریں گے جو مزید معلومات کی
بنیاد پر پیدا ہوئی ہے۔



شکل ۲

ایک معمولی اور ایک ریشمی مرغی کے پنکھ کا ایک پر اور ایک احاطی پر۔
ریشمی مرغی کے پروں کی عجیب چھدری شکل اس لیے ہے کہ اسلیوں کو
یکجا ملانے کے لیے ان میں ہاک یا اسیل نہیں پائے جاتے۔ ریشمی شکل
مطلوب ہے۔

جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں مینڈال نے خیال کیا تھا کہ زواجے میں یا تو کوئی ایک
معین چیز ایسی تھی جو غالب سیرت کے مماثل ہے یا کوئی ایک معین چیز ایسی تھی جو
مطلوب سیرت کے مماثل اور یہ کہ یہ چیزیں خواہ وہ کچھ ہی کیوں نہ ہوں کسی ایک

(۲۸) واحد زواج کے اندر ساتھ ساتھ وجود نہیں رکھ سکتیں۔ ان نامعلوم چیزوں کے لیے آئندہ ہم اصطلاح عامل استعمال کریں گے۔ تب عامل وہ ہے جو زواج میں ایسی اکائی سیرت کے مماثل ہوتا ہے جو کسی نہ کسی صورت میں جفتے کے نمونے میں ظاہر ہوتی ہے۔ مگر میں اونچا پن ایک اکائی سیرت ہے۔ ان زواجوں کو جن میں اس کی



شکل ۳۔

دو دھڑے اور ایک معمولی سادہ سدا بہار (پری مولا (primula) پھول۔
دوہری شکل سادہ کے مقابلے میں مغلوب ہے۔

نمائندگی ہوتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں اونچے پن کا عامل موجود ہے۔ زواج میں ان کی موجودگی اور ان کی منتقلی کے طریقے کے علاوہ ہم کوئی رائے ان عوامل کی نوعیت کے لیے نہیں دے سکتے۔

مینڈل کے خیالات کے مطابق اکائی سیرتوں کے ہر متبادل جوڑے کی

سہ مگر کی اس خاص مثال میں حالانکہ ایک اکائی سیرت اور ایک عامل کے مابین قطعی مطابقت ظاہر ہوتی ہے لیکن یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہمیشہ اتنی ہی نمایاں ہوگی۔ جیسا کہ بعد میں دیکھا جائیگا ایسی سیرت کا انحصار جس میں ایک ہی خاندان کے دو پودے یا جانور ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں دو یا زائد عوامل پر مبنی ہو سکتا ہے۔

غالب سیرت کے متناظر ایک عامل اور مغلوب سیرت کے متناظر دوسرا عامل موجود تھا۔ (۲۹) اور یہ کہ یہ سیرتیں اس لیے متبادل تھیں کہ کوئی زواجہ ایسے دو عوامل میں سے ایک سے زائد کا عامل نہیں ہو سکتا جن کا تعلق متبادل جوڑے سے ہے۔ برخلاف اس کے مینڈل نے فرض کر لیا تھا کہ ایسے جوڑے میں سے وہ ہمیشہ ایک یا دوسرے عامل کا عامل تھا۔ تجرباتی کام کی ترقی کے ساتھ ساتھ یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ دراصل ایسی صورتیں موجود تھیں جو ان مفروضات کی روشنی میں نہیں سمجھائی جاسکتیں۔ اس شکل کی نوعیت اور وہ طریقہ جس سے وہ پیش آتی اسی وقت بہتر طور پر سمجھ میں آئیگی جبکہ تجربوں کے ایک جھٹ پر غور کیا جائے۔ مرغیوں کی مختلف نسلوں کی تخصیص کلنی کی ایک خاص شکل سے ہوتی ہے اور کئی صورتوں میں ان کی وراثت پر احتیاط سے کام ہوا ہے۔ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ گلابیہ کلنی (شکل ۱-ب) جس کی بالائی سطح چھٹی بھٹنی دار ہوتی ہے اور جس کی نوک پیچھے کے رخ نکلی رہتی ہے عموماً گہری کنگورے دار بلند سادہ کلنی (شکل ۱-ج) پر جو بحر و دم کی نسلوں کی خصوصیت ہے غالب ہوتی ہے۔ تجربے سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ مٹریہ کلنی (شکل ۲-۱) جو ایک دبے ہوئے وسطی اور دو بلند جانبی ابھاروں پر مشتمل ہے جیسا کہ ہندوستانی اصل مرغیوں میں پائی جاتی ہے سادہ کلنی کے مقابلے میں عموماً غالب ہوتی ہے۔ اب یہ دلچسپ سوال پیدا ہوا کہ اُس وقت کیا ہوگا جبکہ گلابیہ اور مٹریہ کلنی والوں کی بازوری آپس میں کرائی جائے کیونکہ یہ دونوں سادہ کلنی والی نسل پر غالب ہیں۔ ظاہراً طور پر ایسا تصور کرنا معقول معلوم ہوا کہ دو شکلیں جو ایک ہی شکل سے متبادل ہیں ایک دوسرے سے بھی متبادل ہونگی اور معنی یہ کہ آ یا گلابیہ یا مٹریہ کلنی دونوں میں غالب ہوگی اور یہ کہ نسل میں غالب اور مغلوب کا تناسب ۳:۱ کا ہوگا۔ بہر حال تجربے کا نتیجہ بالکل ہی مختلف تھا۔ گلابیہ x مٹریہ کی (۳۰) بازوری کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایسی کلنی پیدا ہوئی جو ان دونوں سے مختلف تھی۔ اس کو اخروٹِ کلنی (شکل ۱-د) کے نام سے موسوم کیا گیا اس لیے کہ یہ شکل میں اخروٹ کے ایک نصف حصہ سے مشابہ تھی۔ یہ ایسی

شکل ہے جو عام طور پر ملایائی مرغیوں کی کلنی کی طرح ہوتی ہے۔ علاوہ ان کے




شکل ۳

مرغیوں کی کلنیاں - ۱ - مٹریہ - ۲ - گلابیہ - ۳ - سادہ - ۴ - اخروٹھیہ -

جب ان مرغیوں کی آپس میں باروری کرائی گئی تو ایک اور غیر متوقع نتیجہ حاصل ہوا۔ جیسی کہ توقع تھی نہ نسل میں تینوں شکلیں یعنی اخروٹھیہ، گلابیہ اور مٹریہ حاصل ہوئے۔ لیکن ایک معین تناسب سے سادہ کلنی والے پرند بھی پیدا ہوئے اور کئی سوچوڑوں میں جو اس طرح پیدا کیے گئے اخروٹھیہ، گلابیہ، مٹریہ اور سادہ کلنی رکھنے والی چاروں اشکال ۹ : ۳ : ۳ : ۱ کے تناسب میں نمودار ہوئیں جیسا کہ میٹڈل نے بتایا۔ اب یہ تناسب ویسا ہی ہے جیسا کہ متبادل سیرتوں کے دو جوڑوں کے لحاظ سے اصل پرند نسل میں رکھتے ہیں اور ان تناسب سے جن میں مختلف قسم کی کلنی والے نمودار ہوتے ہیں ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ

(۳۱)

اخر و ٹیہ میں دونوں غالب عناصر موجود ہیں۔ گلابیہ اور مٹریہ ہر ایک میں ایک غالب عنصر موجود ہے بدخلات ان کے سادہ کلغی



دونوں مغلوب سیرتوں کے لیے خالص ہے۔ بعد کے افزائشی تجربوں سے اس کی بالکل مطابقت ہوئی اس لیے

کہ سادہ کلغی والے ایک یا نمودار ہونے کے بعد اخرو ٹیہ گلابیہ مٹریہ سادہ

مثال اصل کی طرح افزائش کرتے رہے۔ ایک (۹) (۳) (۳) (۱۱)

یہ صورت بالکل صاف ہے مشکل اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ ہم سیرتوں کے ان دو جوڑوں کی تشریح کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس امر کو کس طرح ظاہر کریں کہ جب ایک سادہ کلغی ایک خالص گلابیہ یا ایک خالص مٹریہ کے ساتھ ایک معمولی مغلوب کی طرح عمل کرتی ہے پھر بھی یہ ان دونوں خالص پرندوں کی باہمی باروری سے نسل میں نمودار ہوتی ہے حالانکہ سینڈل کے اصول کے مطابق ان میں سے کسی میں بھی سادہ کلغی موجود نہ ہونی چاہیے۔ ان امور کو بالکل سادہ طریقے پر

سمجھایا گیا ہے اور اس کو نظریہ "حاضر و غائب" کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ (۳۲)

اس نظریے کے مطابق ایک متبادل جوڑے میں غالب پن ایک ایسی غالب سیرت کی موجودگی کی وجہ سے ہوتا ہے جو مغلوب میں غائب ہے۔ مٹر کا اونچا پودہ اس لیے اونچا ہے کہ اس کے اندر اونچائی کا عامل موجود ہے لیکن اس عامل کی عدم موجودگی میں پودہ بونا رہ جاتا ہے۔ تمام مٹر کے پودے بونے ہیں لیکن اونچا ایک بونا ہے جس میں ایک ایسا عامل موجود ہے جو اس کو اونچے پودے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بجائے اس کے کہ ایک متبادل جوڑے کی سیرتیں دو جدا گانہ عوامل کی وجہ سے ہوں ہم اب ان کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مفرد عامل کی صرف دو ممکنہ صورتوں کی وجہ سے ہے یعنی اس کی موجودگی یا عدم موجودگی۔ یہ زیادہ واضح ہو جائیگا اگر ہم تفصیلی طور پر ان کے عمل کو مرغیوں کی کلغیوں کی صورت میں دیکھیں۔ اس صورت میں ہمارا تعلق دو عوامل گلابیہ (گ) اور مٹریہ (م) کی منتقلی سے ہے جن میں سے ہر ایک کی موجودگی متبادلی ہے اس کی عدم موجودگی کے۔ گلابیہ کلغی دار پرند میں گلابیہ کے لیے عامل حاضر لیکن مٹریہ کے لیے

غائب ہے اور اسی طرح مٹریہ کلغی دار پرند میں مٹریہ کے لیے عامل موجود لیکن گلابیہ کے لیے غائب ہے۔ جب ایک ایسے دوغلہ پرند میں جو گلابیہ اور مٹریہ کی باہمی پار باروری سے حاصل ہوتا ہے۔ دونوں عوامل موجود ہوں تو نتیجہ کے طور پر ایک اخروٹیاہ پرند حاصل ہوگا۔

دالالت کی سہولت کے لیے ہم عامل کی موجودگی کو عربی اور اس کی عدم موجودگی کو متناظر فارسی حرف سے ظاہر کریں گے۔ فارسی لفظ کا استعمال صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے ایک اشارہ ہے کہ ایک خاص عامل ایک زواج یا جفتے میں غیر حاضر ہے۔ اس طرح ایک خاص گلابیہ کلغی دار پرند کی جفتی ساخت گگ گ م م سے ظاہر کر سکتے ہیں اس لیے کہ وہ ایسے دو زواجوں سے تیار ہوا ہے جن میں سے دونوں میں گگ حاضر اور م غیر حاضر تھا۔ اسی طرح ہم عامل مٹریہ کلغی دار پرند کو گگ م م سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ گلابیہ کو مٹریہ سے بارود کرنے سے ایک گگ م زواجہ اور ایک گگ م زواجہ میں ملاپ ہوتا ہے جس کا نتیجہ ایک دیگر جفتے کی تیاری ہے جس کی ساخت گگ گ م م ہوگی۔ یہاں فارسی حروف کا استعمال بتاتا ہے کہ ایسے جفتے میں گگ اور م عوامل میں سے ہر ایک کا صرف ایک ہی جز موجود ہے حالانکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک جفتے میں اگر وہ مناسب طور پر حاصل کیا جائے تو کسی عامل کے بھی دو ہرے جز موجود ہوں۔ اب جبکہ ایسی ایک مٹریہ زواجہ بناتی ہے تو جفتی خلیہ ایسے دو جفتوں میں ٹوٹ جاتا جن میں سے ایک میں گگ موجود ہوتا اور ایک جس میں نہیں ہوتا (گ) اس لیے اس کے نصف زواجوں میں گگ موجود ہوگا اور نصف زواجوں میں نہیں ہوگا (گ)۔ اسی طرح نصف زواجوں میں م موجود ہوگا اور نصف میں نہیں پایا جائیگا (م)۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک زواجہ میں گگ کے لیے م کے ساتھ یا بغیر اس کے تقسیم ہونے کے مواقع مساوی ہونگے۔ چنانچہ گگ رکھنے والے زواجہ دو قسم کے ہونگے۔ یعنی گگ م اور گگ م اور یہ مساوی تعداد میں تیار ہونگے۔ اسی طرح گگ نہ رکھنے والے زواجہ بھی دو قسم کے ہونگے۔ لیکن گگ م اور گگ م اور یہ بھی مساوی تعداد میں تیار ہونگے۔ اس لیے ہر ایک دوغلا اخروٹیاہ پرند ایک ایسا سلسلہ بنائیگا جس میں مساوی تعداد میں چار مختلف قسم کے زواجہ گگ م، گگ م، گگ م، گگ م اور گگ م ہونگے اور ایسے ن پرندوں کی افزائش سے مراد زواجوں کے ایسے

سلسلوں کو یکجا کرنا ہے۔ جب ایسا ہوگا تو چاروں اقسام میں سے کسی بھی ایک قسم کے بیٹنے کو چاروں اقسام کے کسی بھی ایک قسم کے منوی حوائن سے بارور ہونے کا مساوی موقع ہے۔ ایسی صورتوں میں کیا ہوتا ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے ایک نہایت موزوں اور سادہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے جس کو ”شطر بنجی بساط“ طریقہ کہتے ہیں۔ دو ایسے سلسلوں کے لیے جن میں سے ہر ایک چار مختلف قسم کے زواجوں پر مشتمل ہو ہمیں ۱۶ مساوی خانوں والے ایک مربع کی ضرورت ہے۔ زواجی سلسلہ کے چار اقسام پہلے افقی طور پر چار چار خانوں کے چاروں جھٹوں میں لکھے جاتے ہیں تاکہ یہ سلسلہ چار مرتبہ تکرار پائے۔ پھر ان کو انتصابی طور پر چار مرتبہ لکھتے ہیں اور اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ایک ہی رتبہ رکھا جائے۔ اس طرح سادہ طریقے پر تمام ممکنہ مشتقات کی ان کے موزوں تناسب کے ساتھ نمائندگی ہوتی ہے۔ اس طریقے کے ہمارے سلسلے گ م، گ م، گ م، گ م پر اطلاق کو شکل ۷ میں ظاہر کیا گیا ہے اور ۱۶ خانے ان مختلف قسم کے

(۳۴)

گ م گ م اخروٹ	گ م گ م اخروٹ	گ م گ م اخروٹ	گ م گ م اخروٹ
گ م گ م اخروٹ	گ م گ م اخروٹ	گ م گ م اخروٹ	گ م گ م اخروٹ
گ م گ م اخروٹ	گ م گ م اخروٹ	گ م گ م اخروٹ	گ م گ م اخروٹ
گ م گ م اخروٹ	گ م گ م اخروٹ	گ م گ م اخروٹ	گ م گ م اخروٹ

جفتوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو اس طرح بنتے ہیں اور ان کے تناسب بھی بتائے گئے ہیں۔ جیسا کہ شکل ۷ ظاہر ہے ۹ جفتوں میں گ اور م دونوں موجود ہیں جن میں ان دونوں عوامل یا کسی ایک کے دوہرے یا منفرد جز موجود ہیں۔ ایسے تمام پرند اخروٹ کلفنی ولے ہونگے۔

۱۶ جفتوں میں سے تین میں گ ہوگا لیکن م

شکل ۷


نقش جو گلابیہ x مٹریہ کلفنی دار پرندوں کی باہمی باروری سے حاصل شدہ نسل کو ظاہر کرتا ہے۔

غیر حاضر رہیگا اور یہ گلابیہ کلنی والے ہونگے۔ پھر تین میں م حاضر و گ غیر حاضر ہوگا اس لیے ان کا مٹر یہ کلنی والے ہونا لازمی ہے۔ آخر میں ۱۶ میں سے ایک میں نہ تو گ ہوگا اور نہ م۔ یہ نہ تو گلابیہ کلنی والا اور نہ مٹر یہ کلنی والا ہوگا۔ اس لیے وہ کچھ اور ہونا چاہیے۔ دراصل یہ سادہ کلنی والا ہے۔ یہ کیوں سادہ کلنی والا ہو اور کیوں کسی دوسری قسم کا نہ ہو یہ ہمیں مختلف شکلوں کی کلنیوں کی نوعیت کی بابت پہلے سے معلوم ہے۔ چونکہ گلابیہ کلنی سادہ کلنی پر غالب ہے اس لیے حاضر اور غائب نظریے کے مطابق ایک گلابیہ کلنی ایک سادہ کلنی والا ہے جس میں ایک مزید عامل موجود ہے جو سادہ کلنی کو گلابیہ کلنی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر ہم "گلابیہ" عامل کو ایک گلابیہ کلنی والے پرندے سے ہٹا دیں تو چھپی ہوئی سادہ کلنی ظاہر ہوگی۔ اسی طرح ایک مٹر یہ کلنی ایک سادہ کلنی ہے جس میں ایک ایسا مزید عامل موجود ہے جو سادہ کلنی کو مٹر یہ میں تبدیل کر دیتا ہے اور اخروٹیہ ایک سادہ کلنی ہے جس میں دو زائد ترمیمی عوامل موجود ہیں۔ دراصل کلنی کا سادہ پن ان تمام کلنیوں میں پوشیدہ ہے اور اگر ہم پورے طور پر ان کی جفتی ساخت کو لکھیں تو ہمیں ایک اخروٹیہ کو گ گ م م م س س، ایک گلابیہ کو گ گ م م م س س، ایک مٹر یہ کو گ گ م م م س س اور ایک سادہ کلنی والے کو گ گ م م م س سے ظاہر کرنا ہوگا۔ گلابیہ اور مٹر یہ کی باہمی باروری کا نتیجہ متعلقہ عوامل کو خلط ملط کر دینا ہے اور افتراق کے اصول کے مطابق چند ایسے جفتے تیار ہوتے ہیں جن میں ترمیمی عوامل گ اور م میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہوتا اور تب سادہ سیرت نمایاں ہو جاتی ہے۔

(۳۵)

اس سلسلے پر کام کرنے والے آج کل پوری طرح نظریہ حاضر و غائب کو مانتے ہیں۔ یہ نہ صرف ایک سادہ تشریح اس خاص حقیقت کی فراہم کرتی ہے کہ ہندوئی وراثت کی تمام صورتوں میں ہم اکائی سیرتوں کو قبادل جوڑوں کی شکل میں بیان کر سکیں بلکہ جیسا کہ ہمیں بعد میں حوالہ دینے کا موقع ملے گا یہ ایک حل اس طریقے کا بتاتا ہے جس کے تحت جنگلی اولین نمونوں سے کاشت کے پودوں

اور پالتو جانوروں کی مختلف اقسام حاصل ہوئی ہیں۔
اس موضوع کو چھوڑنے سے قبل ہم ان چند تجربوں کی جانب توجہ منعطف کراتے ہیں
جو اس بات کی خامی توثیق کرتے ہیں کہ گلابیہ کلغی دراصل ایک سادہ کلغی ہے جس میں گلابیہ پن
کا ایک ترمیمی عامل شریک ہو گیا ہے۔ یہ دلیل پیش کی گئی کہ اگر ہمیں کلغی کا ایسا نمونہ
مل جائے جس میں سادہ پن کا عامل موجود نہ ہو تب ایسے پرند کی ایک گلابیہ کلغی والے
سے پار باروری کرانے پر اگر دراصل کلغی کا سادہ پن گلابیہ میں پوشیدہ ہے تو ہمیں
نہ نسل میں ایسی پار باروری سے چند سادہ کلغی والے حاصل ہونے چاہئیں خوش قسمتی
سے ایسی کلغی ہمیں بریڈ امرغی میں ملگئی جو ہالینڈ میں کثرت سے ملتی ہے۔ اس مرغی
کو عموماً بے کلغی والی کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں کلغی کی جگہ چھوٹے نوکدار پرپائے جاتے ہیں۔




شکل ۱

مرغیوں کی کلغیاں - ۱ اور ب - ن مرغیاں گلابیہ x بریڈا سے حاصل شدہ۔
ج - سادہ x بریڈا کے ملاپ سے حاصل شدہ ایک ن مرغی - د - بریڈا مرغی کا سر

(شکل ۵ د)۔ دراصل اس میں کلنی کا صرف ایک نشان کلنی بافت کے دو نہایت چھوٹے جانبی آبھاروں کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ اس نسل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے قرنی نتھنے نہایت نموشدہ ہوتے ہیں اور یہ خصوصیت غالباً کلنی کے تقریباً بالکل غائب ہونے سے مربوط ہے۔ تجربہ کرنے میں پہلا مرحلہ یہ تھا کہ بریڈا میں کلنی کے سادہ پن کے حامل کی عدم موجودگی کو ثابت کریں۔ سادہ کلنی والے پرندے سے بریڈا کی باروری کرنے پر نر پرند ایک بڑی کلنی ظاہر کرتے ہیں جو دوسرے سادہ کلنی کی شکل کی ہے اس میں دونوں حصے سامنے کی جانب آپس میں مل گئے ہیں لیکن سر کے پچھلے حصے میں ایک دوسرے سے ہٹتے گئے ہیں (شکل ۵ ج)۔ بریڈا میں دوسرے پن کا ایک عنصر معمولی سادہ کلنی کے سادہ پن پر غالب ہے۔ لیکن اس میں سادہ کلنی کا عامل موجود نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جوہنی اسے سادہ کلنی والے سے بارور کر کے داخل کیا جائے تو کلنی ایک بڑی جسامت حاصل کر لیتی ہے اور یہ شکل میں خالص بریڈا کے اندر اس کی تقریباً بالکل ہی عدم موجودگی کے لحاظ سے

(۳۷)



بالکل نمایاں ہو جاتی ہے۔ اب جبکہ بریڈا کی باروری گلابیہ کے ساتھ کرائی جاتی ہے۔ تو دوہرا پن سادہ پن پر اور گلابیہ کلنی کی عدم موجودگی پر غالب ہے اور نسل جو اس طرح حاصل ہوئی ہے دوہرے گلابیہ کلنی والے پرندوں پر مشتمل ہوتی ہے (شکل ۵ ب)۔ ایسی مرغیوں کی آپس میں باروری اور افزائش کرنے پر بریڈا۔ دوہری گلابیہ۔ گلابیہ۔ دوہری سادہ اور سادہ کلنی والی مرغیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اپنے سابقہ تجربوں سے ہمیں معلوم ہے کہ سادہ کلنی والے بریڈا سے نہیں آ سکتے اس لیے کہ

ایک بریڈ اکلنی جس میں سادہ کلنی کا حامل داخل کر دیا گیا ہے کسی طرح بریڈ انہیں رہ سکتی۔ اس لیے یہ لازمی طور پر گلابیہ سے آنی چاہیے۔ اس طرح ہمارے اس خیال (۳۸) کی توثیق ہوتی ہے کہ گلابیہ دراصل ایک سادہ کلنی ہے جس میں ایک غالب تربیتی عامل (گ) پائی جاتی ہے جس کی موجودگی اس کو گلابیہ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اس لیے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ حاضر و غائب کے لیے کافی تجرباتی شہادت موجود ہے۔ البتہ چند سال سے اس پر چند امور کے سلسلہ میں کافی تنقید ہوئی ہے۔ جن پر بعد کے باب میں روشنی ڈالی جائیگی۔ اس نظریہ میں جو تخیلات شامل ہیں وہ پوری طرح صحیح ہوں یا نہ ہوں تاہم یہ ہمیں اپنے حوال کے لیے ترقیم کا ایک سادہ اور کارآمد نظام فراہم کرتی ہے اور مختلف ایسے مسائل جن پر بعد کے ابواب میں بحث کی گئی ہے ہم اسی کی رقوم میں بیان کریں گے۔

پانچواں باب

عوامل کا باہمی عمل

(۳۹)

اب ہم ایک ایسی نوبت پر پہنچ گئے ہیں کہ جس پر جاندار عضویہ کے متعلق ایک معین تصور اور اصول پیش کرنا ممکن ہے۔ پلوہ یا جانور ایک ایسی جاندار ہے جس کے خواص کو بڑی حد تک اکائی سیرتوں کے رقوم میں بیان کیا جاسکتا ہے اور ایسی اکائی سیرتوں کی زیادہ یا کم تعداد میں رکھنے ہی سے یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ ہم ایک فرد کو دوسرے سے بالکل جدا اور نمایاں کر سکتے ہیں۔ ان اکائی سیرتوں کی نمائندگی زواجی میں معین عوامل کے ذریعے ہوتی ہے جو وراثت کے عمل میں غیر منقسم کل کی طرح برتاؤ کرتے اور ایک معین خاکے کے مطابق منتشر رہتے ہیں۔ ایک اکائی سیرت یا دوسری کے لیے حامل زواجی کے اندر موجود یا غیر موجود ہوتا ہے یہ وہاں یا تو کلیتہً موجود ہوتا چاہیے یا بالکل غائب۔ بہر حال یہ صورت ہے جس تک حالیہ تجربوں کی وجہ سے ہم پہنچ سکے ہیں۔ لیکن اس بارے میں ہم بالکل تاریکی میں ہیں کہ ان عوامل کی نوعیت کیا ہے اور یہ زواجی میں کن حالات کے تحت موجود رہتے ہیں اور کس طریقہ پر جفتہ میں وہ اپنے مخصوص اخراجات کو پیدا کرتے ہیں۔

مرغیوں کی کلغی کی مثال اس اہم سوال کو چھیڑتی ہے کہ کس حد تک جفتہ کے اندر مختلف عوامل ایک دوسرے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ گلابیہ اور مٹریہ عوامل جدا گانہ کل ہیں اور ان میں سے ہر ایک جب تنہا موجود ہو تو ایک سادہ کلغی پر

(۴۰)

بالکل نمایاں اور مخصوص اثر ڈال کر حالات کے لحاظ سے اس کو ایک گلابیہ یا مٹریہ کلغی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لیکن جب ایک ہی جفتہ کے اندر دونوں موجود ہوں تو ان کا مشترکہ اثر ایک اخروٹھ کلغی کی تیاری ہے اور یہ ایک ایسی کلغی ہے جو ان دونوں سے بالکل جدا ہوتی اور کسی طرح بھی ان کے بین بین نہیں ہوتی۔ مینڈل کے پیش نظر ان عوامل کے ایک دوسرے پر اثر کا کوئی سوال نہیں تھا۔ اس لیے کہ اس نے ایسی سیرتوں پر کام کیا جو پودہ کے مختلف حصوں پر اثر انداز تھیں۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ جو عامل پھول میں رنگ پیدا کرتا ہو پھلی کی شکل پر بھی اثر انداز ہوتا یا یہ کہ پودے کی اونچائی پر ایسے عامل کی موجودگی یا عدم موجودگی کا اثر ہوتا جس کی وجہ سے پختہ بیج کی شکل کا تعین ہوتا ہے۔ لیکن جب متعدد عوامل ایک ہی ساخت پر اثر انداز ہو سکتے ہوں تو یہ فرض کرنا واجب ہے کہ یہ ان اثرات کے لحاظ سے ایک دوسرے پر اثر انداز ہونگے جو ان کی بہ یک وقت موجودگی جفتہ پر اثر ڈالتی ہے۔ مٹریہ اور گلابیہ عوامل میں سے ہر ایک از خود سادہ کلغی کی معین تبدیلی کا باعث ہوتا ہے لیکن جب یہ دونوں جفتہ کے اندر خواہ اکہرے یا دوسرے بخر کی شکل میں موجود ہوں تو وہ تبدیلی جو اس طرح ہوتی ہے اس تبدیلی سے بالکل مختلف ہے جو ان میں سے کسی ایک کی وجہ سے ہوتی ہے جبکہ وہ تنہا موجود ہو۔ اس طرح ہم سیرتوں کے اس تصور پر پہنچتے ہیں جو اپنے اظہار کے لیے جفتہ میں کے ایک سے زائد عوامل پر منحصر ہوتے ہیں۔ اور اس باب میں ہم ان چند مظاہر پر غور کریں گے جو جداگانہ اور نمایاں عوامل کے ایسے باہمی عمل کا نتیجہ ہیں۔

ایک نہایت دلچسپ اور مفید صورت جس میں جداگانہ عوامل کے تفاعل کا مظاہر کیا گیا ہے میٹھے مٹر کی ہے۔ تمام سفید میٹھے مٹر سفیدی کے لحاظ سے مثل اصل اُگتے ہیں (۹۱) اور مختلف سفید مٹر والے پودوں کی آپس میں باروری سے صرف سفید ہی حاصل ہونگے خواہ وہ ن میں یا بعد کی مسلسل نسلوں میں پیدا ہوں۔ لیکن سفید میٹھے مٹر کی چند قسمیں ایسی بھی ہیں جن کی باہمی باروری سے صرف رنگین پھول پیدا ہوتے ہیں۔ مختلف صورتوں میں رنگ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن اس وقت اپنے موجودہ اغراض کے لیے ہم ایک ایسی صورت پر غور کریں گے جس میں رنگ سرخ ہے۔ جب ایسے سرخ پھول والوں کو طبعی طریقے سے خود بارور ہونے کا موقع دے کر ان سے حاصل شدہ

۱۲ اب اور ۱۲ ب ہونگے۔ اس لیے ن، پودوں کی ساخت ۱۲ اب ب ہوتی چاہیے۔ چونکہ ایسا پودہ دو عوامل کے لیے دگر جفتی ہوتا ہے۔ اس لیے وہ چار قسم کے زواجوں ۱۲ اب، ۱۲ ب، ۱۲ ب، ۱۲ ب کا ایک سلسلہ مساوی تعداد میں پیدا کریگا (صفحہ ۳۰) مختلف نمونوں کے جفتے حاصل کرنے کے لیے جو ایسے زیرہ وائل کے ایک سلسلہ اور بیضدانوں کے ایک مائل سلسلے کے ملاپ سے بنتے ہیں۔ ہمیں ایسی ہی "شطرنج بساط" کا طریقہ استعمال کرنا چاہیے جو مرغیوں کی کلیفوں کی صورت میں استعمال کی گئی تھی۔ اس شکل (شکل ۷) کے امتحان سے ظاہر ہوگا کہ ۹ خانوں میں سے ۹ میں ۱۲ اور ۱۲ ب دونوں موجود ہونگے برخلاف ان کے ۷ میں آیا صرف ۱۲ یا صرف ۱۲ ب موجود ہوگا یا کوئی بھی نہیں۔ بالفاظ دیگر دونوں سفید بیٹھے مٹر کی نوعیت کے اس خیال کے مطابق ہمیں یہ توقع کرنی چاہیے کہ ن نسل میں رنگین اور سفید پھول ۹:۷ کی نسبت میں نمودار ہونگے اور جیسا کہ ہم سابق میں دیکھ چکے ہیں تجربہ سے کبھی یہی نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ شکل کا مزید مطالعہ کرنے سے معلوم ہوگا کہ تمام رنگین پودے یکساں ساخت کے نہیں ہیں بلکہ اپنی جفتی ساخت کے لحاظ سے چار قسم کے ہوتے ہیں یعنی ۱۲ اب ب

(۴۳)

۱۲ اب	۱۲ اب	۱۲ اب	۱۲ اب
۱۲ اب	۱۲ اب	۱۲ اب	۱۲ اب
۱۲ اب	۱۲ اب	۱۲ اب	۱۲ اب
۱۲ اب	۱۲ اب	۱۲ اب	۱۲ اب

شکل ۷

خاکہ وہ ایسے بیٹھے مٹروں سے چل شدہ ن نسل کو بتاتا ہے جو ایک رنگین ن نسل بناتے ہیں۔

۱۲ اب ب، ۱۲ اب ب، ۱۲ اب ب چونکہ ۱۲ اب ب ہمہ جفتی ہے اور ۱۲ ب دونوں کے لیے اس لیے تمام زواجوں میں جو وہ تیار کرتا ہے یہ دونوں عوامل موجود ہونے چاہئیں اور اس لیے ایسے پودے شروع رنگ کو مثل اصل کے افزائش کرنا چاہیے۔ ایک پودہ جس کی ساخت ۱۲ اب ب ہو عامل ۱۲ کے لیے ہمہ جفتی لیکن ب کے لیے دگر جفتی ہوگا۔ ان میں سے تمام زواجوں کے اندر ۱۲ ہوگا لیکن صرف نصف میں ہی ب موجود ہوگا یعنی وہ مساوی تعداد میں ۱۲ اب اور ۱۲ ب زواج

پیدا کریگا۔ زواجوں کے دو ایسے سلسلے آپس میں ملنے کے بعد ایک ایسی نسل بناؤنگے جو لا ۲۲ ب ۲ لا ۲۲ ب ۲ اور لا ۲۲ ب ۲ پر مشتمل ہوگی یعنی سرخ اور سفید ۳:۱ کے تناسب سے ہونگے۔ بالآخر ۱۱ ب ۱۱ ب ساخت کے سرخ جفتے وہی ساخت رکھینگے جو دو سفید کے ملاپ سے بننے والے اصل سرخ کی ہوتی ہے اور اس لیے جب ان کو آگایا جاتا ہے تو سرخ اور سفید ۹:۱ کے تناسب میں حاصل ہونگے۔ سرخ کی ان تینوں اقسام کی موجودگی کو تجربہ کے ذریعے بتایا گیا تھا اور جس نسبت میں یہ حاصل ہوئے تھے وہ نظری بیان سے مطابقت رکھتی ہے۔

اس نظریہ کی مزید آزمائش مختلف ایسے ن سفید پھولوں کی خصوصیات کے امتحان سے کی گئی جو ایک رنگین پودے سے حاصل ہوئے تھے اور یہ پودہ خود دو سفید پودوں کے ملاپ سے بنا تھا۔ جیسا شکل ۷ سے ظاہر ہے یہ اپنی ساخت کے لحاظ سے پانچ مختلف اقسام کے ہیں یعنی ۲۲ ب ۲، ۱۱ ب ۱۱، ۱۱ ب ۱ اور ۱۱ ب ۱ اور ۱۱ ب ۱۔ اور چونکہ خود باروری پر ان میں سے تمام سوائے سفید کے کوئی دوسرے نہیں اُگاتے تو یہ ضروری معلوم ہوا کہ ان کی خصوصیات کو دوسرے طریقے سے جانچا جائے اور طریقہ جو اختیار کیا گیا وہ ان کی آپس میں باروری تھی۔ یہ ظاہر ہے کہ جب ایسا کیا جائے تو ہمیں مختلف صورتوں میں مختلف نتائج کی توقع کرنی چاہیے۔ اس طرح دو ایسے سفید کے ملاپ سے جن کی ساخت ۱۱ ب ۱ اور ۱۱ ب ۱ ب تھی صرف رنگین پودے حاصل ہونے چاہئیں اس لیے کہ یہ دونوں سفید اُسی ساخت کے ہیں جیسے کہ وہ دونوں سفید جن سے تجربہ شروع کیا گیا تھا۔ برخلاف اس کے ۱۱ ب ۱ ب ساخت کے ایک سفید اور کسی دوسرے سفید کے ملاپ سے سوائے سفید کے دوسرے کوئی حاصل نہیں ہو سکتے اس لیے کہ کسی سفید میں بھی ۱۱ اور ۱۱ دونوں موجود نہیں ہوتے ورنہ وہ سفید نہیں رہیگا۔ اور ۱۱ ب ۱ ب ساخت کا پودہ اس متمم عامل کو بہم نہیں پہنچا سکتا جو رنگ کی پیدائش کے لیے ضروری ہے۔ پھر ۱۱ ب ۱ اور ۱۱ ب ۱ ب ساخت کے دو سفید کو جب ملایا جائے تو رنگین اور سفید پھول دونوں حاصل ہونے چاہئیں سفید بمقابلہ سرخ کے تعداد میں تین گنا رہیں گے۔ مزید تفصیل میں گئے بغیر

یہ کہا جاسکتا ہے کہ نسل کے سفید پھولوں کی باہمی باروری کے طویل سلسلوں کے نتائج نظری
توجیح سے زیادہ تر مطابقت کرتے ہیں۔

(۴۵) ان متعدد تجربوں سے جو شہادت فراہم ہوئی اس کی روشنی میں اس نتیجہ سے
احتراز کرنا ناممکن ہے کہ میٹھے مٹر میں رنگ کے نمودار ہونے کا انحصار ایسے دو عوامل
کے باہمی عمل پر ہے جو مینڈلی وراثت کے معمولی خاکہ کے مطابق جداگانہ طور پر منتقل
ہوتے ہیں۔ یہ عوامل کیا ہیں یہ ابھی تک ایک زیر بحث مسئلہ ہے۔ کیمیائی نوعیت کی حالیہ
شہادت یہ بتاتی ہے کہ پھول کے اندر رنگ دو معین مادوں کے باہمی عمل کا نتیجہ ہے :-
(۱) ایک بے رنگ "کروموجن" یا رنگین اساس اور (۲) ایک ایسا خمیر جو کروموجن
کے عمل کا کام دیتا ہے اور ایک قسم کے عمل تکسید کو جاری کر کے ایک رنگین مادہ
کے بنانے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن آیا کہ یہ دونوں اجسام ایسی ہی حالت میں
زواجوں کے اندر موجود رہتے ہیں یا کسی اور شکل میں اس بات کا تصفیہ کرنے
کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔

میٹھے مٹر میں رنگ کی نوعیت کی وضاحت کے بعد اسی قسم کے مظاہر
بعض دوسرے پودوں میں بھی دیکھے گئے خاص طور پر اسٹاکس (stocks)

اسنیپ ڈرگین (Snapdragon) اور آرکڈز (Orchids) میں ملتے ہیں۔

لیکن اس قسم کے مظاہر صرف پودوں کی حد تک محدود نہیں ہیں۔ مرغیوں کے
پروں کے رنگ پر تجربوں کے ایک سلسلہ کے دوران میں یہ ایک حد تک ظاہر ہوا
کہ مختلف سفید نسلوں میں سفید رنگ ہمیشہ ایک ہی سبب کی وجہ سے نہیں ہوتا۔
اس لحاظ سے سفید ریشمی مرغی کی ایک ایسے خالص سفید نسل کے مرغی سے باروری کرائی
گئی جو سفید ڈورکنگ سے حاصل ہوا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے پہلے سے
یہ دیکھا جا چکا تھا کہ وہ رنگ کے لیے سادہ طور پر مغلوب ہیں۔ جب ان دونوں کی
باہمی باروری کرائی گئی تو صرف کامل رنگین پرند ہی حاصل ہوئے میٹھے مٹر کی صورت
کے مماثلت سے یہ توقع کی گئی تھی کہ ایسے ن رنگین پرندوں کی باہمی باروری سے
ایک نسل پیدا ہوگی جس میں رنگین اور سفید پرند ۹:۷ کے تناسب میں پائے

(۴۶)

جائینگے اور جب تجربہ کیا گیا تو حقیقت میں یہی صورت ظاہر ہوئی۔ علم کی ترقی کے

ساتھ ساتھ اس کا امکان ہے کہ پودوں اور دوسرے جانوروں میں بھی اس نوعیت کی مزید نمایاں مثالیں دستیاب ہوں۔

ان تجربوں کے موضوع کو چھوڑنے سے قبل اس امر کی طرف توجہ منقطع کرانی ہے کہ ۹:۱ کا تناسب دراصل ۹:۳:۳:۱ کا ہے جن میں آخری تین ارقام کے مابین اس خاص حالت کی وجہ سے تمیز نہیں کی جاسکتی کہ ان میں سے کوئی بھی عامل بغیر دوسرے کی اعانت کے ایک نمایاں اثر پیدا نہیں کر سکتا۔ اور ہم اس امر پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ اگرچہ کہ یہ دونوں عوامل اس طرح ایک دوسرے پر باہم عمل کرتے ہیں۔ پھر بھی یہ بالکل جداگانہ طور پر منتقل ہوتے ہیں اور یہ عمل معمولی مینڈلی خا کے مطابق ہوتا ہے۔

جداگانہ عوامل کے تفاعل کے مظاہرہ کے لیے بالکل ابتدائی تجربوں میں سے

چند وہ ہیں جو فرانسیسی ماہر حیوانیات کیٹو ٹینو (Cuenot) نے چوہوں کے

پوششی رنگوں پر کیے۔ یہ بتایا گیا کہ بعض صورتوں میں آگوٹی جو رنگ میں معمولی جنگلی خاکستری

چوہے کا رنگ ہے ابرص سفید قسم کے

چوہوں کے رنگ پر غالب ہے یعنی ایسی باہری

کی نسل آگوٹی اور ابرص چوہوں کے

۱:۳ تناسب پر مشتمل ہوگی لیکن دوسری

صورتوں میں ابرص اور آگوٹی کی باہمی باروری

سے مختلف نتائج حاصل ہوئے۔ مثل پہلے کے

نسل میں صرف آگوٹی حاصل ہوئے مگر ن

نسل تین نمایاں نمونوں پر مشتمل تھی یعنی آگوٹی۔ ابرص اور سیاہ چوہے۔ اب سوال

یہ ہے کہ یہ نیا نمونہ کہاں سے حاصل ہوا؟ اس کا جواب بالکل سادہ ہے۔ ابرص پر رکھا


دراصل ایک سیاہ چوہا تھا۔ لیکن اس میں وہ عامل موجود نہیں تھا جس کے بغیر رنگ

مخودار نہیں ہو سکتا اور اس لیے چوہا ابرص رہا۔ اگر ہم اس عامل کو ج سے ظاہر

کریں تب ایک سفید چوہے کی بناوٹ ج ج ہونی چاہیے اور ایک رنگین چوہے

کی بناوٹ ج ج یا ج ج ہو سکتی ہے بموجب اس کے کہ وہ نسل اصل رنگ کے

بچے دے یا سفید چوہے پیدا کرے۔ ابتداء میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ آگوٹی سیاہ



۱۶ مربعوں میں سے ۹ میں ج اور ق علاوہ س کے موجود ہونگے۔ ایسے جانوروں کا اگوٹی ہونا لازمی ہے۔ تین خانوں میں ج موجود ہے لیکن ق نہیں ہے ایسے جانور رنگدار ہونے چاہئیں لیکن چونکہ ان میں ترمیمی اگوٹی عامل موجود نہیں ہوتا اس لیے ان کا رنگ سیاہ ہوگا۔ بقیہ چار مربعوں میں ج موجود نہیں ہے اور اس رنگ کو پیدا کرنے والے عامل کی عدم موجودگی میں ان تمام کو سفید ہونا چاہیے نظریہ کا اقتضاء یہ ہے کہ اگوٹی۔ سیاہ اور ابرص تینوں جماعتیں ن ہیں ۹ : ۳ : ۳ کے تناسب سے ہونی چاہئیں۔ تجربہ سے ظاہر ہوا ہے کہ صرف یہی جماعتیں ہیں جو نمودار ہوتی ہیں اور یہ کہ وہ تناسب جن میں یہ پیدا ہوتی ہیں نظری توقعات سے تسری مطابقت رکھتی ہیں مختصراً اس صورت کی توجیہ یہ ہے کہ تمام جانور سیاہ ہیں اور یہ کہ دو عوامل کی موجودگی یا عدم موجودگی سے بحث کر رہے ہیں یعنی ایک رنگ پیدا کرنے والا (ج) اور ایک رنگ تبدیل کرنے والا (ق) اور یہ دونوں ایک طرح سے ایک سیاہ زیر طبق پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ن نسل دراصل چار جماعتوں پر مشتمل ہوتی ہے یعنی اگوٹی۔ سیاہ۔ ابرص اگوٹی اور ابرص سیاہ جو ۹ : ۳ : ۳ : ۱ کے تناسب میں ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ رنگ پیدا کرنے والے ج اور رنگ تبدیل کرنے والے ق کی عدم موجودگی سے کوئی نمایاں نتیجہ پیدا نہیں ہو سکتا اس لیے تناسب کے آخری دو جماعتوں میں تمیز نہیں کیا جاسکتا اور تب ن نسل ۹ : ۳ : ۳ : ۱ تناسب کی چار جماعتوں کے بجائے ۹ : ۳ : ۲ تناسب کی تین جماعتوں پر مشتمل ہوگی۔

اس توجیہ کی ابرص جانوروں پر تجربہ کر کے مزید آزمائش کی گئی۔ اس نوعیت کے ایک ن خاندان میں تین اقسام ہونی چاہئیں یعنی ابرص جانور جوق (کے لیے ہمہ جفتی ہوں) (ج ج ق ق س س) ابرص جانور جوق کے لیے دگر جفتی ہوں (ج ج ق ق س س) اور ابرص جانور بغیر ق کے (ج ج ق ق س س)۔ یہ ابرص جانور ایسے ہی ہیں جیسی کہ عکاسی تختیاں جن کا تعریہ ہوا ہے لیکن جن کو نمایاں اور صاف نہیں کیا گیا۔ ان کے مضمرات بالکل مختلف ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ تمام ظاہر بالکل یکساں معلوم ہوتے ہیں لیکن اس کا امتحان صرف اس طرح ہو سکتا ہے کہ ان پر ایک رنگ پیدا کرنے والے سے عمل کرایا جائے۔ چوہوں اور خرگوشوں میں وہ مضمر چیزیں

کے لیے ہم جانچ کرنا چاہتے ہیں عامل ق کی موجودگی یا عدم موجودگی ہے اور رنگ کے نو کے لیے ہمیں عامل ج داخل کرنا چاہیے۔ اس لیے رنگ پیدا کرنے والے میں ج موجود ہونا چاہیے لیکن ق موجود نہ ہو۔ بالفاظ دیگر اس کو ایک ہم جفتی سیاہ چوہا یا خرگوش ج ج ق ق س س ہونا چاہیے۔ چونکہ ایسا جانور ج کے لیے خالص ہوتا ہے تب اس کی کسی ابرص جانور سے باروری کرانے پر صرف رنگدار بچے پیدا کرنا چاہیے اور چونکہ اس میں ق موجود نہیں ہے تو اس کے بچوں میں اگوٹی جانوروں کی پیدائش کو ابرص جانوروں میں ق کی موجودگی سے منسوب کرنا چاہیے۔ اس طریقہ پر جانچ کرنے سے ن ابرص جانوروں کے لیے جیسے کہ توقع تھی یہ ثابت ہوا کہ وہ تین قسم کے ہوتے ہیں: (۱) وہ جن سے صرف اگوٹی حاصل ہوئے یعنی جوق کے لیے ہم جفتی آتھے۔ (۲) وہ جن سے اگوٹی اور سیاہ تقریباً مساوی تعداد میں حاصل ہوئے یعنی جوق کے لیے دگر زواجی تھے اور (۳) وہ جن سے صرف سیاہ حاصل ہوئے یعنی ان میں ق موجود نہ تھا۔

حالانکہ ابرص جانور خواہ وہ چوہے۔ خرگوش۔ موش یا دوسرے جانور ہوں برصیت کے لحاظ سے مثل اصل پیدائش کرتے ہیں اور حالانکہ برصیت رنگ کے مقابلہ میں سادہ مغلوب کی طرح عمل کرتا ہے۔ پھر بھی ابرص جانور مختلف اقسام کے ہو سکتے ہیں۔ درحقیقت اتنی ہی قسم کے ابرص بچے پائے جاتے ہیں جتنے کہ رنگین اور ابرص جانوروں کی یہ تمام مختلف اقسام جب آپس میں بارور کی جائیں تو یہ مختلف رنگین عوامل وراثت کی مینڈلی اسکیم کے مطابق منتقل ہوتے ہیں اور اس کے باوجود ظاہری نتیجہ صرف ابرص جانور ہی ہیں۔ برصیت کے پردہ میں ہر وقت مختلف رنگ (۵۰) کے عوامل کا وہ افتراق ہوتا ہے جس کی وجہ سے تمام اقسام کی رنگدار شکلیں پیدا ہونگی اگر رنگ پیدا کرنے والا ضروری عامل موجود ہوگا۔ لیکن اگر ایک خالص رنگدار جانور سے باروری کر کے رنگ پیدا کرنے والا عامل ان کے اندر داخل کروایا جائے تب بالآخر ان کی ساخت کی مختلف اقسام ظاہر ہو سکتی ہیں۔

اب تک ہم ایسی صورتوں پر بحث کرتے رہے جن میں ایک خصوصیت کی پیدائش کا انحصار دو عوامل کے تفاعل پر ہوتا ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چند خصوصیات کے انہار کے لیے عوامل کی زیادہ تر تعداد کا بیک وقت موجود ہونا ضروری ہو

اور جس سوئڈر میں نے بتایا کہ دس ہفتوں والے خاص پودوں میں ایک ایسی سیرت موجود ہے جو اس وقت تک نمودار نہیں ہوتی جب تک کہ تین جداگانہ عوامل کا تفاعل نہ ہو۔ رنگین پودے یا تو روئیں دار ہو سکتے ہیں جن کے تنے اور پتیاں چھوٹے روؤں سے ڈھکی رہتی ہیں یا ان پر روؤں کی پوشش بالکل ہی موجود نہ ہو اور ایسی صورت میں ان کو آئلس کہتے ہیں۔ روئیں دار ہونا آئلس پن پر غالب ہوتی ہے۔ یعنی ایک ایسا معین عامل ایسا ہوتا ہے جو اگر موجود ہو تو آئلس پودہ کو روئیں دار پودے میں تبدیل کر دے سکتا ہے۔ لیکن ان خاندانوں میں جہاں رنگدار اور سفید پودے موجود ہوں تو سفید ہمیشہ آئلس ہوتے ہیں برخلاف ان کے رنگدار پودے روئیں دار یا بلا روئیں دار ہو سکتے ہیں۔ ان پودوں میں مثل میٹھے مٹر کے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ رنگ کا انحصار دو جداگانہ عوامل کے تفاعل پر ہوتا ہے۔ اس طرح روئیں داریت تین جداگانہ سیرتوں پر منحصر ہوتی ہے اور کوئی پودہ اس وقت تک روئیں دار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں روئیں دار عامل منجملہ دونوں رنگین عوامل کے موجود نہ ہو۔ روئیں دار سیرت پیدا کرنے کے لیے ان تینوں عوامل کی موجودگی ضروری ہے حالانکہ ہمیں اب تک اس کا ذرا بھی علم نہیں کہ یہ صورت کس طرح پیدا ہوتی ہے۔

(۵۱) عوامل کے مابین تفاعل کی ایک قدرے مختلف اور غیر معمولی قسم چینی سدا بہار کے صورت حال سے واضح کی جا سکتی ہے جن پر بیٹسن اور گریگری نے کام کیا ہے۔ معمولی بسنتی پھول کی طرح سدا بہار کا پھول پن چشم اور جھال چشم اقسام ظاہر کرتا ہے۔ پن چشم میں نے لابی ہوتی ہے اور چشم کا وسطی حصہ کلنی کے سرے سے بنتا ہے جو تقریباً پوری طرح پھول نیکھ کے آؤزن کو بند کر دیتا ہے (شکل ۹۷)۔ جھال چشم میں نے چھوٹی ہوتی اور یہ پانچ زردانوں کے ذریعہ پوشیدہ رہتی ہے جو پھول نیکھ میں زیادہ بالائی حصہ سے پھوٹ پڑتے ہیں اور چشم کا وسطی حصہ

بناتے ہیں (شکل ۹ ب)۔ ”چشم“ کا زیادہ تر حصہ ہر پھٹری پر کے بنی اٹل اردو




شکل ۹

سدا بہار (primula) پھولوں کی تراشیں - زردان سیاہ دکھائے گئے ہیں
 ۱ - ”پن“ شکل جس میں لانی نے سہے اور زردان نیچے رہتے ہیں -
 ب - ”جھالردار“ شکل جس میں نے چھوٹی اور زردان اس سے اونچے ہوتے ہیں -
 ج - ہم نے شکل جس میں زردان مثل ”پن“ شکل کے نیچے رہتے لیکن نے چھوٹی
 ہوتی ہے - یہ شکل صرف کلاں چشم کے ساتھ پائی جاتی ہے

دھبوں سے بنتا ہے جو پھول پنکھ کے عین وزن پر پائے جاتے ہیں زیادہ تر بستی
 پھولوں میں چشم چھوٹی ہوتی ہے لیکن چند ایسے ہیں جن میں یہ بڑی ہوتی اور پھولوں
 کے بہت زیادہ حصہ پر پھیلی ہوئی رہتی ہے (شکل ۱۰) تجربوں کے ذریعہ ظاہر
 ہوا ہے کہ سیرتوں کے یہ دونوں جوڑے سادہ صیقلی طور پر عمل کرتے ہیں
 چھوٹی نے دالی (= ”جھالری“) لانی نے والی (= ”پن“) پر اور خرد چشم کلاں چشم پر غالب
 ہوتی ہے - علاوہ طبعی لانی اور چھوٹی نے دار شکلوں کے ایک تیسری شکل بھی پائی
 جاتی ہے جس کو ہم نے (homostyle) کہتے ہیں اس شکل میں زردان پھول پنکھ کے خول
 میں کافی نیچے کی جانب رہتے ہیں جیسا کہ لانی نے دار شکل میں ہوتا ہے لیکن نے

بجائے پھول پنکھ کے روزن تک پہنچنے کے لمبائی میں چھوٹی رہ جاتی ہے۔ (شکل ۹-ج)
اپنے تجربوں کے دوران میں بیلسن اور گریگوری نے ایک کلاں چشم ہم نے پودہ
کو ایک خرد چشم جھالردار (= چھوٹی نے والا) پودہ سے بارور کرایا۔ (۱۱) پودے





شکل ۹-ج

دو سدا بہار (primula) پھول جو خرد اور کلاں چشم کی وسعت کو
ظاہر کرتے ہیں۔

تمام چھوٹی نے والے خرد چشم والے پائے گئے۔ خود باروری کرنے پر ان سے
ایک ان نسل حاصل ہوئی جو چار قسم کے نمونوں پر مشتمل تھی یعنی چھوٹی نے خرد چشم
کے ساتھ۔ چھوٹی نے والا کلاں چشم کے ساتھ۔ لابی نے والا خرد چشم کے ساتھ
اور ہم نے والا کلاں چشم کے ساتھ۔ اس نسل کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں
لابی نے والے پودے پیدا ہوئے جو البتہ صرف خرد چشم کے ساتھ پیدا
ہوتے ہیں۔ وہ تناسب جن میں یہ چاروں نمونے نمودار ہوئے ظاہر کرتے ہیں
کہ اس عمل میں صرف دو عوامل کی موجودگی یا عدم موجودگی سے ہی سروکار ہے اور ساتھ ہی
ساتھ یہ ہم نے پودوں کی نوعیت کا عمل بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہ درحقیقت (۵۳)

لانے والے پودے ہیں اور زردانوں کا محل عام لانے والے پودوں کی طرح ہوتا ہے۔ لیکن عوامل کے کسی تفاعل کی وجہ سے نئے خورد پوری نمو کو نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ خورد چشم کا عامل موجود نہ ہو۔ اسی وجہ سے لانے والے پودے جن میں کلاں چشم ہے ہمیشہ ہم نئے شکل کے ہونگے۔ ہم اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتے کہ ان ظاہرہ



غیر مربوط ساختوں کے مابین کوئی اتھالی کڑی ہے اسی طرح سے جیسے کہ ہم پھول کے رنگ اور پودوں کے روئیں دار ہونے کے مابین کوئی توجیہ نہیں کر سکتے۔ بہر حال یہ ظاہر ہے کہ عوامل کے تفاعل کا تصور علاوہ اُس خیال کو سمجھانے کے جو وراثت کے مسئلہ امور کے خلاف ہے تحقیقات کے ایسے راستوں کو بتاتا ہے جو اس طریقہ کے متعلق ہمارے علم کی کارآمد توسیع کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن کے لحاظ سے جاندار عضویہ کے مختلف حصے آپس میں تعلق رکھتے ہیں۔

چھٹا باب

بازگشت

(۵۴)

جو نہی یہ واضح ہو گیا کہ پودوں اور جانوروں میں سیرتوں کی موجودگی متمم
 عوامل کے تفاعل کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس سے ظاہر ہوا کہ یہ امر بازگشت کے اُس منظر پر
 کافی روشنی ڈالتا ہے جو اب تک پیچیدہ معلوم ہو رہا تھا۔ یہ ہم دیکھ چکے ہیں
 کہ چند صورتوں میں ایک سیاہ چوہے یا خرگوش اور اسی نوع کے ایک ابرص جانور کی باہمی
 باروری سے جبکہ ان میں سے ہر ایک خالص قسم کا ہو صرف اگونی ہی پیدا ہوتے ہیں۔
 بالفاظ دیگر سیاہ اور سفید کی باہمی باروری کا نتیجہ چند صورتوں میں جنگلی بھورے جانور
 کی طرف مکمل عودیت ہوتا ہے۔ حیدرآبادی اصول کے تحت اس کو یوں بیان کیا
 جاسکتا ہے کہ اگونی کی پیدائش ایک ہی جفتہ میں ج اور قی عوامل کے ملنے کا لازمی
 نتیجہ ہے۔ خواہ کسی طرح سے بھی جب ان کو یکجا کیا جاتا ہے تو عودیت کا واقع ہونا
 ضروری ہے۔ اس لیے اسی صورتوں میں بازگشت کے لیے ہم یہ خیال کر سکتے ہیں کہ یہ عمل
 ایسے تکمیلی عوامل کو یکجا کرنا ہے جو ارتقاء کے دوران میں کسی طرح ایک دوسرے سے جدا ہو گئے
 تھے۔ سادہ ترین صورتوں مثلاً سیاہ اور سفید خرگوش کے لیے صرف دو عوامل سے
 سروکار ہے اور ان میں سے ہر ایک دونوں والدین میں سے ہر ایک سے حاصل
 ہوتا ہے۔ مگر دوسری صورتوں میں بازگشت کی نوعیت عوامل کی زیادہ تعداد
 کی وجہ سے زیادہ پیچیدہ ہو سکتی ہے حالانکہ عام اصول وہی قرار پاتا ہے۔

(۵۵)

تنختی ما




- ۱- زرد ولدیزی خرگوش؛
- ۲- ہمالیائی خرگوش؛
- ۳- اگونی (= بھورا) ن بازگشت؛
- ۴ تا ۸ نم نمونے یعنی ۴- اگونی
- ۵- زرد؛
- ۶- سیاہ؛
- ۷- چیتی دار؛
- ۸- ہمالیائی

عود کرنے والوں سے احتیاط کے ساتھ نسل حاصل کرنے پر ہم ہر صورت میں متعلقہ عوامل کی تعداد اور نوعیت کا اندازہ لگا سکیں گے اور اس کو واضح کرنے کے لیے ہم خرگوشوں کی ایک دوسری مثال لے سکتے ہیں۔ ہمالیائی خرگوش ایک نہایت مشہور نسل ہے۔ شکل میں یہ گلابی آنکھوں والا سفید خرگوش ہے جس کے کان پیچھے اور ناک سیاہ ہوتے ہیں (تختی I، ۲)۔ ولندیزی خرگوش ایک دوسری مشہور نسل ہے۔ عام طور پر اس کے جسم کا اگلا حصہ سفید اور پچھلا رنگین ہوتا ہے۔ سامنے کی جانب آنکھوں کے اطراف رنگین دھبے ہوتے ہیں کانوں تک جو مکمل طور پر رنگین ہوتے ہیں پھیلے رہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پچھلے پیچھے سفید ہوتے ہیں (دیکھو تختی I، ۱)۔ ولندیزی خرگوش مختلف رنگ کے ہوتے ہیں مگر ان میں سے ہر ایک میں رنگ اور سفیدی کی تقسیم انہی رشتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ ان تجربوں میں جن کا ابھی تذکرہ کیا جائیگا ایک زرد ولندیزی خرگوش کی ایک ہمالیائی خرگوش سے باروری کرائی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بچوں نے جنگلی اگوتی رنگ کی جانب بازگشت کی (تختی I، ۳)۔ ان افراد میں سے چند پر سفید دھبے نمودار ہوئے اور دوسرے خود رنگین تھے۔ ان جانوروں سے نسل حاصل کرنے پر ان میں رنگین جانوروں کا ایک سلسلہ حاصل ہوا۔ یہ اگوتی۔ سیاہ۔ زرد اور سیاہی مائل زرد تھے جن میں سے آخری کو شوقین اکثر چتی دار کہتے ہیں (تختی I، ۴ تا ۷)۔ ان کے علاوہ ایسے ہمالیائی جانور حاصل ہوئے جن کے سرے سیاہ یا ہلکے بھورے تھے اور جس تناسب میں پیدائش ہوئے ان سے ظاہر ہوا کہ ہمالیائی سیرت سادہ معنلوب ہے۔ رنگین جانوروں کی ایک مخصوص تعداد میں ولندیزی جانور کے نشانات کم و بیش طور پر ظاہر ہوئے لیکن چونکہ اس نمونہ کی وراثت پیچیدہ ہے اور اس پر (۵۶) بعد میں بحث کی جائیگی اس لیے ہم اس کو اس وقت نظر انداز کر کے اپنی توجہ رنگین نمونوں اور ہمالیائی خرگوشوں تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ ان میں جس تناسب میں کہ چاروں رنگین نمونے نمودار ہوئے وہ تقریباً ۹ اگوتی۔ ۳ سیاہ ۳ زرد

اور ایک چتی دار تھے۔ ظاہر ہے کہ یہاں ہم دو عوامل سے بحث کر رہے ہیں:
 (۱) بھورا عامل (ق) جو سیاہ کو اگوٹی یا چتی دار کو زرد میں بدل دیتا ہے اور (۲) ایک رنگ کو
 گہرا کرنے والا عامل (گ) جو زرد کو گہرا کر کے اگوٹی اور چتی دار کو گہرا کر کے سیاہ کر دیتا ہے۔ یہاں

زرد × ہمالیائی



یہ بتا دینا ضروری ہے کہ دوسرے تجربوں سے اس امر کی توثیق ہوتی ہے
 کہ زرد خرگوش ایک ہلکایا اگوٹی اور چتی دار ایک ہلکایا سیاہ جانور ہے۔
 ہمالیائی نمونہ خود رنگ کے مقابلہ میں مغلوب کی طرح عمل کرتا ہے۔ یہ ایک
 خود رنگین سیاہ خرگوش ہے جس میں سوائے سرور کے دوسری جگہ رنگ پیدا
 کرنے والا عامل موجود نہیں ہوتا۔ ایسے عامل کو ہم اس سے ظاہر کر سکتے ہیں اور جہاں تک
 اس کا تعلق ہے ہمالیائی ساخت کے لحاظ سے لالا ہے۔ ہمالیائی میں رنگ کو
 گہرا کرنے والا عامل موجود ہوتا ہے اس لیے کہ جو بھی لون اس کے سرور میں
 ہوتا ہے پوری طرح گہرا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ سیاہ بھی ہے یعنی اس میں
 عامل ق نہیں ہوتا۔ اس لیے ان تینوں عوامل کے لحاظ سے ہمالیائی کی ساخت
 ق ق گ گ لالا ہے۔ آخری سیرت جس پر ہمیں اس باروری میں خیال رکھنا ہے
 وہ ولندیزی کی سیرت ہے۔ ہر سٹ نے معلوم کیا کہ یہ خود رنگ (خ) کے مقابلہ
 میں مغلوب ہوتا ہے اور ہمارے موجودہ مقصد کے لیے ہم خیال کریں گے کہ وہ ایک

(۵۷)

تختی ۲



- ۱- چهاری نما میٹھا مٹر (Bush Sweet Pea) ۲- کیو پڈ میٹھا مٹر (Cupid sweet pea)
 ۳- ن، باز گشتی لانا - ۴- استادہ کیو پڈ میٹھا مٹر - ۵- ارغوانی انونبل (Purple Invincible)
 ۶- "پینٹڈ لیڈی" (Painted Lady) ۷- ڈیوک آف ویسٹمنسٹر (Duke of Westminster)
 (کنٹوپ دار میاری)

خود رنگین خرگوش سے اس عامل کی کمی کی وجہ سے اختلاف رکھتا ہے۔ ہالیائی دراصل ایک خود رنگین جانور ہے جو البتہ کا عامل کی مدد موجودگی کی وجہ سے سیاہ رنگ پوری طرح ظاہر نہیں کر سکتا۔ باروری کے تجربات کے نتیجوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ہالیائی کو ق ق گ گ لا لا خ خ سے اور زرد ولندیزی کو ق ق گ گ لا لا خ خ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک میں وہ دو عوامل موجود نہیں ہیں جن کی پوری تکمیل پر اگوٹی رنگ کا انحصار ہے۔ ان کی باروری کرانے سے پورا سلسلہ ق ق گ گ لا لا خ ایک ہی جفتہ کے اندر آ جاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بازگشت جنگلی خرگوش کے رنگ کی جانب ہوتی ہے۔

بازگشت کی زیادہ تر مثالیں جن پر کام کیا گیا ہے وہ ہیں جن میں رنگ کی سیرتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ البتہ ساختی سیرتوں کے لحاظ سے بازگشت کی ایک عمدہ مثال ہمیں میٹھے مٹر میں ملتی ہے۔ ایک بونی قسم جس کو "کیٹوید" کہتے ہیں چند سال قبل کثرت سے اگائی جاتی تھی۔ ان چھوٹے پودوں میں بن کر بہت نہایت چھوٹے ہوتے ہیں اور تنوں کی تعداد کم ہوتی ہے اور یہ صرف ۹ تا ۱۰ انچ لمبائی تک پہنچتے ہیں۔ اگنے کے دوران میں یہ ایک دوسرے سے ملتے جاتے اور زمین پر گر جاتے ہیں (تختی II '۲)۔ یہ عجیب بات ہے کہ گو دیگر امور کے لحاظ سے پودہ بونا ہے لیکن بظاہر اس کا کوئی اثر پھول کی جسامت پر نہیں پڑتا جو ایک معمولی میٹھے مٹر کے پھول کا ہوتا ہے۔ ایک دوسری قسم اگر چیسک نہیادہ عام نہیں ہے۔ "جھاڑی نما" میٹھا مٹر ہے۔ اس کا نام اس کے اگنے کے طریقے کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ اس کے متعدد تنے ایک دوسرے سے ہٹنے کے بجائے ایک دوسرے کے قریب اگتے ہیں جس سے اس کی شکل ایک چھوٹی جھاڑی کی طرح ہو جاتی ہے (تختی II '۱)۔ معمولی حالات کے تحت

(۵۸)


۱۔ ہسٹسٹ نے دراصل ایک بھی ام ایک انگورہ کے خرگوش کی باہمی باروری کرائی تھی جس سے حاصل شدہ بچہ مخفی ولندیزی تھا۔

۲۔ Bush

۳۔ Cupid

یہ $\frac{1}{3}$ تا ۴ فٹ کی اونچائی اختیار کرتی ہے۔ جھاڑی نما اور کیو پڈ اقسام میں متعدد مرتبہ باہمی یا روری کرائی گئی اور ان کا نتیجہ بالکل ہی غیر متوقع تھا اس لیے کہ ہر صورت میں ن پودوں نے معمولی لائے میٹھے میٹر کے پودے کی جسامت اور عادت کی جانب پوری طرح بازگشت ظاہر کی (تختی II، ۳) جو آج کل سیلی میں پائے جانے والے جنگلی پودے کی شکل ہے۔ ان بازگشتی لائے پودوں سے حاصل کردہ ن نسل چار مختلف نمونوں پر مشتمل تھی یعنی - اُونچے - جھاڑی نما - زمین پر گرے ہوئے کیو پڈ پودے جو اصل کیو پڈ پرکھے کے مثل تھے اور ایسے کیو پڈ جو یکجا اور استادہ جھاڑی نما تھے (تختی II، ۴)۔ یہ چاروں نمونے ۱:۳:۳:۹ کے تناسب میں نمودار ہوئے اور اسی سے اس صورت کی نوعیت کا صلہ ہمایا ہوا۔ سیرتیں جو زیر غور ہیں وہ یہ ہیں (۱) پتیوں کے درمیان تنے کا بین کرب لائے اور جو چھوٹے بین کرب پر غالب ہے۔ (۲) اور (۳) رنگنے والی عادت جو استادہ جھاڑی نما

جھاڑی نما × کیو پڈ



عادت پر غالب ہے۔ ان سیرتوں میں سے بین کرب کی لمبائی جھاڑی نما پودے میں منتقل ہوگئی اور زمین پر رنگنے کی عادت اصل کیو پڈ پرکھے میں منتقل ہوگئی۔ ان دونوں کو باروری کر کے یکجا کرنے کا نتیجہ ایک ایسا رنگنے والا پودہ ہوا جس کے بین کرب لائے تھے۔ یہ سیلی کے جنگلی نمونہ کا ایک معمولی لائے میٹھا مٹر ہے یہاں بھی بازگشت دوا لیتے کمپلی عوائل کے یکجا لانے کی وجہ سے ہوئی جو کسی طرح دوران ارتقاء میں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے۔ اس توضیح پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ معمولی میٹھا مٹر ایک استادہ عادت کا پودہ ہے۔ البتہ یہ

درست نہیں ہے۔ یہ صرف اس طرح معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ اس کو اگکانے کا عام طریقہ یہی ہے کہ اس کو چھڑیوں پر چڑھایا جاتا ہے۔ دراصل یہ رنگنے کی عادت کا ہوتا ہے جس کے تنے معمولی کیوڈ پودہ کی طرح ایک دوسرے سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ایک ایسی صورت ہے جس کا مشاہدہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ جبکہ ان کو تیار کردہ ہزاروں کے مصنوعی مدد کے بغیر اگایا جائے۔

اب تک ہم نے بازگشت کی ان صورتوں پر بحث کی ہے جن میں بازگشت ایک باروری کا فوری نتیجہ ہے یعنی وہ نسل میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ غالباً بازگشت کا نہایت عام طریقہ ہے لیکن ایسی مثالیں موجود ہیں جن میں دو خالص نمونوں کی باروری سے بازگشت نسل تک ظاہر نہیں ہوتی۔ ایسی ایک مثال ہمیں مرغوں کی کلفیوں میں پہلے ہی مل چکی ہے۔ یہ یاد ہو گا کہ خالص مٹریہ اور خالص گلابیہ کی باہمی باروری سے نسل میں اخروٹیکہ کلفی والے حاصل ہوئے مگر نسل میں سادہ کلفی والوں کا ایک مضیق سبب ۱۶ میں ۱ نمونہ دار ہوا (دیکھو صفحہ ۲۸) سادہ کلفی وہ شکل ہے جو جنگلی مرغ میں پائی جاتی ہے جس کو گھریلو مرغیوں کے اجداد خیال کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں ایک صورت ایسی ملتی ہے جو نسل میں عود کرگئی اور یہ ان دو عوامل کی عدم موجودگی ہے جو گلابیہ کلفی اور مٹریہ کلفی کے اجداد کے آپس میں ملنے سے حاصل ہوئے تھے۔ یہاں ہم یہ خیال کر سکتے ہیں کہ بازگشت دو تکمیلی عوامل کو یکجا کرنے سے ہونے کے بجائے دو تکمیلی غیر حاضر عوامل کے ملاپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بہر حال ہم اس مسئلہ کی جانب اس وقت دوبارہ توجہ کریں گے جبکہ پالتو اقسام کے مبداء پر بحث کی جائیگی۔

بازگشت کی ایک دوسری مثال ہے جس کا ہم حوالہ دیتے ہیں۔ یہ ڈارون کی

سیاہ اسلیہ x سفید پنکھا دم (لقا)

سیاہ اسلیہ x دھبہ دار


سیاہ x سیاہ

ان سے جو بچے حاصل ہوئے تو اس میں جنگلی کبوتر کی قسم کے بھی تھے

مشہور مثال ہے جس میں جب کبوتر کی چند پالتو نسلوں کو آپس میں بارور کرایا گیا تو

یہ ایک تقریباً سفید پرند ہے جس میں رنگ صرف دم تک محدود رہتا ہے اور سر پر ایک مخصوص دھبہ پایا جاتا ہے۔

سیاہ اسلیہ × سفید پنکھا و دم (لٹا)



(۶۱) اور اس کو متصل کے خاکہ میں دکھایا گیا ہے۔ درحقیقت یہ ان نتائج کے مطالعہ پر مشتمل ہے جو سفید اور کالے پرندوں کی باروری کے بعد حاصل ہوئے اسٹیپلز براؤن نے چند تجربوں کے ذریعہ یہ بتایا کہ بازگشت کی یہ صورت بھی مینڈلی اصول کی رقوم میں سمجھائی جاسکتی ہے۔ ان تجربوں میں سیاہ اسلیٹوں اور سفید پنکھا دم (لقا) کے مابین باہمی باروری کرائی گئی۔ ن پرند تمام سیاہ تھے جن پر سفید بُند کیاں تھیں اور یہ غالباً اس وجہ سے تھا کہ ایک جداگانہ عامل پنکھا دم (لقا) کیو تر سے داخل ہو گیا۔ ان سیاہ پرندوں کی آپس میں باروری سے ایک ن نسل حاصل ہوئی جو سیاہ (سفید بُند کیوں کے ساتھ یا بغیر) نیلے (سفید بُند کیوں کے ساتھ یا بغیر) اور سفید ۹ : ۳ : ۴ کے تناسب پر مشتمل تھی۔ متعلقہ عوامل یہ ہیں رنگ (ر) جس کی عدم موجودگی میں پرند سفید ہوگا اور ایک سیاہ تبدیل کرنے والا (س) جس کی عدم موجودگی میں ایک زنگین پرند نیلا ہوگا۔ اصل سیاہ اسلیٹ میں یہ دونوں عوامل موجود تھے اور اس کی ساخت ر س س ہوگی البتہ

پنکھا دم (لقا) میں ان میں سے کوئی بھی موجود نہ تھا اور اس لیے اس کی ساخت
ر ر س س ہے۔ ن پرند جو باروری کے ذریعہ حاصل ہوئے ساخت میں ر ر س س

ر س	ر س	ر س	ر س
ر س	ر س	ر س	ر س
سیاہ	سیاہ	سیاہ	سیاہ
ر س	ر س	ر س	ر س
ر س	ر س	ر س	ر س
سیاہ	سیاہ	نیلا	نیلا
ر س	ر س	ر س	ر س
ر س	ر س	ر س	ر س
سیاہ	سیاہ	سیاہ	سیاہ
ر س	ر س	ر س	ر س
ر س	ر س	ر س	ر س
سیاہ	سیاہ	نیلا	نیلا

تھے اور دونوں عوامل کے
لیے وگرتی ہوئے کی
وجہ سے انہوں نے
چار قسم کے زواج
ر س - ر س - ر س - ر س
ساوی تعداد میں بنائے۔
زواجوں کے ایسے دو سلسلے
کے ملاپ کے نتیجوں کو
حسب معمول شکل ۱۱
میں بتایا گیا ہے۔
نیلا ایک ایسا پرند ہے
جس میں رنگ کا

شکل ۱۱

شکل جو عود کرنے والے نیلے کہوٹر کے نمودار ہونے کو نسل میں بتاتی ہے
جبکہ سیاہ اور سفید کی باہمی باروری کرائی جائے۔

عائل موجود ہے لیکن
سیاہ تبدیل کرنے والا
عائل نہیں پایا جاتا
یعنی وہ ر ر س س یا

ر ر س س ساخت کا ہے اور ایسے پرند جیسا کہ شکل سے ظاہر ہے ن نسل میں اوسطاً
سولہا میں سے تین مرتبہ نمودار ہوتے ہیں۔ یہاں بازگشت ن ن میں ہوتی ہے جبکہ
عوامل کی دوبارہ تقسیم سے ایسے جفتے بنتے ہیں جن میں دونوں عوامل میں سے کوئی ایک
موجود ہوتا مگر دوسرا نہیں۔

(۶۲)

ساتواں باب


غلیت

(۶۳)

اب تک ہم نے جن صورتوں پر غور کیا ہے اُن میں یہ ظاہر ہوا کہ کسی عامل کی موجودگی اپنا پورا اثر پیدا کرتی ہے۔ چاہے وہ ایک زواج یا ایسے دونوں کے ذریعے داخل کیا جائے جو جنت کو بناتے ہیں۔ اگر جفتی او نیچے مٹر کے پودے یا اگر جفتی گلابیہ کلغی والے مرغ کو صرف مشاہدہ سے ایک ہم جفتی شکل سے تمیز نہیں کیا جاسکتا خواہ وہ کتنی ہی ہوشیاری سے کیوں نہ کیا جائے۔ صرف باروری کے امتحان ہی سے اس کا تصفیہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کونسا اگر جفتی اور کونسا ہم جفتی ہے۔ حالانکہ یہ زیادہ تر ایسی سیرتوں کے لیے درست ہے جن پر تجربے کیے گئے لیکن ایسی بھی صورتیں موجود ہیں جہاں اگر جفتی حاصل اپنے ہر دو والدین سے مختلف ہوتے ہیں۔ پودوں میں ایسی صورت سد ابھار پھول (Primula) میں پائی گئی ہے۔ معمولی چینی سد ابھار پھولوں (p. sinensis) (شکل ۱۲) کی بڑی موجدار پنکھڑیاں ہوتی ہیں اور حاشیے کنگورہ دار ہوتی ہیں۔ تارہ نما سد ابھار (P. stellata) میں پھول نہایت چھوٹے ہوتے ہیں اور پنکھڑیاں چھٹے ہونے کے علاوہ چینی سد ابھار پھولوں (P. Sinensis) کے متعدد کنگوروں کے بجائے سرے پر صرف ایک کٹاؤ ظاہر کرتی ہیں۔ ان دونوں اقسام کے باہمی ملاپ سے ایک ایسا اگر جفتہ تیار ہوگا جو جسامت اور شکل میں درمیانی ہوتا ہے۔ جب ان کی خود باروری کرائی جاتی ہے تو یہ سادہ مینڈلی اصول کے مطابق عمل کرتے ہیں اور ایک ایسی نسل حاصل ہوتی ہے جس میں سا سنسیس (sinensis) درمیانی اور اسٹیلیٹا (stellata)

(۶۴)

قسم کے پودے ۱:۲:۱ کے تناسب میں پائے جاتے ہیں۔ بعد میں ان پودوں سے نسل حاصل کرنے پر معلوم ہوا کہ سائٹینس اور اسٹیلیٹا دونوں اقسام جو



شکل ۱۲


سدا بہار پھول جو ایسے ن پھول کی درمیانی نوعیت کو ظاہر کرتے ہیں جو سائٹینس اور اسٹیلیٹا کے ملاپ سے حاصل ہوا۔

نہ نسل میں نمودار ہوئیں مثل اصل کے پودے اگاتی رہیں لیکن درمیانی پودوں سے پھر تینوں اقسام اسی تناسب سے حاصل ہوئیں۔ لیکن حالانکہ ایسی صورت میں کسی بھی سلف کی سیرت کی غلیٹ نہیں پائی جاتی پھر بھی افتراق کے مینڈلی اصول کی اس سے بہتر مثال مشکل سے ملتی ہے۔


پرندوں میں اسی قسم کی ایک مثال نیلی اندلسی مرغیوں کی ہے۔ شوقین لوگوں نے ان کی نسل حاصل کرنے میں یہ محسوس کیا کہ وہ مثل اصل کے بچے پیدا نہیں کر سکتیں۔ وہ خود بھورے نیلے رنگ کی اور گچھا دار پروں کی ہوتی ہے جس کے

(۶۵)

پینے کے پروں پر سیاہ حاشیہ رہتا ہے۔ اس سے ہمیشہ دو قسم کے "ناقص" پرند



حاصل ہوتے ہیں یعنی سیاہ اور ایسے سفید جن پر نیلے دھبے رہتے ہیں۔ نیلوں کی احتیاط کے ساتھ افزائش کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ تینوں اقسام ہمیشہ اسی معین تناسب میں پیدا ہونگی مثلاً ایک سیاہ - دو نیلے اور ایک دھبہ دار سفید۔



اس سے فوراً یہ اندازہ لگتا ہے کہ سیاہ اور دھبہ دار سفید دونوں ہم جفتی پرند ہیں

(۶۳) اور نیلے و گرجفتی ہیں یعنی یہ "سیاہ" اور "دھبہ دار سفید" زواج مساوی تعداد میں پیدا کرتے ہیں۔ اس بات کو ناقص "پرنڈوں کی آپس میں باروری کرنے کے جانچا گیا۔ سیاہ کو سیاہ سے اور دھبہ دار سفید کو سفید دھبہ دار سے۔ اور یہ دیکھا گیا کہ ان میں سے ہر ایک نے مثل اصل نمونے کے بچے پیدا کیے۔ لیکن جب سیاہ کی باروری دھبہ دار سفید سے کرائی گئی تو ان سے توقع کے مطابق صرف نیلے ہی پیدا ہوئے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہرہ طور پر یہ معلوم ہو گا کہ سیاہ اور دھبہ دار سفید کے ملاپ سے دو گئے نیلے حاصل ہونگے بمقابلہ اس کے کہ جب نیلوں کی آپس میں باروری کر کے بچے حاصل کیے جائیں۔ دراصل سیاہ اور دھبہ دار سفید "ناقص" خالص میں برخلاف ان کے "خالص" نیلی انڈسی ایک دوغلی ہے جس کی اس سیرت کے لیے کتنی بھی کوشش کی جائے یہ قائم نہیں رکھی جاسکتی۔

ایسی صورتوں میں جیسی کہ یہ ہے ظاہر ہے کہ ہم غلیبیت کا اطلاق اس پر نہیں کر سکتے۔ اور اس منظر کے غائب ہونے سے ہم یہ جانچ کرنے کے پرکھ کو کھودیتے ہیں کہ دونوں والدین میں سے کونسا اس زائد غلط کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ مثلاً کیا ہم سیاہ انڈسی پرنڈ کو ایسا دھبہ دار سفید تصور کر سکتے ہیں جس میں رنگ کو گہرا کرنے والے عامل کا دوہرا جز شامل ہو گیا ہے یا ہم یہ خیال کریں کہ دھبہ دار سفید ایک ایسا سیاہ پرنڈ ہے جو اپنے اصل رنگ کو اس وجہ سے ظاہر نہیں کر سکتا کہ اس میں ایک ایسا مانع عامل موجود ہے جو سیاہ رنگ کو ظاہر ہونے سے روکتا ہے۔ ان میں سے دونوں تشریحیں یکساں طور پر درست معلوم ہوتی ہیں اور جب تک کہ آئندہ ایسے تجربات سوچے اور ان پر عمل نہ کیے جائیں۔ یہ تصفیہ کرنا ناممکن ہے کہ ان میں سے کونسا خیال درست ہے۔

علاوہ ان چند نادرد صورتوں کے جہاں و گرجفتہ کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک کے مقابلہ میں دوسرے سلف سے قریب تر مشابہت رکھتا ہے ایسی صورتیں موجود ہیں جن میں و گرجفتہ اور خالص غالب کے مابین اکثر ایک نمایاں امتیاز کیا جاسکتا ہے۔ مرغیوں کی چند ایسی سفید قسمیں ہیں۔

(۶۴)

مثلاً (سفید پاموز (White leghorn) لیگھارن) جن میں سفیدی رنگ کے مقابلہ میں غالب ہے۔ لیکن ایسے دیگر جفتی سفید پرند میں جو غالب سفید پرند کو ایک خالص رنگین مرغی (مثلاً بھوری پاموز (Brown leghorn) لیگھارن) سے ملائے پر حاصل ہو اس کی پوشش میں تقریباً ہمیشہ چند رنگین پر یا درجے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہاں سفید کی غلبیت پوری طرح مکمل نہیں ہے اور باروری کے تجربوں کے بغیر خالص کو غیر خالص غالب سے آسانی کے ساتھ تمیز کیا جاسکتا ہے۔

غالب سفید پرند کی اس مثال سے غلبیت کے سلسلہ میں ایک دوسرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ نظریہ حاضر و غائب کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ غالب پرند میں بمقابلہ مغلوب کے ایک زائد عامل موجود ہوتا ہے۔ مرغیوں کی اس خاص صورت پر غور کرنے کا ایک فطری طریقہ یہ ہے کہ سفید کے لیے یوں تصور کیا جائے کہ اس میں رنگ غیر حاضر ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو رنگ سفید کے مقابلے میں غالب ہونا چاہیے اور یہ صورت یہاں نہیں پائی جاتی۔ اس لیے ہمیں مجبوراً یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس مثال میں رنگ کی عدم موجودگی ایک ایسے عامل کی موجودگی کی وجہ سے ہے جس کی خاصیت اس رنگ کی پیدائش کو منع کرتا ہے جو ایک پرند کو خالص رنگین بناتا ہے۔ اس نقطہ نظر سے غالب سفید پرند ایک ایسا رنگین پرند ہے جسے جمع ایک ایسا عامل ہے جو رنگ کی پیدائش کو منع کرتا ہے۔ اس نتیجہ کو تجربہ کے ذریعہ جانچا جاسکتا ہے۔ یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ دوسری ایسی سفید مرغیاں موجود ہیں جن میں سفیدی رنگ کے مقابلہ میں مغلوب ہے اور ایسے پرندوں کا سفید رنگ اس وجہ سے ہے کہ ان میں رنگ کے پیدا کرنے والے عامل کی کمی ہے۔ اگر ہم ایسے عامل کو ج اور غالب سفید پرند میں فرضی مانع عامل کو ی سے ظاہر کریں تو ہمیں مغلوب سفید کی ساخت کو ج ج ی اور غالب سفید کو ج ج ی ی سے ظاہر کرنا چاہیے۔ اب اگر ہم نظری طور پر حساب لگائیں تو ہمیں وہی نتائج حاصل ہونگے جو ان دونوں خالص نسلوں کو آپس میں بارور کرنے کے بعد ملنے چاہئیں۔ ن پرند کی بناوٹ لازمی طور پر ج ج ی ی ہوگی۔ چونکہ ایسے پرند مانع عامل کے لیے دیگر جفتی ہوتے ہیں

اس لیے وہ ایسے سفید ہونے چاہئیں جن میں چند رنگیں "چٹیاں" موجود ہوں۔
چونکہ یہ ج اور ی عوائل دونوں کے لیے وگر جفتی ہوتے ہیں اس لیے وہ
چار مختلف قسم کے زواج ج ی ج ی ج ی ج ی مساوی تعداد میں پیدا کریں گی۔
زواجوں کے ایسے تشابہ و سلسلوں کو ملانے سے جو نتائج حاصل ہوتے ہیں وہ
شکل ۱۳ میں دکھائے گئے ہیں۔ سولہ خانوں میں سے بارہ میں ی موجود ہے

ج ی ج ی	ج ی ج ی	ج ی ج ی	ج ی ج ی
ج ی ج ی	ج ی ج ی	ج ی ج ی	ج ی ج ی
ج ی ج ی	ج ی ج ی	ج ی ج ی	ج ی ج ی
ج ی ج ی	ج ی ج ی	ج ی ج ی	ج ی ج ی

شکل ۱۳

نقطہ نسل کی نوعیت کو ظاہر کرنے کے لیے جو غالب سفید اور مغلوب
سفید مرغیوں کی باہمی باروری سے حاصل ہوئی ہے۔

یہ سفید پرند ہو گئے چٹی دار یا بغیر چٹی کے۔ تین میں ج ہے لیکن ی موجود
نہیں ایسے پرند رنگین ہونے چاہئیں۔ ایک میں نہ تو ج اور نہ ی موجود ہے
یہ سفید ہونا چاہیے۔ اس لیے ایسے ملاپ سے ہمیں سفید اور رنگین پرند دونوں
۱۳ : ۳ کے تناسب سے حاصل ہونے چاہئیں۔ اس طرح جو نتائج نظری

(۶۹) طور پر حاصل کیے گئے وہ تجربوں کے حقیقی نتائج سے مطابقت کرتے ہوئے پائے گئے۔
نسل کے پرند تمام چچی دار سفید تھے۔ اور نسل میں سفید اور زنگین پرند توقع تناسب میں نمودار
ہوئے۔ اس لیے اس بارہ میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ غالب سفید ایک زنگین
پرند ہے جس میں رنگ کی عدم موجودگی ایک رنگ کو ردع کرنے والے عامل
کے عمل کی وجہ سے ہے حالانکہ ہم اس وقت اس بارہ میں کچھ نہیں بتا سکتے کہ اس
عامل کی نوعیت کیا ہے۔

جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں پودوں پر تجربہ کرنے میں جانوروں کی بھی درشت
پراکثر روشنی پڑتی ہے اور اس کا بالعکس بھی اتنا ہی درست ہے۔ مرغیوں
میں پائے جانے والے مانع عامل کا جواب گھیوں میں بھی ملتا ہے۔




شکل ۱۰۰

بے روئیں اور روئیں دار گھیوں کی بالیں - بے روئیں حالت
روئیں دار کے مقابلے میں غالب ہے۔

(۷۰) بِن (Biffen) کے ابتدائی کام سے یہ ظاہر ہوا کہ بے روئیں بال روئیں دارانہ بال کے مقابلے میں ایک سادہ غالب کے طور پر عمل کرتا ہے۔ (شکل ۳۱) ظاہر ہے کہ روئیں دار حالت ایک زائد سیرت ہے اور نظریہ حاضر و غائب کے لحاظ سے ہم کو اسے غالب تصور کرنا چاہیے تھا۔ یہ واقعہ کہ ایسا نہیں ہوتا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ بے روئیں بالوں میں جن پر بِن (Biffen) نے کام کیا تھا روؤں کو جا کر رکھنے والا ایک مانع موجود تھا۔ اس خیال کی توثیق حال میں ہوورڈ (Howard) نے کی ہے۔ وہ یہ ثابت کر سکا کہ دو قسم کی بے روئیں بالیں پائی جاتی ہیں جن میں سے ایک روئیں دار بال کے مقابلے میں غالب اور دوسری مغلوب ہے۔ جب ان دونوں اقسام کی بے روئیں بالوں کی آپس میں باروری کرائی جاتی ہے تو نسل میں روئیں دار بالوں کا ایک خاص تناسب پیدا ہوتا ہے بالکل اسی طرح جیسے کہ دو قسم کی سفید مرغیاں ایک معین تعداد رنگین پرندوں کی پیدا کرتی ہیں۔ جوں تجربے ہونگے اس کا امکان ہے کہ ہمیں مانع عوامل کے عمل کی ایسی کئی مزید مثالیں حاصل ہوں اور ہم کو یہ دیکھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ایک ہی نمایاں اثر کو ایک عامل کے داخل کرنے یا نکال لینے سے پیدا کیا جاسکتا ہے۔ ظاہرہ شکل میں غالب اور مغلوب سفید مرغیاں تمیز نہیں کی جاسکتیں۔ پھر بھی رنگین پرند کے مقابلے میں ایک کے اندر ایک عامل زائد اور دوسرے کے اندر ایک عامل کم رہتا ہے۔

باوجود تناسلی شہادت کی معقولیت کے مانع عوامل کی مفروضہ موجودگی پر اس لحاظ سے تنقید کی گئی ہے کہ ایک مشکل سے بچنے کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ اس وجہ سے ہم مختصر طور پر ہٹیا آ نسلو (Huia Onslow) کے چند دلچسپ تجربات کا ذکر کرتے ہیں جو ایسے عوامل کی موجودگی کی حمایت میں بالکل ہی جلدگانہ نوعیت کی شہادت پیش کرتے ہیں۔ آ نسلو نے ایسے خرگوشوں پر کام کیا جن میں دو نمایاں شکل کی اقسام تھیں اور جن کی پوشش سفید تھی۔ ان میں سے ایک یعنی (۷۱) انگریزی خرگوش میں سفید نمونہ خود رنگ پوشش پر غالب ہے۔ دوسرے یعنی ولندیزی خرگوش میں سفید نمونہ خود رنگ کے مقابلے میں مغلوب ہے (صفحہ ۱۷۲) تناسلی شہادت کی بناء پر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ولندیزی خرگوش سفید اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی

پوشش کے سفید حصوں سے ایک ایسا عامل نمائے ہو جاتا ہے جو رنگ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ برخلاف اس کے انگریزی خرگوش میں سفید رنگ اس لیے پایا جاتا ہے کہ اس میں ایک ایسا عامل موجود ہے جو رنگ کی پیدائش کو منع کرتا ہے۔
 کیمیا وال اس بات پر متفق ہیں کہ جانوروں اور پودوں میں رنگ کی پیدائش ایک خمیر نماغے یا آکسیڈیس (Oxidase) کے ایک بے رنگ لون انزائم کروموجن (Chromogen) پر عمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ زندہ بافتوں میں خمیر عموماً ایک ایسے غیر عامل پر آکسیڈیس (peroxidase) کی شکل میں موجود ہوتا ہے اور کارآمد آکسیڈیس اسی وقت آزاد ہوتا ہے جبکہ اس کی تکسید واقع ہو۔ ان کا ایک دوسرے سے تعلق اس طرح ظاہر کیا جاسکتا ہے۔



خالص کیمیائی طریقوں سے آنسلو نے فوڑائیہ سیاہ خرگوشوں کی جلد کے ساتھ ہی ساتھ ولندیزی اور انگریزی خرگوشوں کے سفید حصوں کا امتحان کیا۔ وہ یہ ثابت کر سکا کہ سیاہ خرگوشوں کی جلد میں ایک پراکسیڈیس موجود تھا جو ولندیزی خرگوشوں کے سفید حصوں میں نہیں ملا۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے اس نے جلد سے پھوڑے ہوئے مائع میں تھوپی سی ٹائیروسین (Tyrosin) ایک بیزنگ کروموجن اور ٹائیڈوجن پراکسائیڈ ملایا اور اس آمیزہ کی ایک موزوں تپش پر حضانت کی گئی تو ایک سیاہ لون حاصل ہوا۔ اس نے اس طرح لون پیدا کرنے والی میکائنت میں مصنوعی طور پر وہ عناصر داخل کیے جو نمونے والے جانور کی جلد کے اندر پراکسیڈیس تک خون کی رے کے ذریعہ پہنچتے ہیں۔ جب اس لون بنانے والے آمیزہ میں انگریزی خرگوش کی جلد سے حاصل شدہ مائع کے چند قطرے ملائے گئے تو حضانت پر کوئی لون نمودار نہیں ہوا۔ انگریزی خرگوش کے مائع میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جو میکائنت کے عمل کو روکتی ہے اور یہ کہ یہ نامعلوم چیز ایک خمیر کی نوعیت رکھتی ہے۔

اس بات سے ظاہر ہوئی کہ جوش دینے کے بعد لون پیدا کرنے والے آمیزے میں اس کے طمانے سے کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا اور لون حسب معمول ظاہر ہوا۔ دوسرے تجربوں سے یہ ثابت ہوا کہ ولندیزی کے سفید حصوں میں نہ تو وہ پر آکسیدیں موجود تھا جو سیاہ میں پایا جاتا ہے اور نہ انگریزی خرگوش کا امتناعی مادہ ہی پایا گیا۔ یہ کام کیمیا فی پہلو سے ان امور کے لیے ایک بندوبست عمدہ مطابقت ظاہر کرتا ہے جو بالکل تناسلی بنیاد پر قائم ہوئے تھے۔

ایک منظر جو غلبیت کی بے قاعدگی کے نام سے موسوم ہے۔ چند صورتوں میں زیر بحث رہا ہے۔ مرغیوں کی خاص اقسام مثلاً ڈارکنگ (Dorking) میں ایک زائد انگوٹھا پیرانگوٹھے (hallux) کی طرح پیچھے کی جانب رخ کیا ہوا پایا جاتا ہے (دیکھو شکل ۱۵)۔ چند خاندانوں میں معمولی انگوٹھے کے مقابلے میں یہ سیرت



شکل ۱۵

مرغیوں کے پیر۔ دائیں طرف ایک معمولی اور بائیں جانب زائد انگلی والا پیر دکھایا گیا ہے۔

ایک ساوہ غالب کی حیثیت رکھتی اور ن میں ۳:۱ کے متوقع تناسب میں رہتی ہے۔ لیکن دوسرے خاندانوں میں جو اسی قسم کے افزائش سے حاصل کیے جائیں زائد انگوٹھے والے اور بغیر زائد انگوٹھے والے پرندوں کا تناسب غیر معمولی ہوتا ہے۔

یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ایسے خاندان میں بغیر زائد انگوٹھے والے بعض پرند اس خصوصیت کو منتقل کرتے ہیں جبکہ ان کی بارودی ایسی نسل کی مرغیوں سے کرائی جائے جن میں یہ زائد انگوٹھا نہیں پایا جاتا۔ حالانکہ پرند کی خارجی شکل عموماً ان زواجوں کی نوعیت کی طرف کچھ اشارہ کرتی ہے جو اس میں موجود ہیں لیکن یہ صورت ہمیشہ نہیں ہوتی۔ تاہم یہ فرض کرنے کے وجہ ہیں کہ زواجوں میں اس سیرت کی تغزیل ہوتی ہے حالانکہ ان کی نوعیت کا تصفیہ ہمیشہ اس پرند کی شکل کو دیکھ کر نہیں کیا جاسکتا جس میں یہ پائے جاتے ہیں۔

ایسی صورتیں موجود ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ غلبیت کی طاہرہ بے قاعدگی کا انحصار ایک دوسری سیرت پر ہے اور جیسا کہ پرو فیسر وڈ (Prof. Wood) نے بھیڑوں پر تجربہ کر کے ثابت کیا ہے۔ ان تجربات میں دو اقسام کی آپس میں بارودی کرائی گئی جن میں سے ایک یعنی ڈارسیٹ (Dorset) کی دونوں صنفوں میں سینگ پائے جاتے ہیں برخلاف اس کے دوسری یعنی سٹفک (Suffolk) کی کسی صنف میں سینگ نہیں ہوتے (دیکھو تختی III)۔ طاہرہ کسی طرح بھی کرایا جائے نہ نسل ایک ہی قسم کی حاصل ہوتی یعنی مینڈھے سینگ دار اور بھیڑیں بلا سینگ تھیں۔ نہ جانوروں سے جب نہ نسل حاصل کی گئی تو سینگ والے اور بلا سینگ نمونے دونوں صنفوں میں پیدا ہوئے مگر ان کا باہمی تناسب نہایت مختلف تھا۔ حالانکہ سینگ والے مینڈھے بمقابلہ بلا سینگ مینڈھوں کے تین گنا تھے۔ لیکن یہ تناسب بھیڑوں میں الٹ گیا جن میں سینگ والی بھیڑیں جملہ تعداد کی صرف چوتھائی تھیں۔ اس دلچسپ صورت کی سادہ ترین توجیح یہ فرض کرتے ہوئے کی جاسکتی ہے کہ سینگ دار سیرت کی غلبیت کا انحصار جانور کی صنف پر ہے یعنی یہ کہ یہ سیرت نرمی غالب مگر مادہ میں مغلوب ہے۔ اس خیال کو جانچنے کے لیے ایک نہایت دلچسپ تجربہ تجویز کیا گیا۔ اگر یہ درست ہے تو نہ بھیڑوں سے مساوی تعداد میں ایسے زواجے حاصل ہونے چاہئیں جن میں



۳- نن ہندھا



ہنڈھا


والدین

۱- سٹفک

بھیر

Dorset

۲- ڈارسیٹ



۴- نن بھیر



۱- سینگ دار نر مہینا



۲- بے سینگ نر مہینا




۳- سینگ دار مادہ مہینا



۴- بے سینگ مادہ مہینا

سینگ دار اور بغیر سینگ کا حامل موجود ہے اور یہ کہ بغیر سینگ والے (ن) مینڈھوں کے تمام زواجوں میں یہ حامل موجود نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر ایک بے سینگ مینڈھ کو ن بھیرٹوں سے ملایا جائے تو مساوی تعداد میں ایسے جفتے پیدا ہونگے جو سینگ دار سیرت کے لیے دگر جفتی ہیں اور ایسے جفتے جن میں یہ سیرت بالکل ہی غائب ہے۔ اور چونکہ دگر جفتی نر سینگ دار ہوتے ہیں اور دگر جفتی مادہ تمام بے سینگ ہوتی ہیں تو ہمیں اس لحاظ سے مساوی تعداد میں



شکل ۱۶

بھیرٹوں میں سینگ کی وراثت کو ظاہر کرنے کے لیے ایکم۔ دگر جفتی سرورے سیاہ اور بیچ میں ایک سفید نقطہ کے ذریعہ دکھائے گئے ہیں۔ دگر جفتی مادہ میں سیاہ اور بیچ میں ایک سیاہ نقطہ سے ظاہر کی گئی ہیں۔

سینگ والے مادہ بے سینگ مینڈھوں کی اور صرف بے سینگ بھیرٹوں کی توقع رکھنی چاہیے۔ تجربہ کے نتیجہ سے اس توقع کی توثیق ہوتی ہے۔ نر بچوں میں سے ۹ سینگ والے مادہ بے سینگ تھے لیکن مادہ بچے جو تعداد میں اتھے بالکل بغیر سینگ کے تھے۔

آٹھواں باب

جنگلی اقسام اور پالتو انواع

بازگشت کے منظر پر بحث کرتے وقت ہم نے اکثر صورتوں میں یہ دیکھا کہ ایسی بازگشت واقع ہوتی ہے جبکہ باہمی باروری کرنے والی اقسام میں سے ہر ایک میں بعض ایسے عوامل موجود ہوتے ہیں جو دوسری میں نہیں پائے جاتے اور جن کی تکمیل بازگشتی جنگلی اقسام کے پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس سے فوراً یہ اشارہ ملتا ہے کہ جانوروں اور پودوں کی مختلف پالتو اقسام کسی ایک یا دوسرے عامل کے غائب ہو جانے یا کم ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ چند صورتوں میں اس بارہ میں بین ثبوت ہے کہ کاشت کی ہوئی اور جنگلی اقسام کے باہمی رشتہ کی یہ نہایت فطری دلیل ہے۔ وہ نوع جن میں یہ نہایت نمایاں ہے وہ میٹھے میٹر (Lathyrus odoratus) کی مثال ہے۔ ہمارے پاس یہ فرض کرنے کے لیے کافی وجہ ہیں کہ چند ساختی سیرتوں کے لحاظ سے جھاڑی نما قسم ایک ایسی جنگلی شکل ہے جس میں رینگنے والی عادت کے عامل کی کمی ہوتی ہے۔ کیو پڈ (Cupid) ایسی جنگلی شکل ہے جس میں لائبے بین کریب کا عامل نہیں رہتا اور یہ کہ جھاڑی نما کیو پڈ ایسی جنگلی صورت ہے جس میں یہ دونوں عوامل نہیں پائے جاتے۔ یہ شہادت رنگ کے کئی

تختی ۲



- ۱ و ۲ - ایلی ہینڈرسن (Emily Henderson) ۳ - بازگشتی ارغوانی ۴ - مختلف نمونے
 ۵ - ارغوانی - ۶ - پکوٹی (Picotee) ۷ - پینٹڈ لیدی (Painted Lady)
 ۸ - مس ہنٹ (Miss Hunt) ۹ - ہلکارنگ دارسفید - ۱۰ - سفید

اقسام کے لیے بھی اتنی ہی ہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم اس صورت کو زیادہ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں جس میں دو سفید اقسام کی باہمی باروری سے نتیجہ کے طور پر ارغوانی رنگ کی طرف مکمل بازگشت واقع ہوئی جو سسلی کی جنگلی انواع کی خصوصیت ہے (تختی IV)۔ اس خاص مثال میں ارغوانی سے مزید افزائش کرنے کے بعد ارغوانی پھولوں سے جو پودے حاصل کیے گئے ان میں علاوہ سفید کے چھ مختلف رنگوں کے پھول حاصل ہوئے رنگین پھول والی قسمیں سفید کے مقابلے میں ۹:۷ کے تناسب میں تھیں (صفحہ ۲) لیکن اس وقت ہمیں ان چھ رنگین اقسام سے ہی بحث ہے۔ ان چھ میں سے تین ارغوانی اور تین سُرخ تھے۔ تینوں ارغوانی پھول اس قسم کے تھے۔ (۱) جنگلی دورنگی ارغوانی جس کے پر نیلے تھے اور جو کاشت کے لحاظ سے ارغوانی رائونسیل (Purple Invincible) کہلاتا ہے (تختی IV-۴)۔ (۲) گہرا ارغوانی جس کے پر ارغوانی تھے (تختی IV-۵) اور (۳) ایک بہت ہی ہلکا ارغوانی جن کو پکوٹی (Picotee) کہتے ہیں (تختی IV-۶)۔ ان تینوں ارغوانی اقسام کے متناظر تین سُرخ تھے:۔ (۱) ایک دورنگی سُرخ جس کو پینٹڈ لیڈی (Painted Lady) کہتے ہیں (تختی IV-۷)۔ (۲) ایک سُرخ پر والا گہرا سُرخ رنگ جس کو مس ہنٹ (Miss Hunt) کہتے ہیں (تختی IV-۸) اور (۳) ایک زردی مائل سُرخ جس کو ٹنچڈ و ہاٹ (Tinged White) کے نام سے موسوم کیا گیا ہے (تختی IV-۹)۔

نسل میں جملہ ارغوانی پھولوں کا تناسب سُرخ پھولوں کے ساتھ ۳:۱ تھا اور یہی تناسب متناظر جاعتوں میں سے ہر ایک کے لیے برقرار پایا گیا اس لیے ارغوانی بمقابلہ سُرخ کے غالب ہے اور سُرخ کی تینوں جاعتوں میں سے ہر ایک اپنے مماثل ارغوانی سے اس طرح اختلاف رکھتی ہے کہ اس میں وہ نیلا عامل (ب) موجود نہیں ہوتا جو اس کو ارغوانی میں تبدیل کر دیتا ہے اور وہ

لہ اگرناظر پھولوں کی فہرست میں ان پھولوں کے نام تلاش کریگا تو شاید اسے مایوسی ہو۔ کچھ چنڈ ساو میں مٹھے مٹر کی زیادہ (بہتر) اقسام حاصل کی گئی ہیں اور اس کا اسکان نہیں ہے کہ بیج بیچنے والا ان قدیم فیشن کے پودوں کے بیج فروخت کرتا ہو۔

تناسب جن میں ارغوانی پھولوں کی تینوں جامعیتیں نمودار ہوئیں وہ اس طرح تھا یعنی ۹ دوزنگی، ۳ گہرے ارغوانی، ۳ پکوٹی۔ اس لیے یہاں ہمیں دو عوامل کے عمل سے ہی سروکار ہے (۱) ایک ہلکے پر والا عامل جو دوزنگی کو گہرے پردے پھول کے مقابلے میں غالب بنا دیتا ہے اور (۲) ایک عامل گہرے رنگ کے لیے جو دوزنگی اور گہرے ارغوانی میں موجود رہتا لیکن ہلکے پکوٹی میں نہیں پایا جاتا۔ یہاں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ یہ نتائج تجربوں کے ایک کثیر گروہ پر مبنی ہیں جو کئی ہزار پودوں کی باروری پر مشتمل ہے۔ چنانچہ اس ملاپ میں ہماری بحث پانچ عوامل کی موجودگی یا عدم موجودگی سے ہے جن کو ہم حسب ذیل طور پر ظاہر کر سکتے ہیں۔

ایک لونی اساس د

ایک رنگ کو نمودینے والا ج

ایک ارغوانی عامل ب

ایک ہلکے پر کا عامل ل

ایک عامل گہرے رنگ کے لیے ی

اس ترقیم کی بناء پر ہمارے چھ رنگین پھول یہ ہیں :-

- | | | |
|-----|-------------------------|--------------------------|
| (۱) | ارغوانی دوزنگی | ج رب لی |
| (۲) | گہرا ارغوانی | ج رب لی |
| (۳) | پکوٹی | ج رب لی یا ج رب لی |
| (۴) | سرخ دوزنگی (= مینڈلیڈی) | ج رب لی |
| (۵) | گہرا سرخ (= مس ہنٹ) | ج رب لی |
| (۶) | رنگین سفید | ج رب لی یا ج رب لی |

اس سلسلہ میں یہ ظاہر ہے کہ مختلف رنگین پھولوں کو جنگلی نمونہ کے ارغوانی دوزنگی میں

لے یہ فرض کر لیا جائے کہ جہاں کہیں ایک دیا ہوا عامل موجود ہو پودہ اس کے لیے رنگ کی تبدیلی کے بغیر ہم جتنی یا دیگر جتنی ہو سکتا ہے۔

سے ایک یا زیادہ عوامل کو ترک کرنے سے بیان کیا جاسکتا ہے۔ ہر عامل کے مکمل ترک سے رنگ کا ایک نیا نمونہ حاصل ہوتا ہے اور اس نتیجہ کی مخالفت کرنا مشکل ہے کہ میٹھے مٹر کی مختلف کاشتیں اقسام جنگلی پودہ سے اسی قسم کے کسی عمل سے حاصل ہوئی ہوں۔ یہ خیال اس نتیجہ سے مطابقت کرتا ہے جو ایک جنگلی پودہ کی کسی ایک باغ کی اقسام سے باروری کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ جب کبھی ایسا ملاپ کیا گیا دو غلے کی شکل جنگلی پودہ کی سی ہوئی اس طرح اس امر کی توثیق ہوتی ہے کہ جنگلی پودہ میں ایسے تمام تفریقی عوامل کا مکمل جُٹ موجود ہوتا ہے جو میٹھے مٹر میں پائے جاتے ہیں۔

مزید برآں اس امر کی تائید ایسی تاریخی شہادت سے ہوتی ہے جو نباتاتی ادب اور قدیم تخم فروشوں کی فرستوں کو دیکھنے سے ملتی ہے۔ میٹھا مٹر اس ملک میں پہلے ۱۶۹۹ء میں لایا گیا جو مڈلسیکس (Middlesex) کے ایک ڈاکٹر یویدیل (Dr. Uvedale) کو تحفہً راہب فرانسسکس کیوپانی (Franciscus Cupani) نے سسلی سے بھیجا۔ تھوڑے عرصہ کے بعد دونوں اقسام کی اطلاع ملی۔ سُرخ دوزنگی یا پینڈ لیڈی اور سفید۔ جن میں سے ہر ایک کے لیے یہ خیال کر سکتے ہیں کہ وہ جنگلی ارغوانی سے ارغوانی عامل یا دونوں رنگین عوامل میں سے ایک کے ترک ہو جانے کی وجہ سے ”اچانک“ حاصل ہوئی۔ ۱۶۹۳ء میں ہمیں معلوم ہوا کہ بیجوں کے ایک تاجر نے ایسے پھول بھی پیش کیے جن کو وہ سیاہ اور گہرے سُرخ قسمیں کہتے ہیں۔ یہ اغلب ہے کہ یہ دراصل ہماری گہری ارغوانی اور مس ہنٹ اقسام تھیں اور یہ کہ تقریباً اسی زمانے میں ہلکے پُر کا عامل (ل) چند پودوں میں متروک ہو گیا۔ ۱۸۶۶ء میں اس بات کی شہادت موجود ہے کہ زردی مال ارغوانی یا پکونی اور اُس کے ساتھ ہی بلاشبہ ٹنچڈ وائٹ وجود میں آئے۔ اس دفعہ گہرے رنگ کا عامل تھا جو متروک رہا اور اس طرح یہ سلسلہ زمانہ حال تک جاری رہا اور اب اسی سادہ طریقہ کے ذریعہ رنگوں کی جدید قسموں یعنی ارغوانی اور

سرخ، نیلے اور گلابی، ٹوپ دار اور لہری پھولوں کے رشتہ کو ایک دوسرے اور اصل جنگلی پھول کے ساتھ ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ ان میں سے کئی کی خست معلوم کی جا چکی ہے اور اب یہ ممکن ہے کہ ان تمام مختلف اقسام کو آسانی کے ساتھ لیکن کچھ پیچیدہ طور پر ایسے حروف کے سلسلوں کے ذریعے ظاہر کر سکتے ہیں جو ان میں کے عوامل کو ظاہر کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کے نام موجودہ طریقے کے مطابق راجاؤں اور رانیوں یا ملکہ اور مشہور سپہ سالاروں اور خواتین کے نام سے ظاہر کریں۔

میٹھے مٹر کی اقسام کی تاریخ سے ہمیں جو کچھ معلوم ہوا ان میں ایک بات نمایاں ہے۔ نئی سیرت ایک پہلے سے موجودہ قسم سے کسی تدریجی انتخاب کے عمل سے پیدا نہیں ہوتی خواہ وہ انتخاب شعوری ہو یا کسی اور قسم کا۔ وہ ایک بیک اور اپنے طور پر مکمل حالت میں نمودار ہوتی ہے اور بعد میں باروری کے ذریعے دوسری موجودہ سیرتوں کے ساتھ مل کر لا تعداد نئی اقسام بنا سکتی ہے۔ مثلاً کسی نمونہ میں ٹوپ دار ہونے کی سیرت (دیکھو تختی II-۷) اگر کسی ایسے خاندان میں اچانک نمودار ہو جاتی ہے جو تختی IV میں دکھائی گئی ہیں تو یہ ممکن ہے کہ استادہ قسم میں سے ہر ایک کے جواب میں ٹوپ دار انواع حاصل ہوں۔ دوسرے معنوں میں اسے اس طرح ادا کیا جاسکتا ہے کہ نئی شکل کی آمد کی وجہ سے ہمیں بجائے سات کے چودہ اقسام حاصل ہو جائیں گی۔ ہم جانتے ہیں کہ ٹوپ دار سیرت پہلے سے موجود ہے۔ یہ استادہ نمونہ کے مقابلہ میں مغلوب ہے اور یہ فرض کرنے کے وجہ ہیں کہ یہ ایک ایسے عامل کے متروک ہو جانے کی وجہ سے اچانک نمودار ہوئی جس کی موجودگی میں یہ نمونہ جنگلی پھول کے مخصوص استادہ شکل کو اختیار کرتا ہے۔ باغبان اپنے مشاہدہ سے ایسے اچانک پیدا ہونے والے نمونوں کو ملاپ کے لیے حاصل کر کے اپنے زیر کاشت پودوں کو ”بہتر“ بناتا ہے۔ اس کا ہم ابھی کچھ تصور ہی کر سکتے ہیں کہ کس طرح یہ اچانک تبدیلیاں یا ناگہانی تبدل (Mutations) نمودار ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے پھر وہی پرانا مسئلہ پیش آتا ہے جس پر پلوٹارک (Plutarch) نے

(۸۰) کئی صدی پہلے بحث کی تھی یعنی پہلے اٹو پیدا ہوا یا انڈہ پہلے وجود میں آیا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو انڈے کے لیے رائے دیتے ہیں اور نئی شکل میں ایک ایسے نئی قسم کے زواج کو دیکھتے ہیں جس میں تقسیم کے حرب معمول عمل میں کسی خلل کی وجہ سے ایک عامل چھوٹ گیا ہو یا غالباً شریک ہو گیا ہو۔ کسی نہ کسی مرحلہ پر مختلف عوامل کی معمولی مساوی تقسیم بگڑ گئی ہو جس کی وجہ سے چند زواجوں کو بمقابلہ دوسروں کے ایک عامل کم یا ایک زیادہ ملتا ہے۔ ایسے دو زواجوں کے ملاپ سے بشرطیکہ ود اب بھی باروری کے اہل ہوں جفتہ بنتا ہے جس میں بالیدگی کے دوران میں نئی



شکل ۱۷

دو کریٹین " میٹامٹر

سیرت نمودار ہوتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ چند صورتوں میں واقعات کا تسلسل یہ ہو اور یہ کہ انڈہ اٹو سے قبل وجود میں آیا ہو۔ لیکن چند لوگ ایسے ہیں جو اٹو کے پہلے پیدا ہونے کے حامی ہیں۔

تمام اچانک نمودار ہونے والوں میں ایک نہایت عمدہ وراثت والا "کریٹین" میٹھا مٹر ("cretin" sweet-pea) ہے یہ ایک عجیب بد صورت پھول ہے جس کا نام اس کے کھلے ہوئے منہ اور نکلی ہوئی زبان کی مشابہت سے دیا گیا ہے (دیکھو شکل ۷۱)۔ یہ ایک ایسے بڑے خاندان میں یکا یک نمودار ہوا جس کا تعلق ایسی قسم سے تھا جس میں ہزاروں معمولی افراد کا مشاہدہ کئی سال تک کیا گیا تھا۔ ابتداء میں جب وہ نمودار ہوا تو وہ بمقابلہ معمولی پھول کے ایک سادہ مغلوب تھا اور اب تک بھی اس کی یہی صورت ہے۔ اس کے ۲۰۰ سے زائد معمولی ہم رشتہ پودے تھے جن میں سے کسی سے بھی بعد امتحان کریٹین حاصل نہیں ہوئے۔ اگر سلفی پودہ کافی تعداد کریٹین زوجوں کی تیار کر رہا تھا تو ہمیں یہ توقع کرنی چاہیے تھی کہ کریٹین پودے کے ساتھی بھی کافی تعداد میں کریٹین پودے پیدا کرینگے۔ اور اگر سلفی پودہ ایسے ذوالجہ نہایت کم تعداد میں پیدا کر رہا تھا تو اس کا تقریباً بالکل امکان نہیں تھا کہ پودہ پیدا کرنے والے صرف کریٹین انڈس کی باروری کریٹین زیرہ دہ سے ہوتی جبکہ ان کے مقابلہ میں معمولی زیرہ دانوں کی تعداد نہایت کثیر تھی۔ اس صورت میں شہادت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دو معمولی زادوں کا ملاپ ہوا اور یہ کہ بعد میں یکا یک نوزید جفتہ کے اندر بہت زیادہ تبدیلی ہوگئی جس کی وجہ سے معمولی عامل کسی طرح بہت گیا۔

(۸۱)

چند ناگہانی تبدل (یا اگر کوئی موجود ہیں) کا صحیح نقطہ آغاز مثل کریٹین کے مسئلہ ہو گیا ہے۔ تاہم یہ بتانے کے لیے کافی معلومات موجود ہیں کہ وہ اکثر اسی طرح سے ہوتا ہے اور نادر اور چیدہ چیدہ مثالیں اس کی معمولی نسلوں میں ملتی ہیں اور یہ کہ وہ ہمیشہ طبعی نمونوں کے مقابلہ میں مغلوب رہتا ہے۔ کچھ بھی ہو ہمیں اب تک پلوٹارک کے مسئلہ کا حل نہیں معلوم ہو سکا۔

میٹھے مٹر کی کہانی اپنی لاتعداد اقسام کے حالیہ ارتقار کے لحاظ سے صاف اور نمایاں ہے۔ یہ تمام جنگلی پودہ سے حوامل کے مسلسل اخراج

(۸۲)

کی وجہ سے حاصل ہوئے ہیں۔ شروع میں یہ تمام سیرتیں اس میں موجود تھیں اور جوں جوں جنگلی پودہ عامل کے بعد عامل کھوتا گیا تو مشتق اقسام کا طویل سلسلہ ظہور میں آیا۔ تمدن کے نتائج کتنے بھی خوبصورت کیوں نہ ہوں یہ اس وقت ہی ظہور میں آئے جبکہ جنگلی نمونہ میں انحطاط ہوا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس حد تک اس بات کو ثابت کرنے کے لیے حق بجانب ہیں کہ یہ عمل ارتقاء کے مطابق ظہور پذیر ہوا۔

در حقیقت دوسری انواع بھی موجود ہیں جن کے لیے ہمیں یہ تصور کرنا پڑتا ہے کہ اسی طریقہ سے ہی مختلف پالتو جانور حاصل ہوئے ہیں۔ مثلاً ایسی ہی صورت خرگوش کی بھی ہے جہاں زیادہ تر رنگین اقسام بمقابلہ جنگلی اگوٹی جانور کے مغلوب ہیں۔ یہی صورت ناروے کے چوہے کی بھی ہے جہاں سیاہ اور ابرص اقسام اور چٹی دار نمونے بمقابلہ جنگلی اگوٹی چوہے کے مغلوب ہیں۔ اور سوائے ایک تھک رنگ نمونہ اور خاص زرد اقسام کے جن کا ذکر بعد میں کیا جائیگا یہی صورت چھٹوں کی کئی نادر اقسام کے لیے بھی ہے۔

تاہم ایسی دوسری صورتیں پائی جاتی ہیں جن میں سیرتوں کے ملحق ہوجانے کی وجہ سے ارتقاء کا آغاز ہوا۔ ماروری اور بازگشت کی بحث میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ ایسی صورت نسل تک پیدا نہیں ہو سکتی۔ مثلاً جیسا کہ مرغیوں کی کلغیوں میں ہوتا ہے (صفحہ ۵۵)۔ سادہ کلغی کی طرف بازگشت گلابیہ اور مڑیہ کے دو عوامل کے اخراج کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ ان دونوں پالتو اقسام کے لیے یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ ہر ایک جنگلی سادہ کلغی والے پرند کے مقابلہ میں ایک نراند عامل رکھتا ہے۔ مرغی کے ارتقاء کے دوران میں یہ فرض (۸۳) کیا جاسکتا ہے کہ یہ دونوں عوامل کسی نہ کسی طریقہ سے ملحق ہو گئے ہیں۔ اور یہی صورت جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں اس اتنا ہی عامل کے لیے بھی درست ہے جس پر چند مرغیوں کی غالب سفید سیرت کا انحصار ہے۔ کبوتروں میں بھی اگر ہم نیلے پہاڑی کبوتر (Blue Rock) کو پالتو نسلوں کا سلف مانیں تو ہمیں

یہ فرض کرنا پڑیگا کہ ایک زائد سوادى عامل کسی نہ کسی درجہ پر نمودار ہوا ہے۔ اس لیے کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ سیاہ بمقابلہ نیلے کے غالب ہے اور ان کی سیرتیں اور ان میں نیلوں کے مقابلہ میں سیاہ پرندوں کی زیادتی اس امکان کو باطل کر دیتی ہے کہ ہم یہاں ایک انتاعی عامل پر بحث کر رہے ہیں۔ مزید برآں موشیوں کی بے سنگ یا منڈی ہوئی حالت بمقابلہ سنگ دار حالت کے غالب ہے۔ اور اگر ہم پالتو موشیوں کے اصل اسلاف کو سنگ دار خیال کریں جو مقول معلوم ہوتا ہے تو یہاں بھی دوران ارتقاء میں کہیں نہ کہیں ایک انتاعی عامل ملتی ہو گیا ہے۔

برخلاف اس کے یہ بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ یہ خیال کہ پالتو نسلیں ایک ہی جنگلی نوع سے حاصل ہوئی ہیں اور جو زیادہ تر دارون کے زیر اثر مانا گیا ہے بالکل مسلمہ نہیں بلکہ بعض اوقات اس پر اعتراض ہو سکتا ہے۔ اس طرح یہ بتدیج تسلیم کیا گیا ہے کہ پالتو مرغیوں کی مختلف نسلیں جنگلی ہندوستانی مرغی گیلنس بینکیوا (= قر و جنیش) *Gallus bankiva* (Ferrugineus) سے حاصل ہوئی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس نوع میں روپہلی (صفحہ ۸۰ و ۸۱) کے لیے کوئی عامل نہیں پایا جاتا جو پالتو مرغیوں کی ایک خصوصیت ہے اور اگر ہم گیلنس بینکیوا کو ہی ان کا مولد خیال کریں تو اس عامل کی موجودگی کو ثابت کرنے میں ہمیں فوراً مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہر حال جب یہ دیکھا جائے کہ روپہلی کے لیے عامل گیلنس سونیرائی (*G. sonnerati*) میں ملتا ہے اور یہ کہ اس نوع اور گیلنس بینکیوا کے ملاپ سے بار آور پرند حاصل ہوتے ہیں تو اس مسئلہ کو دوسری روشنی میں دیکھا جاسکتا ہے۔ دراصل جنگلی مرغیوں کی موجودہ چاروں انواع کے لیے یہ معلوم ہے کہ وہ چند بار آور پرند پیدا کرتی ہیں خواہ وہ ملاپ ان چاروں میں ہوا یا یہ ملاپ پالتو مرغیوں سے ہو اور یہ بہت ممکن ہے کہ موجودہ مرغیوں میں جو بہت زیادہ اقسام ملتی ہیں وہ ابتدائی طور پر زیادہ تر مختلف انواع کے باہمی ملاپ کی وجہ سے ہو۔ مزید برآں کولمبا لویا (*Columba livia*) کے لیے جو پالتو کبوتروں کا مشہور مولد ہے گھیگی (*Ghigi*) نے یہ ثابت

(۸۴)

کیا کہ وہ کولمبیا یو کو نوٹا (C. Leuconota) سے ملاپ کے بعد بار آور پرنڈ پیدا کرتا ہے۔ ایک دیے ہوئے نمونے کے بارے میں کسی ایسے نمونے کے لحاظ سے جس سے وہ راست حاصل ہوا ہے ہم ایک عامل کے شامل ہونے یا کم ہونے کی بابت ہی کہہ سکتے ہیں اور اب اس کے خلاف کوئی شہادت موجود نہیں ہے کہ بعد کے پالتو جانوروں کی ابتداء صرف ایک ہی جنگلی نوع سے ہوئی ہے۔ فی الحال پالتو نمونوں میں غالب سیرتوں کے ابتداء کا مسئلہ مشکوک ہے اور یہ اسی طرح رہیگا جب تک کہ ہمارے پاس مزید مواد تشریحی انواع کی باہمی باروری کے اثرات سے متعلق موجود نہ ہو۔

نوال باب


صنفی رابطہ

(۸۵)

بینڈلی سیرتوں سے ظاہر کردہ مظاہر کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نمایاں اور
 ہیں یہی صورت صنف کے مظاہر کی بھی ہے۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ ابتدا میں ان
 دونوں اقسام کے مظاہر کا ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جاتا۔ عام اصولوں کے طور پر ایک
 نر اور ایک مادہ کے ملاپ سے دونوں صنفیں تقریباً مساوی تعداد میں پیدا ہوتی ہیں
 اسی طرح ایک دگر جفتی غالب اور ایک مغلوب کا ملاپ مساوی تعداد میں مغلوب اور
 دگر جفتی غالب بناتا ہے۔ اس لیے کیا یہ ممکن نہیں کہ ان صنفوں میں سے ایک صنف
 ایک ایسے عامل کے لیے دگر جفتی ہے جو دوسری صنف میں نہیں پایا جاتا اور یہ کہ
 اس عامل کی موجودگی یا عدم موجودگی جفتہ کے صنف کا تعین کرتی ہے؟ اس امر کی
 توثیق کم از کم کئی خاص صورتوں میں کثیر تجرباتی کام کے نتائج سے ہوتی ہے۔ ایک
 نہایت عمدہ مثال مرغیوں کی لی جاسکتی ہے۔ مرغیوں کی کئی نسلیں سنہری
 اور روپیلی قسم کی ہوتی ہیں۔ اور یہ دونوں پرند صرف رنگ کے لحاظ سے
 ہی مختلف ہوتے ہیں۔ سنہری حاشیہ والے ویانڈوٹ کا مماثل
 روپیلی حاشیہ والے ویانڈوٹ میں۔ سنہری لکیر والے ہیمنڈورگ
 کا مماثل روپیلی لکیر والے ہیمنڈورگ اور سنہری سیرانٹ بیٹمنٹم

(۸۶)

تختی ۵



سبرایت سینگ مرغیاں (Sebright Bantams)

کا مثل روپہلی سیراٹ بنیٹم مرغیوں میں ملتا ہے اور یہی صورت دوسری کئی اقسام میں پائی جاتی ہے۔ سنہری اور روپہلی مرغیوں کی اگر خود ان کی قسم سے باروری کرائی جائے تو اصل رنگ ہی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ان کی باہمی باروری کرائیں تو چند معین اور خاص نتائج حاصل ہوتے ہیں جن کا اندازہ تختی V کو دیکھنے سے بخوبی ہو سکتا ہے۔ ایک خالص نسل کے روپہلی مرغ کو ایک خالص سنہری مرغی سے ملانے پر تمام بچے روپہلی حاصل ہونگے اور جب ایسے پرندوں کو آپس میں بارور کرایا جائے تو وہ ایک ایسی نسل پیدا کریں گے جس میں روپہلی اور سنہری کا تناسب ۱:۳ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ روپہلی بمقابلہ سنہری کے سادہ غالب کی طرح عمل کرتا ہے لیکن اس نسل میں ایک خاص بات یہ ہے کہ تمام سنہری مغلوب پرند مادہ ہوتے ہیں۔ باروری کے وقت سنہری رنگ مادہ کی طرف چلا گیا اور جب یہ نسل میں پھر نمودار ہوا تو وہ صرف اسی صنف میں قائم رہا۔ گویا وہ اس طرح عمل کرتا ہے کہ وہ مادہ پن سے مربوط تھا اور اسی وجہ سے ایسی وراثت کو صنف رابطی کہتے ہیں۔

صنفی رابطہ کا یہ منظر معکوس یا مغلوب باروری یعنی ایک روپہلی مرغی اور سنہری مرغ کے ملاپ میں اور بھی زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ یہاں تمام نر چوزے مثل ماں کے روپہلی ہونگے لیکن ان کے مقابلے میں مادہ چوزے اپنے باپ کے مثل سنہری رہیں گے۔ ایسی "الٹ پھیر" وراثت اس وقت ہوتی ہے جبکہ ایک روپہلی مرغی کو خواہ وہ کسی طرح بھی حاصل ہوئی ہو سنہری مرغ سے ملایا جائے۔ اس لحاظ سے ایک خالص ترین روپہلی بھی ہمیشہ ایک حقیقی دوغلے کی طرح عمل کرتی ہے۔ اس طرح ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ روپہلی مرغی کے اندھے دو قسم کے ہونگے یعنی وہ جو روپہلی رنگ اور نر پن کے حامل ہیں اور وہ جو سنہری رنگ اور مادہ پن کے حامل ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم مادہ کو ایسے عامل کے لحاظ سے دگر جھنتی خیال کریں جو صنف کا تعین کرتا ہے برخلاف اس کے نر اس لحاظ سے ہم جھنتی ہے۔ اس لیے کہ ہم صنفوں کے تقریباً مساوی تعداد میں نمودار ہونے کی توضیح کسی دوسرے طریقے پر نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ

انتخابی باروری کے کسی عمل کا مفروضہ نہ کیا جائے۔ اور ایسا کرنے کے لیے ہم حق بجانب نہیں ہیں۔

تختی ۷ کو بغور دیکھنے سے یہ نمایاں ہو جائیگا کہ صنف کے لحاظ سے مرغ اور مرغی کی نوعیت کا یہ مفروضہ صنف رابطی وراثت کے عجیب امور کا سادہ ترین حل فراہم کرتا ہے۔ ہم دگر جفتی مادہ کے لیے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ زبرد دار (ح) اور مادہ بردار (م) انڈے مساوی تعداد میں دیتی ہے برخلاف اس کے ہم جفتی زبرد دار زبرداری حوین ہی پیدا کرتا ہے۔ م انڈے اور ح منوی حوین کا ملاپ م ح جفتہ مثل ماں کے بناتا ہے یعنی یہ ایک مادہ پرند ہوگا۔ ح انڈہ اور ح منوی حوین کے ملاپ سے ح ح جفتہ مثل باپ کے بنیگا یعنی یہ زبرد دار ہوگا۔ جیسا کہ تختی ۷ کی بائیں جانب دکھایا گیا ہے جب زرخاں روپہلی اور مرغی سنہری ہو تو تمام بچے غالب روپہلی سیرت کے لیے دگر جفتی ہونگے اور اس لیے لازمی طور پر وہ تمام رنگ میں روپہلی ہی رہیں گے۔ ایسے ن مرغوں سے روپہلی اور سنہری زبرداری حوین مساوی تعداد میں حاصل ہونگے لیکن مادہ پرن اور سنہری سیرت کے باہمی ربط کی وجہ سے ن کی روپہلی مرغی صرف دو قسم کے انڈے دیتی ہے یعنی مادہ بردار سنہری اور زبرد دار روپہلی اور یہ مساوی تعداد میں دیے جاتے ہیں۔ کسی سنہری مادہ بردار انڈے کو ایک سنہری یا ایک روپہلی منوی حوین کے ذریعے باروری کے لیے مساوی موقع حاصل ہوتا ہے۔ اول الذکر سے ایک دگر جفتی روپہلی ♀ اور ثانی الذکر سے سنہری مادہ حاصل ہوگی۔ پھر کوئی روپہلی زبرد دار انڈہ کو ایک روپہلی یا ایک سنہری منوی حوین سے بارور ہونے کا مساوی موقع حاصل رہتا ہے۔ پہلے سے ایک ہم جفتی روپہلی م اور دوسرے سے ایک دگر جفتی روپہلی ن حاصل ہوگا۔ اس طرح ہم ن نسل کو سادہ طور پر سمجھا سکتے ہیں جس میں (۱) تمام سنہری مغلوب مرغیاں ہیں۔ (۲) تمام روپہلی مرغیاں روپہلی کے لیے دگر جفتی ہیں (۳) تمام مرغ روپہلی ہیں۔ اور (۴) ان میں سے نصف روپہلی سیرت کے لیے ہم جفتی ہیں۔

اب تختی کی دوسری جانب دیکھیں جس میں مغلوب باروری یعنی ایک روپہلی مرغی اور سنہری مرغ کی باہمی باروری کا نتیجہ دکھایا گیا ہے۔ چونکہ

تمام سنوی حوین مغلوب سنہری سیرت کے حامل ہیں۔ اس لیے یہ بارہوی
ایسے نابتنی خلیوں کی نوعیت کو ظاہر کرتی ہے جو روپہلی مرغی پیدا کرتی ہے۔ یہ امر کہ
صرف سنہری مرغیاں اور روپہلی مرغی ہی نمودار ہوتے ہیں ظاہر کرتا ہے کہ روپہلی مرغی صرف
دو قسم کے انڈے یعنی سنہری مادہ بردار اور روپہلی نر بردار پیدا کر رہی ہے۔ بالفاظ دیگر
اگرچہ وہ ایک "خالص" روپہلی ذات کی ہے پھر بھی وہ ایسی ن مرغی کی طرح پورے طور
پر عمل کر رہی ہے جو سنہری ♀ × روپہلی ♂ سے حاصل ہوتی ہو۔ ن پرندوں کے
بارہی ملاپ یعنی سنہری مرغی اور دگر جنتی روپہلی مرغی سے ہمیں ایک ایسی ن کی توقع
رکھنی چاہیے جو مساوی تعداد میں ہر دو صنفوں کے روپہلی اور سنہری پرندوں پر
مشتمل ہوگی۔ کیونکہ سنہری مرغی کے لیے یہ خیال کیا گیا ہے کہ وہ مساوی تعداد میں
نر اور مادہ بردار سنہری انڈے دیگی اور چونکہ روپہلی مرغی مساوی تعداد میں روپہلی
اور سنہری نر بردار سنوی حوین بنائینگا اس لیے ان دونوں اقسام کے انڈوں میں
سے ہر ایک کو دونوں اقسام کے سنوی حوین میں سے ہر ایک کے ساتھ بارہ ہونے کا
مساوی موقع حاصل رہتا ہے۔ مادہ بردار انڈوں سے مساوی تعداد میں روپہلی
اور سنہری مرغیاں پیدا ہونی چاہئیں اور نر بردار انڈوں سے مساوی تعداد
میں روپہلی اور سنہری مرغی پیدا ہونگے۔ تجربہ کرنے سے ظاہر ہوا کہ دراصل
ایسا ہی ہوتا ہے۔

(۸۹) صنف رابطی وراثت کے امور اس نتیجہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مہولی
حالت میں ایک ایسا معین صنفی عامل موجود ہے جس کے لحاظ سے ایک صنف
دگر جنتی اور دوسری ہم جنتی ہوتی ہے اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ دگر جنتی صنف
کونسی ہے۔ مرغیوں میں یہ مادہ ہے لیکن دوسرے حیوانوں میں جیسا کہ ہم بعد
میں دیکھینگے یہ نہ ہو سکتا ہے۔ بہر حال واقعات ہمیں اس بات کی اجازت نہیں
دیتے کہ صنف کو نظر یہ حاضر و غائب کی رقوم میں بیان کریں۔ مواد جواب تک
ہمیں ملا ہے اس کے مطابق ہم یہ خیال کرنے کے لیے آزاد ہیں کہ ایک نر اور
مادہ کے ملاپ کو ایک ہم جنتی مغلوب اور دگر جنتی غالب کا میل سمجھیں یا ایک
ہم جنتی اور ایک دگر جنتی کے درمیان ملاپ جہاں جیسے کہ اندسی مرغیوں میں ہوتا

نمایاں غلبیت نہیں پائی جاتی۔ کسی نتیجہ پر پہنچنے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے پرند کی نوعیت کیا ہوگی جو دونوں والدین سے مادہ بردار عنصر حاصل کرتا ہے اور اس کو جیسا کہ صورت حال سے ظاہر ہے آسانی کے ساتھ معلوم نہیں کیا جاسکتا۔ اور دراصل جیسا کہ ہم بعد میں دیکھیں گے حالانکہ صنف عموماً صریح افتراق ظاہر کرتی ہے وہ ایسی مختلف سیرتوں کے لحاظ سے جداگانہ نوعیت کی ہو سکتی ہے جن پر ہم نے اب تک غور کیا ہے۔

صنف رابطی وراثت پرکئی دوسری سیرتوں کے مدنظر مرغیوں پر کام کیا گیا ہے۔ ان میں سے زیادہ مشہور پلیسٹھ راکٹ اور دوسری ذات کی مرغیوں میں ”دھاری دار“ پروں کی سیرت ہے ان میں پروں کے اوپر متبادل طور پر سیاہ اور سفید عرضی دھاریاں ہوتی ہیں۔ دھاری دار حالت خود سیاہی کے مقابلے میں غالب ہے اور باروری میں سیاہ کے ساتھ بالکل اسی طرح عمل کرتی ہے جیسے کہ روپہلی سنہری کے مقابلے میں۔ اور یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دھاری دار اور سیاہ کا درمیانی فرق اور اسی طرح روپہلی اور سنہری پرندوں میں باہمی فرق انڈے سے نکلے ہوئے چوزوں کے روؤں میں ہی ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا چوزہ جو دھاری دار پر پیدا کریگا ایک ہلکا دھبہ سر کے پیچھے ظاہر کرتا ہے جو ایسے چوزہ میں نہیں پایا جاتا جو بڑا ہو کر کامل سیاہ کے طور پر بنو پائیگا۔ ایک ایسے چوزہ میں جو سنہری پرند کے طور پر بنو پائیگا روؤں کا بنیادی رنگ سنہری زرد ہوگا برخلاف اس کے ایک چوزہ جو سنہری پرند کے طور پر بنو پائیگا بنیادی رنگ فاختی زرد ہوگا۔ بناء برسی دھاری دار ♀ × سیاہ ♂ یا روپہلی ♀ × سنہری ♂ کے ملاپ سے چوزوں کو انڈوں سے نکلنے ہی ان کی متعلقہ صنفوں میں علیحدہ کیا جاسکتا ہے معاشی نقطہ نظر سے یہ تجارت کے لیے نہایت مفید ثابت ہوا اور اب اکثر تاجر اپنی توجہ انڈوں کی تجارت کے لیے اس طرح چوزے چل کرنے میں مرکوز کر رہے ہیں۔

Plymouth Rock

۱۰ صنفی رابطہ پر میں نے اپنی کتاب مرغیوں میں وراثت (Heredity in Poultry) میں پوری طرح بحث کی ہے جس سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ کتاب سیکلن اینڈ کمپنی نے ۱۹۲۳ء میں شائع کی ہے۔

دو دوسرے عوامل جو مرغیوں میں صنف رابطی وراثت کو ظاہر کرتے ہیں اتنا ہی نوعیت کے ہیں۔ ان میں سے ایک طبعی مرحلہ پر پروں کے معمولی نمو کو روک دیتا ہے اور اس طرح چوڑے انڈے سے نکلنے کے کئی ہفتہ بعد تک عجیب "برہنہ" حالت ظاہر کرتا ہے۔ دوسرا عامل ایسے لون کے نمو کو منع کرتا ہے جو چند اقسام میں ان کی جابگوں اور جسم کے دوسرے حصوں پر پایا جاتا ہے۔

قری (قرقور دیسوریس: *Turtur risorius*) میں ایک سفید ذات ملتی ہے جو معمولی ریشمی رنگ کے مقابلہ میں مغلوب ہے اور پروں کی سیرتوں کا یہ جوڑا، معمولی اور سفید، صنف رابطی وراثت کا اظہار کرتے ہیں۔ کبوتر میں بھی ریشمی پروں کی سیرت مثل مرغی کے معمولی کے مقابلہ میں مغلوب ہے اور یہ صنف رابطی طور پر عمل کرتی ہے۔ کنارہ چڑیا میں صنفی ربط یا قوتی آنکھ والی ناسی چڑیا پر تجربہ کے دوران میں ملا ہے۔ یہ رنگ معمولی گہرے آنکھ والی چڑیا کے مقابلے میں مغلوب ہے اور بلاشبہ دوسری مثالیں بھی ہمیں ملینگی جب پرندوں کی مختلف انواع میں ہمیں سیرتوں کی وراثت کا زیادہ علم ہو جائیگا۔

صنفی ربط کی ایک نہایت قدیم مثال معمولی کشمش کے پروانے ابراکیس گراسلیرٹیٹا (*Abraxas grossulariata*) میں ملتی ہے جس میں



شکل ۱۸

ابراکیس گراسلیرٹیٹا (*Abraxas grossulariata*) معمولی پروانہ اور (دائیں جانب) اس کی ہلکی زرد رنگ لیکٹی کلر (Lacticolor) قسم

ایک زردی مائل قسم لیکٹی کلر (lacticolor) پائی جاتی ہے۔ یہ لیکٹی کلر پروانہ معمولی کیڑے کے مقابلے میں مغلوب ہے اور ڈنکاسٹ اور دینور کے کام سے ظاہر ہوا کہ وہ پرندوں کے صنف رابطی وراثت سے مطابقت کرتی ہے۔ کشمکش کے پروانہ سے متعلق ایک اور دلچسپ بات ہے۔ لیکٹی کلر ایک کمیاب کیڑے کی شکل میں جنگلی طور پر ملتا ہے حالانکہ برطانیہ عظمیٰ میں یہ لنکا شائر کے شمال میں کبھی دستیاب نہیں ہوا۔ تاہم جب اسکاٹلینڈ کی گراسلیر ٹیٹا مادہ کو جب لیکٹی کلر نر سے ملایا گیا تو صرف گراسلیر ٹیٹا نر اور لیکٹی کلر مادہ ہی حاصل ہوئے۔ ان جگہوں پر بھی جہاں لیکٹی کلر کبھی جنگلی حالت میں نہیں ملا تمام گراسلیر ٹیٹا مادائیں دگر جفتی ہیں۔

(۹۲) تتلیوں میں صنفی ربط کئی بڑے گروہوں کی نوعیت کو سمجھانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ مسئلہ ایک عرصہ سے ایسے حیاتیات دانوں کو دلچسپی کا باعث رہا جو مستوریت (mimicry) کے نظریہ پر کام کر رہے تھے کئی ایسی انواع پائی جاتی ہیں جن میں دو یا زیادہ قسم کی مادائیں صرف ایک ہی نمونے کے نر کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ اس کی ایک نہایت عمدہ مثال ہندوستانی ابا بلی دم تتلی (Papilio polytes: پپیلیو پولائیٹس) ہے جو تختی VI میں دکھائی گئی ہے۔ اس نوع میں تین قسم کی مادائیں ہوتی ہیں جو ساتھ ساتھ اڑتی پھرتی ہیں۔ ان میں سے ایک نر سے مشابہ ہے لیکن دوسری دونوں میں سے ہر ایک جداگانہ نمونہ اور رنگ ظاہر کرتی ہے۔ ثانی الذکر دونوں تتلیاں علی الترتیب دو ایسی تتلیوں سے مشابہت رکھتی ہیں جن کا تعلق ایک دوسرے قریبی جنس (فارمیکو فیکس (Pharmacophagus) سے ہے جن کے لیے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ناپسند ذائقہ کی موجودگی کی وجہ سے اپنے دشمنوں سے محفوظ رہتی ہیں۔ سُرخ، سفید اور سیاہ رنگوں کا یہ نمایاں امتزاج "بہنیشی" رنگ کی نوعیت کا خیال کیا جاتا ہے۔ یہ ان تمام جانوروں کے لیے آگاہی کا فعل انجام دیتا ہے جو اس کے ناپسند ذائقہ کی وجہ سے اس کو



پاپلیو پولیس، *Papilio polytes* سیلون کی تیریلوں میں (۱) نر اور (۲، ۳، ۴) مادہ نمونوں کو ظاہر کرتے ہیں۔

نہیں پکڑتے۔ زر کے برخلاف پولائیٹس (Polytes) مادوں کی یہ دونوں قسمیں مستوریت کے نظریہ کے مطابق اپنی مشابہت فارمیونیٹس کی دونوں ناگوار ذائقے والی انواع کے، مماثل طبعی انتخاب کے آہستہ عمل کے ذریعہ حاصل کر لی ہیں اس لیے کہ ان کی نقل کر کے تنبیہی رنگوں کو ظاہر کر کے وہ اپنے دشمنوں سے محفوظ رہیں۔ فرائیئر (Fryer) نے پیلیو پولائیٹس پر متعدد تجربات کیے اور اس نے یہ بتایا کہ مختلف اقسام کے مابین ایک ایسا تناسلی رشتہ پایا جاتا ہے جو تین معین عوامل کے رقوم میں سمجھایا جاسکتا ہے۔ ان میں سے ایک (۹۳) کو دونوں مستوری تشکیلوں کا مانع خیال کر سکتے ہیں جو پورے طور پر ان سیرتوں کو دگر جنتی حالات میں نہیں بلکہ ہم جنتی صورت میں دبا دیتا ہے۔ اگر یہ خیال کیا جائے کہ مانع عامل صنف رابطی طور پر منتقل ہو سکتا ہے تو یہ اس کے لحاظ سے ہمیشہ ہم جنتی ہونا چاہیے اور مادہ دگر جنتی۔ تجرباتی شہادت یہ ثابت کرتی ہے کہ ”مستوریتی“ عوامل کا حامل ہو سکتا ہے اور اپنے بچوں میں معمولی مینڈلی اصول کے تحت ان کو منتقل کر سکتا ہے۔ امکانی طور پر وہ بھی ”مستوریتی“ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اس کو ایک صنف رابطی مانع عامل کی موجودگی کی وجہ سے ظاہر نہیں کر سکتا۔ تناسلی نقطہ نظر سے یہ اس صورت کا لب لباب ہے۔ پیلیو پولائیٹس کئی تتلیوں کی طرح ایک ایسی نوع ہے جو مختلف نمایاں قسم کے اشکال ظاہر کرتی ہے اور ان اشکال کا انحصار ایسے معین عوامل پر ہے جو معمولی طریقہ پر منتقل ہوتے ہیں۔ ایسی انواع کو ”کثیر شکلی“ (Polymorphic) کہتے ہیں اور اکثر انواع میں دونوں صنفوں میں سے ہر ایک کوئی بھی رنگین نمونہ شکل ہی طرح ظاہر کر سکتی ہے جس طرح سے خرگوش میں پوشش کے مختلف رنگ دونوں صنفوں میں ہوتے ہیں۔ یہ صرف انہی صورتوں میں ہوتا ہے جہاں ایک صنف رابطی روکنے والا عامل چند رنگ کے نمونوں کے لیے موجود ہو تو ہمیں مثل پولائیٹس کے ایک ہی وضع کا مز مختلف قسم کی کئی مادوں کے ساتھ ملتا ہے۔ مستوریت ایسی ہی صورتوں میں داخل ہوتی ہے جبکہ ان کی ایک یا زائد اقسام تتلیوں کی چند دوسری انواع سے مشابہت رکھتی ہوں۔ مادہ کثیر شکلیت


بغیر مستوریت کے بھی پانی جاتی ہے جیسا کہ روپہلی فریڈیلری آرگنٹس پافیا (Argynnis Paphia) میں ہوتا ہے۔ اس میں دو قسم کی مادائیں ملتی ہیں یعنی تمثیلی شکل اور ایک گہرے رنگ کی جس کو ویلیساٹنا کہتے ہیں۔ چند تعلقوں میں دونوں لمونے دستیاب ہوتے ہیں دوسروں میں یا تو تمثیلی یا صرف ویلیساٹنا قسم ہی ملتی ہے۔ لیکن تمام تعلقہ جات میں نر ایک ہی وضع کے ہوتے ہیں جو بجائے ویلیساٹنا کے تمثیلی شکل سے مشابہ ہیں۔ باروری کے تجربات سے ظاہر ہوا کہ ویلیساٹنا تمثیلی شکل پر غالب ہے اور نر مضمر طور پر یا تو ویلیساٹنا یا تمثیلی ہوگا۔ بہر حال وہ اپنی تناسلی بناوٹ کو ظاہر نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ ہمیشہ ایک دبانے والے عامل کے لیے ہم جفتی ہوگا جس کی منتقلی صنف رابطی اصول پر ہوتی ہے۔

(۹۴)

یہ ایک عجیب بات ہے اور ان میں سے ایک کے لیے ہمارے پاس اب تک کوئی تشفی بخش جواب نہیں وہ یہ ہے جبکہ جانوروں کے چند گروہوں میں صنفی ربط کے نتائج مادہ کے لیے دگر جفتی صنف ظاہر کرتے ہیں دوسروں میں یہ یقینی طور پر نر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بعد کی صورت لکھوں کے لیے درست ہے۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے ہم ایک مثال چھوٹی سیب یا سرکہ کی مکھی ڈروسوفایلا ملانوگیسٹر (Drosophila melanogaster) کی لے سکتے ہیں۔ اس چھوٹی مکھی کی آنکھ کا رنگ سُرخ ہوتا ہے لیکن چند مجموعوں میں جو تجرباتی مقصد کے لیے تقریباً بیس سال قبل رکھے گئے تھے کبھی کبھی ایسے نمونے دیکھے گئے جن میں آنکھیں سفید تھیں۔ یہ افراد نر ثابت ہوئے اور ان کا ملاپ معمولی سُرخ آنکھ والی ماداؤں سے کرایا گیا تاکہ ایک ایسی سیرت کی وراثت کی جانچ کی جا سکے جو اب تک دروسوفایلا میں نہیں ملی تھی۔ دونوں صنفوں کی نر مکھیاں سُرخ آنکھ والی تھیں اور جب ان کو آپس میں بارور کرایا گیا تو نر نسل سُرخ اور سفید آنکھ والوں کے ۳:۱ تناسب پر مشتمل تھی۔ لیکن یہ تمام مغلوب سفید نر تھے۔ تمام نر مادائیں سُرخ تھیں اور جب تجربوں کو آگے بڑھایا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ ہم جفتی اور دگر جفتی افراد

(۹۵)

جوان میں لے وہ تعداد میں تقریباً مساوی تھے۔ جیسا کہ شکل ۱۹ اور ۲۰ میں




شکل ۱۹

مرغیوں اور ڈروسوفائیلا میں صنف رابطی وراثت کی متوازی
نوعیت کو ظاہر کرنے کے لیے نقشہ۔

بتایا گیا ہے ڈروسوفائیلا کی یہ صورت سنہری اور روپہلی مرغیوں کے
بالکل متوازی ہے سوائے اس کے کہ مرغیوں میں مغلوب سیرت کا تعلق
صرف مادہ سے ہے اور مکھیوں میں یہ نر سے متعلق ہے۔ بعد کے تجربات
سے ظاہر ہوا کہ اس متوازی صورت کی توثیق پوری طرح جوابی ملاپ کے
نتیجے سے ہوئی۔ جب ایک سفید آنکھ والی مادہ کو ایک سُرخ آنکھ والے
نر سے ملایا گیا (وہ بہر حال کسی طرح سے ہی حاصل ہوا ہو) تو نتیجہ کے
طور پر ہمیشہ ایسی نسل حاصل ہوئی جو صرف سُرخ آنکھ والی مادوں اور
سفید آنکھ والے نروں پر ہی مشتمل تھی۔ اسی نمونہ کی ”الٹ پھیر“ وراثت
ظاہر ہوتی ہے جیسی کہ روپہلی مرغی اور سنہری مرغی کو ملانے سے حاصل ہوئی
تھی سوائے اس کے کہ صنفیں اول بدل ہو گئی ہیں۔ مرغیوں میں الٹ پھیر
نتیجہ اس وقت حاصل ہوا جبکہ غالب روپہلی مادہ کو مغلوب سنہری مرغی سے
ملایا گیا۔ ڈروسوفائیلا میں یہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جبکہ غالب سُرخ
آنکھ والے نر کو مغلوب سفید آنکھ والی مادہ سے ملایا گیا۔ اور ہر صورت میں

حاصل شدہ نسل یکساں ہے جو دونوں صنفوں کی دیگر جفتی




شکل نمبر

مرغیوں اور ڈوسو فائیلہ میں الٹ پھیر وراثت کی متوازی
نوہیت کو ظاہر کرنے کے لیے نقشہ۔

غالب اور مغلوب کھپیوں کی مساوی تعداد پر مشتمل تھی۔ صریح طور پر ہمیں یہاں
نر کو دیگر جفتی صنف خیال کرنا ہوگا جو نر بردار اور مادہ بردار سنوی حین مساوی
تعداد میں بناتا ہے لیکن مادہ اس لحاظ سے صرف ایک ہی قسم کے انڈے
دیتی ہے۔

اب اس قسم کی صنف رابطی وراثت کھپیوں کی دوسری انواع میں
معلوم کی گئی ہے اور چند فقریوں میں بھی۔ یہ پھیلیوں کی کم از کم دو انواع
میں ملی ہے اور ایسا مواد بھی دستیاب ہوا ہے جس کی رو سے ایمنیہ میں ہمیں
نر کو دیگر جفتی صنف خیال کرنا چاہیے۔ پستانوں میں بھی ہمیں اس کی موجودگی
کی کافی شہادت ملتی ہے۔ ایک نہایت عمدہ مثال چٹی دار بلی کی ہے جس کے
پے ڈنکاسٹرنے بتایا کہ وہ بھی اسی اصول پر سمجھائی جاسکتی ہے۔ یہ عام طور پر معلوم
ہے کہ چٹی دار بلیاں تقریباً ہمیشہ مادہ ہوتی ہیں اور تجربہ کرنے سے ظاہر ہوا کہ وہ

سیاہ x زرد کے ملاپ سے حاصل شدہ دگر جفتی جانور ہیں۔ جب ایک زرد مادہ کو سیاہ بٹے سے ملایا جائے تو نرینچے زرد اور مادہ چٹی دار ہونگے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زرد رنگ نر میں غالب لیکن مادہ میں نامکمل طور پر غالب ہوتا ہے۔ ایسے جانوروں کی باہمی باروری کرانے پر ایک ایسی نسل دستیاب ہوئی جس میں زرد اور چٹی دار بلیاں تھیں اور ان کے علاوہ زرد اور سیاہ نر تقریباً مساوی تعداد میں پائے گئے۔ مغلوب سیاہ نر نسل میں مثل سفید آنکھ والے ڈروسوفائیلز کے پھر نمودار ہوتا اور صرف نر صنف تک ہی محدود رہتا ہے۔ اگر ہم تصور کریں کہ دگر جفتی مادہ بجائے زرد کے چٹی دار ہے تو شکل ۱۹ کے دکھائے ہوئے نتائج شکل ۱۹ کے بتائے ہوئے نتائج سے بالکل مطابقت کرتے ہیں۔ (۹۴) علاوہ اس کے جوابی ملاپ کے نتائج ایسے ہیں جن کی نظری طور پر توقع کی جاسکتی ہے۔ سیاہ مادہ اور زرد نر کی باروری سے حاصل شدہ نر نسل چٹی دار مادہ اور سیاہ نروں پر مشتمل ہوگی۔ ایسے جانوروں کا جب آپس میں ملاپ کیا جائے تو مساوی تعداد دگر جفتی اور مغلوب جانوروں کی دونوں صنفوں میں حاصل ہونی چاہیے۔




شکل ۱۹

ایک سیاہ بٹے اور زرد مادہ کی باروری کے نتیجہ کو ظاہر کرنے کے لیے خاکہ۔ اس کا مقابلہ شکل ۱۹ سے کرو۔

اور دراصل یہی صورت حال ہے (دیکھو شکل ۱۹)۔ اس نتیجہ میں چٹی دار بلیوں کی موجودگی

کی وجہ سے دقت ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ بہت نایاب ہیں پھر بھی ان کے نمودار ہونے کا کوئی امکان نہ ہونا چاہیے لیکن فی الوقت ان کی نسل سے متعلق اتنی کم معلومات ہیں جن سے ہم ان کی نوعیت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بہر حال یہ بات قابل توجہ ہے کہ صرف کم از کم ایک صورت میں جبکہ اس سے نسل حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو ایسا جانور بالآخر ثابت ہوا۔

فقریوں کی دوسری نوع جو ایسی مثالیں فراہم کرتی ہے جن کو ڈوسوفا ٹیلا نمونہ صنّفی محدود وراثت کا کہتے ہیں خود انسان ہے۔ یہ عام تجربہ ہے کہ چند




شکل ۲۲

ایک زرد بچہ اور سیاہ مادہ کی بادروری کے نتیجے کو ظاہر کرنے کے لیے خاکہ۔
اس کا مقابلہ شکل ۲۱ سے کرو۔

نقائص مثلاً رنگ ناشناسی بمقابلہ عورتوں کے مرد میں نسبتاً زیادہ پائی جاتی ہے۔ ایسے خاندانوں کے گئی نسب سلسلے حال میں جمع کیے گئے ہیں جن میں رنگ ناشناسی پائی جاتی ہے اور سوائے چند استثناء کے ان کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ (الف) اگر رنگ ناشناس حالت معمولی حالت کے مقابلہ میں مغلوب ہے۔ (ب) کہ یہ ایسی سیرت ہے جو صنّفی محدود وراثت ظاہر کرتی ہے اور (ج) یہ کہ مثل ڈروسوفا ٹیلا کے مادہ ہم جفتی اور نر دگر جفتی ہوتا ہے۔ اگر ہم اشکال ۱۹ اور ۲۱ میں معمولی کوٹخ آنکھ کی بجائے اور رنگ ناشناس کو سفید آنکھ کی بجائے منتقل کر دیں تو ڈروسوفا ٹیلا

کا خاکہ انسان میں رنگ ناشناسی کی وراثت کو نمایاں کر دیگا۔ رنگ ناشناس عورتوں کا شاذ ہی نمودار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اُس وقت ہی ظاہر ہوتی ہیں جبکہ ملاپ ایک رنگ ناشناس مرد اور ایک دگر جفتی عورت کا ہو بالکل اسی طرح جیسے کہ صرف سفید ڈسروسو فائیلہ مادہ ہی اسی وقت پیدا ہوئی جبکہ دگر جفتی مادہ اور ایک سفید آنکھ والے نر کا ملاپ کرایا گیا۔ چونکہ نہ تو رنگ ناشناس مرد اور نہ دگر جفتی عورتیں (یا) "منتقل کرنے والی" جیسا کہ ان کو اصطلاحی طور پر کہتے ہیں) عام ہیں۔ اس لیے




شکل ۱۳

ینٹلشپ خاندان کے رنگ ناشناس نسبی سلسلہ کا ایک حصہ۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے رنگ ناشناس عورتوں کے بیٹے تمام رنگ ناشناس ہیں لیکن عورتیں حالانکہ اس سیرت کی حامل ہیں معمولی ہیں۔ وہوں رنگ ناشناس عورتوں کے باپ کی بابت کچھ علم نہیں۔ نظری لحاظ سے وہ رنگ ناشناس ہونا چاہیے۔ یہ کہ ماں اس سیرت کو منتقل کرنے والی تھی اُس کی اس امر سے توثیق ہوتی ہے کہ جب ایک بہن کا ملاپ معمولی آدمی سے ہوا تو اُس نے اپنے بچوں میں رنگ ناشناس بیٹے پیدا کیے۔

ان کے درمیان شادی کے امکان بہت ہی شاذ ہیں۔ برخلاف اس کے کوئی عورت "منتقل کرنے والی" اگر ایک معمولی مرد سے ملاپ کرے تو وہ معمولی اور رنگ ناشناس بچے ۱:۳ کے تناسب میں پیدا کریں گی اور ایسی صورتوں میں رنگ ناشناس تمام بیٹے ہونگے۔ چونکہ اس کا امکان زیادہ ہے کہ ایک رنگ ناشناس عورت "منتقل کرنے والی" بمقابلہ ایک رنگ ناشناس کے ایک معمولی مرد سے شادی

(۹۹) کرگی اس لیے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بمقابلہ عورتوں کے مردوں میں کیوں رنگ نا شناسی زیادہ عام ہے۔ صنفی محدود وراثت کے یہ دونوں مختلف نمونے ہمیں اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ جانوروں کے چند گروہوں مثلاً پرندوں اور پتنگوں میں مادہ دگر جفتی صنف ہے۔ برخلاف ان کے مکھیوں اور پستانوں میں یہ حالت بالکل الٹ جاتی ہے۔ لیکن ان دونوں تخیلوں کو بیان کرنا اور ان کو ایک عام اصول کے تحت لانا ایسا مسئلہ ہے جو اب تک حل نہیں ہوا۔



وسوال باب

صنف

(۱۰۰) صنف رابطی وراثت کی دریافت کے وقت سے صنف کی نوعیت پر نئی طرح سے غور ہونے لگا اور اس سلسلہ میں ہارگن (Morgan) اور اس کے ساتھیوں نے امریکہ میں عمدہ تحقیقات کر کے اس تشبیح کو ایک درجہ اور بھی آگے بڑھا دیا جبکہ انہوں نے صنفی وراثت کی عجیب نوعیت کی مطابقت ایسے نمایاں اختلافات سے کی جو دونوں صنفوں کے بنائے والے خلیوں کے اجسام کی باریک ساخت میں پائے جاتے ہیں۔ اس ترقی کی نوعیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اصل مسئلہ سے ہٹنا پڑے گا۔


خردبینی خلیے جن سے جانوروں اور پودوں کے اجسام بنے ہوئے ہیں ایک ایسے نیم شفاف فالوہ نما مادہ پر مشتمل ہیں جس کو نخر یا یہ کہتے ہیں۔ اس کی حقیقی نوعیت مختلف خلیوں میں اختلاف رکھتی ہے۔ عضلی خلیے مختلف ہوتے ہیں جگر کے خلیوں سے اور یہ دماغی خلیوں سے اختلاف رکھتے ہیں۔ لیکن تمام جاندار خلیے ایک ایسی معین ساخت یا مرکزہ کی موجودگی کی وجہ سے مطابقت کرتے ہیں جو خلیہ کے اندر رہتا اور غالباً اس کے افعال اس کے تابع رہتے ہیں۔ مرکزہ جو عموماً ایک نہایت چھوٹا گول یا بیضوی جسم ہے

(۱۰۱) ایک معین ساخت رکھتا ہے۔ اس کے نہایت مخصوص مشتقات لون جسد ہیں یہ چھوٹے لائے اجسام ہیں اور ان کا یہ نام اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ مختلف رنگ ان کو خلیہ کے بقیہ نخرنایہ کے مقابلہ میں زیادہ گہرا رنگ دیتے ہیں۔ چند مارج میں یہ صحیح طور پر رنگنے سے نہایت نمایاں ہو جاتے ہیں اور تب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تعداد کے لحاظ سے وہ کسی ایک فرد کے جسمی خلیوں کے اندر معین ہوتے ہیں۔ وہ شکل اور جسامت میں بہت زیادہ متغیر ہیں۔ لیکن یہ اختلافات معین ہوتے ہیں اور ایک فرد کے ہر خلیہ کے مرکزہ کے اندر یکساں قسم کا مجموعہ لون جسدوں کو پایا جاتا ہے۔ علاوہ اس کے ان صنفی اختلافات کے جن کا ذکر اوپر کیا گیا۔ تعداد اور شکل کی یہ مشابہت کسی ایک نوع کے تمام افراد کے اندر موجود ہوتی ہے۔ عموماً نمایاں انواع لون جسدوں کا نمایاں اور معین اجتماع ظاہر کرتی ہیں۔ اس طرح سے کہ ایک ماہر اکثر بافت کے ایک نہایت چھوٹے ٹکڑے کے خرد بینی امتحان کے ذریعہ جانور کی اس نوع کو بتا سکتا ہے جس سے اس کو لیا گیا تھا۔ اس بحث کے مد نظر ایک دوسری نوعیت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ جسم کے خلیہ کے اندر لون جسدوں کی تعداد عموماً جفت ہوتی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ عموماً جوڑوں میں رہتے ہیں۔ کسی ایک جوڑے کا ہر فرد ظاہرہ طور پر تمیز نہیں کیا جاسکتا حالانکہ مختلف جوڑوں کے افراد جسامت اور شکل کے لحاظ سے بہت زیادہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ ایسی ایک صورت میں چھ مختلف قسم کے لون جسد تمیز کیے جاسکتے ہیں۔ لون جسدوں کی یہ ایک خصوصیت ہے کہ زواجوں کی تیاری میں ان کی تعداد ایک مخصوص اور پیچیدہ عمل کے ذریعہ جسمی خلیوں کے لونی جسدوں کی تعداد کے مقابلہ میں نصف ہو جاتی ہے مثلاً ہماری فرضی مثال میں جہاں جسمی خلیوں میں ۱۲ لون جسد موجود تھے تو زواجوں میں ان کی تعداد ۶ ہوگی۔ لیکن یہ ۶ لون جسد جو زواج میں موجود ہیں، خواہ وہ بیضہ ہو یا تخم جسمی خلیوں کے اندر پائے جانے والے چھ جوڑوں میں سے ہر ایک کا نمائندہ رکھیں گے۔ جب دونوں زواجے ملتے ہیں تو ۶ لون جسدوں میں سے ہر ایک پھر اپنے ساتھی کو پالیتا ہے اور چھ جوڑوں کی

(۱۰۱)

(۱۰۲)

حالت نئے فرد کے جسمی خلیوں میں پھر پوری ہو جاتی ہے۔
چند سال قبل امریکہ میں معلوم کیا گیا کہ چند کیڑوں میں نوں جسدوں کی
تعداد دونوں صنفوں کے اندر مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً پروٹینورس



شکل ۲۴
پروٹینورس میں نوں جسدوں کے عمل کو ظاہر کرنے کے لیے خاکہ۔ صنفی طے سادہ
دکھانے کے ہیں۔ بقیہ چھ جوڑے دراصل جسامت میں اختلاف رکھتے ہیں لیکن
یہ خاکہ میں نہیں دکھایا گیا ہے۔

کیڑے میں مادہ کے اندر یہ ۱۴ لیکن نر میں صرف ۱۳ ہوتے ہیں۔ نر میں
طاق تعداد کی وجہ یہ ہے کہ نوں جسدوں میں سے ایک بے جوڑے ہے۔
مادہ میں ۱۴ جوڑے اور نر میں ۱۳ جوڑے اور ایک طاق نوں جسد پایا
جاتا ہے۔ نر کا طاق نوں جسد مادہ کے ایک معین جوڑے سے مطابقت
رکھتا ہے۔ جب مادہ زواجے بناتی ہے تو نوں جسدوں کی تعداد نصف
ہو جاتی ہے اور ہر اندھ کے اندر ساتوں جوڑوں میں سے ہر ایک کا نصف
نمائندہ موجود ہوتا ہے اس طرح جلد ۱۴ نوں جسد پائے جاتے ہیں۔ لیکن
جب نر زواجے بناتا ہے تو طاق نوں جسد منقسم نہیں ہوتا۔ وہ مکمل حالت
میں کسی ایک منوی حوین کو چلا جاتا اور اس طرح دوسرا اس کے بغیر ہوتا ہے
اس طرح دو قسم کے منوی حوین مساوی تعداد میں ملتے ہیں یعنی وہ جن میں

(۱۰۳)

۷ اور وہ جن میں صرف ۶ لون جسد ہوتے ہیں۔ جب ۷ لون جسد رکھنے والا ایک منوی تخمین ایک اندازہ کو بارور کرتا ہے تو جوڑوں کا پورا مجموعہ پورا ہو جاتا ہے اور اس طرح جو فرد حامل ہوتا ہے وہ مادہ ہے۔ لیکن جب ایک اندازہ کی باروری ایک ایسے منوی تخمین سے ہوتی ہے جس میں صرف ۶ لون جسد ہوتے ہیں تو تیار ہونے والے فرد میں ۶ جوڑے اور ایک طاق ہوتا ہے اور حملہ منوی جسد ۱۳ ہوتے ہیں اور یہ نہ ہو گا۔ ایسی صورتوں میں فرد کی صنف نتیجتاً لون جسدوں کے اس خاص جوڑے کے دونوں اجزاء یا صرف ایک ہی کی موجودگی سے معلوم کی جاسکتی ہے۔ بہر حال ان اسباب کے تحت جواب بتائے جائینگے۔ یہ تصور کیا گیا ہے کہ ان کو لا لون جسد کہینگے۔ پروٹینٹس میں لا لون جسد کا کوئی جوڑا نہیں رہتا۔ لیکن چند دوسری انواع میں ان کا ایک جوڑا ہوتا ہے لیکن وہ جسامت اور شکل میں خود مختلف رہتا ہے۔ عموماً لا لون جسد کا جوڑا نرم میں خود لا لون جسد سے چھوٹا ہوتا اور فوراً اس سے تیز کیا جاسکتا ہے۔ جب یہ موجود ہوتا ہے تو اس کو ما لون جسد کہتے ہیں۔ ایسی صورتوں میں مادہ کی بناوٹ لا لا ہوتی اور اس کے تمام اندوں میں لا لون جسد رہتا ہے۔ بناوٹ میں نہ لا ما ہوتا اس کے پیدا ہونے والے نصف منوی تخمین اپنے اندر ایک لا لون جسد رکھتے اور بقیہ نصف کے اندر ما لون جسد ہوتا ہے۔ نصف بچے لا لا یعنی مادہ اور دوسرے نصف لا ما یا نہ ہوتے ہیں۔

ڈروسوفا میلا نوگیسٹر (*Drosophila melanogaster*)

میں جو کیلے کی کھجی کی ایک نوع ہے اور جس پر مارکن اور اس کے ساتھ لپٹنے تجرے کیے ہیں اس میں لون جسدوں کی تعداد ۸ ہوتی ہے۔ ان میں سے دو جوڑے یکساں اور بقابلہ دوسروں کے بڑے ہوتے ہیں (شکل ۱۵)۔ ایک جوڑا نہایت چھوٹا اور بقیہ جوڑا یعنی صنفی لون جسد جسامت میں درمیانی ہوتا ہے۔ مادہ میں یہ ۲ لا جسدوں کی شکل اختیار کرتے اور سلاخ نما سا وہ

اجسام ہیں۔ نہ میں ایک لا لون جسد مادہ کے ایک لون جسد سے مشابہ اور ایک ما لون جسد تقریباً اسی جامت کا ہوتا ہے جو لا لون جسد سے اس طرح مختلف ہے کہ وہ

ایک سرے پر ایک ایک کی شکل میں مڑا ہوا پایا جاتا ہے۔

اس لیے تمام انڈوں میں ایک

لا لون جسد رہتا ہے لیکن

منوی تخمینوں میں نصف میں ایک

لا لون جسد پایا جاتا اور نصف

میں ایک ما لون جسد رہتا ہے۔

جب ایک انڈے کی باروری ایک

ما منوی تخمین سے ہوتی ہے تو

وہ نہتا ہوتا ہے۔ اب لون جسدوں

لا لون جسد

شکل ۲۴

ڈروسو فائلا (Drosophila) میں دونوں

منغزوں کے لون جسد شکل میں ہوتا بالکل نیچے کا بڑا ہے

دکھایا گیا ہے۔ ڈروسو فائلا کے نائل ایک سلاح تھا لون جسد

اب ایک خمیدہ شکل لا لون جسد ہے۔

کی صنف محدود وراثت کے امور سے مطابقت کرنے کے لیے ہمیں یہ تصور

کرنا پڑیگا کہ صنف محدود سیرتوں کے عوامل کسی ایک لا لون جسد

رہتے لیکن ایک ما لون جسد یا لون جسدوں کے کسی بھی دوسرے

جوڑوں میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ یہاں تک سیرتوں کے اس

گروہ کا تعلق ہے لا لون جسد در حقیقت معطل ہی رہتا ہے۔

شکل ۲۴ ترسیمی طور پر ظاہر کرتی ہے کہ سفید آنکھ والے نر اور سرخ

آنکھ والی مادہ کے طاب کے پیچوں کو ان حالات کے لحاظ سے کس طرح

ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ مادہ کا ہر لا لون جسد سرخی کے عامل کا رکھنے والا


ہے۔ لیکن یہ عامل نر کے لا لون جسد میں نہیں پایا جاتا اور نہ ما لون جسد

کے ذریعہ منتقل ہو سکتا ہے۔ تمام بکھیاں دگر جنسی اور سرخ

آنکھ والی ہونگی۔ اس لیے کہ ہر ایک نے خواہ وہ نر ہو یا مادہ اپنی ماں

سے لا جسد میں سرخی کا عامل پایا ہے۔ ہم مادہ کے تیار کیے ہوئے

تمام انڈے ایک لا لون جند کے حامل ہیں لیکن ان لا لون جندوں




شکل ۲۶

سفید آنکھ والے نر ڈروسوفائیلہ (Drosophila) اور سرخ آنکھ والی مادہ کے
ملاپ کو ظاہر کرنے کے لیے خاکہ۔ یہ شکل ۲۶ میں دکھائی ہوئی حالت کا جواب ہے۔

میں سے نصف میں سُرخ کا عامل پایا جاتا اور نصف میں نہیں رہتا۔
 بام زر کے منوی جھینوں میں سے نصف کے اندر سُرخ والا عامل ایک لا
 لون جسک میں رہتا ہے۔ برخلاف ان کے دوسرے نصف میں ایک ما
 لون جسک ہی پایا جاتا ہے۔ جب ان دونوں سلسلوں کے ذوالجے ملاپ کرتے
 ہیں تو ان کا نتیجہ وہ ہوتا ہے جو شکل ۲۷ میں دکھایا گیا ہے اور یہ
 ہونا چاہیے کہ دونوں جماعتوں کی بام مادائیں ہونی چاہئیں۔ یعنی وہ
 جن میں ۲ سُرخ لا لون جسک ہوتے ہیں اور وہ جن میں ایک سُرخ اور
 ایک سفید لا لون جسک پایا جاتا ہے۔ دوسرے معنوں میں یہ کہہ سکتے
 ہیں کہ مساوی تعداد ہم جفتی اور دگر جفتی سُرخ آنکھ والی مادوں کی حاصل
 ہوتی ہے۔ چونکہ بام نروں کو اپنے باپ سے صرف ایک ما لون جسک
 ملا اس لیے ان کی نوعیت ان کی بام ماں کی بناوٹ کو فوراً ظاہر کرتی ہے
 یعنی ان میں سے نصف میں ایک سُرخ لا لون جسک اور دوسرے نصف
 میں ایک سفید لا لون جسک موجود ہے۔ بام نسل کے ز دگر جفتی سُرخ
 آنکھ والی اور سفید آنکھ والی کمپیوں کی مساوی تعداد پر مشتمل ہیں۔ نظری
 صورت حال اس امر سے مطابقت رکھتی ہے کہ بام نسل میں جو ایک
 سفید آنکھ والے ز اور ایک سُرخ آنکھ والی مادہ کے ملاپ سے حاصل
 ہوئی ہے سُرخ آنکھ والی اور سفید آنکھ والوں کا تناسب ۱:۳ ہے
 اور یہ کہ سفید آنکھ والے تمام ہوتے گئے۔ علاوہ ازیں جیسا کہ شکل ۲۸ سے
 ظاہر ہے یہ بھی جوابی ملاپ کے نتیجوں سے یکساں طور پر مطابقت کرتا ہے
 چونکہ نر کے خلیوں میں صرف ایک ہی لا لون جسک ہوتا ہے اور چونکہ لا لون جسک
 ہی صرف سُرخ کے عامل کا رکھنے والا ہے اس لیے سُرخ آنکھ والا نر سُرخ
 کے لیے دگر جفتی ہوگا چاہے وہ کسی طریقہ سے ہی پیدا ہوا ہو۔ اس طرح جب
 اس کا ملاپ ایک سفید آنکھ والی مادہ سے کرایا گیا تو اس کی تمام بیٹیاں سُرخ
 آنکھ والی ہونگی۔ اس لیے کہ ہر ایک فرد جو اپنے باپ سے لا لون جسک
 حاصل کر لیا لازمی طور پر مادہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح تمام بیٹے جو اس ملاپ سے

حاصل ہونگے سفید آنکھ والے ہونے چاہئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو



شکل ۲۱

سفید آنکھ والی مادہ ڈرو سوفا میلا (Drosophila) اور سرخ آنکھ والے
نر کے ملاپ کو ظاہر کرنے کے لیے خاکہ۔ یہ شکل ۲۱ میں دکھائی ہوئی حالت کا جو بیک

لاؤن جسڈ میں جو وہ ماں سے پاتے ہیں اور نہ ہی ما لؤن جسڈ میں جو انھیں باپ سے حاصل ہوتا ہے سُرخی کا عامل موجود نہیں ہوتا۔

ڈرو سو فائیلہ کے بیان سے اس نتیجہ کی پوری طرح تصدیق ہوتی ہے جو ہمیں پروٹینٹس کے خرو بینی مطالعہ سے حاصل ہوا ہے یعنی یہ کہ صنف کا انحصار فرد کی ایسی بناوٹ پر ہے جو چند مخصوص لؤن جسڈوں کے لحاظ سے ہو۔ یہ صنفی لؤن جسڈ غلبہ کے بقیہ لؤن جسڈوں سے اس طرح اختلاف رکھتے ہیں کہ ان کا "جوڑا" ایسے دو مختلف حصوں پر مشتمل ہو سکتا ہے جن کو ہم نے لا اور ما سے موسوم کیا ہے اور اس جوڑے کے لحاظ سے ایک صنف کی بناوٹ لا لا اور دوسری کی لا ما ہے۔ پچھلے باب میں ہم نے ایک صنفی عامل کا ذکر کیا تھا جس کے لیے ایک صنف ہم جفتی اور دوسری دیگر جفتی تھی۔ ایک طرح سے یہ درست ہے لیکن اس لحاظ سے جو ہم لؤن جسڈوں کے لیے معلوم کر چکے ہیں یہ بہم ہے۔ اس لیے بھی کہ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صنف کا انحصار لازمی طور پر ایک عامل پر اسی طرح سے نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک مرغی کی گلابیہ کلغی یا مٹر کی اونچائی۔ جیسا کہ بعد کے ایک باب میں ظاہر ہو گا وہ عوامل جو ان سیرتوں کے حامل ہیں ایسے معین اجزاء خیال کیے جاسکتے ہیں جو ایک لؤن جسڈ کے مخصوص حصوں میں رہتے ہیں۔ برخلاف ان کے صنف کا انحصار جفتی کی بناوٹ پر مکمل لؤن جسڈ کے لحاظ سے ہے جو ساتھ ہی ساتھ صنفی رابطہ ظاہر کرنے والی سیرتوں کے عوامل کے حامل ہو سکتے ہیں۔ معمولی حالات کے تحت ایک ایسا جفتہ جو یکساں صنفی لؤن جسڈ پر رکھے سے پاتا ہے ایک صنف کا ہوتا ہے لیکن ایک ایسا جفتہ جو مختلف صنفی لؤن جسڈ پر رکھے سے حاصل کرتا ہے مختلف صنف کا ہوتا ہے۔ بہتر طور پر ہمیں صنفوں کے لیے ہم زواجی اور دیگر زواجی کہنا چاہیے نہ کہ صرف ہم جفتی اور دیگر جفتی۔

(۱۰۹)

اس زمانے میں ڈرو سو فائیلہ کی دونوں صنفوں کے غلبوں میں لؤن جسڈ می امتیاز نمایاں اور بلاشبہ تسلیم شدہ ہیں اور ہمیں اب یہ دریافت کرنا چاہیے کہ کس حد تک ایسے امتیازات جداگانہ صنف رکھنے والے دوسرے جانداروں میں پائے جاتے ہیں۔ پرندوں اور پروانوں میں چا

صنعتی رابطہ کے امور ظاہر کرتے ہیں کہ دیگر زوجی صنف مادہ ہے ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ مادہ غیر یکساں اور فریکساں جوڑا صنعتی لون جسدوں کا ظاہر کریگا۔



شکل ۲۸۔

مرغ اور مرغی کے لون جسد

ان گروہوں میں سے کسی میں بھی صاف تیاری مطالعہ کے لیے حاصل نہیں کی جاسکتی لیکن مشواگو نے غالباً ان مشکلات پر پرند میں قابو پالیا ہے اور اس کے اشکال سے صاف طور پر ایک جوڑا بڑے صنعتی لون جسدوں (لا لا) کا نمونہ ظاہر ہوتا ہے جس سے مطابقت کرنے والا ایک غیر یکساں جوڑا (لا ما) مادہ میں ملتا ہے۔ پھر پروانوں کی متعدد انواع میں مادہ کے لیے یہ معلوم ہوا ہے کہ نر کے مقابلہ میں مادہ میں ایک لون جسد کی کمی ہوتی ہے جس کے لیے غالباً یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی ایسی چیز کی عدم موجودگی کو ظاہر کرتا ہے جو ما لون جسد کی بنائندگی کرتا ہے (دیکھو پروٹینڈ کی اشکال)۔ ایسے مشاہدات اس بات کی حمایت میں ہیں کہ مادہ دیگر زوجی صنف ہے جیسا کہ صنف رابطی وراثت کے امور سے اس گروہ میں ثابت ہوا ہے۔ بہر حال ڈنکاسٹر نے چند سال قبل پروانہ میں معلوم کیا کہ اس کی صنعتی لون جسدوں کی یکساں ترتیب

ظاہر کرتی ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ یہاں بھی مثل دوسرے چند کیڑوں کے مائلون جسد لا لون جسدوں سے نمایاں طور پر تمیز نہیں کیے جاسکتے خواہ کچھ بھی ہو۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں کہیں لون جسدی فرق پرندوں اور پروانوں میں پایا گیا یہ ہمیشہ مادہ تھمی جو غیر یکساں جوڑا لونی جسدوں کا ظاہر کرتی ہے۔ اور یہ امر اس تجرباتی مواد سے بالکل مطابقت کرتا ہے جو مادہ کو دگر زواجی صنف نمائت کرتا ہے۔

مچھلیوں اور پستانوں میں ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ نر ہوگا جس میں لون جسدوں کا غیر یکساں جوڑا ملیگا۔ مچھلیوں کی صرف ایک ہی نوع (لیبیسٹس *Lebistes*) میں جس کا اس نقطہ نظر سے امتحان اب تک کیا گیا ہے۔ ونگٹ نے معلوم کیا ہے کہ دونوں صنفوں میں لون جسدوں کی تعداد اور ترتیب یکساں تھی لیکن پستانوں میں کئی انواع کے لیے یقینی شہادت اس بات کی موجود ہے کہ نر میں ایک غیر یکساں جوڑا موجود ہوتا ہے۔ انسان کا بھی امتحان کچھ احتیاط کے ساتھ کیا گیا ہے اور بالکل حال کے مشابہات ظاہر کرتے ہیں کہ مادہ میں ۳۸ لون جسد ۲۴ نمایاں جوڑوں میں ترتیب دیے ہوئے رہتے ہیں لیکن نر میں یا تو ۴۴ لون جسد (ایک بے جوڑے) یا ۴۸ ایسے ہوتے ہیں جن میں سے ایک نمائت چھوٹا ہے۔ بایوں کہہ سکتے ہیں کہ نر میں لون جسدوں میں سے ایک بغیر جوڑے کے ہوتا یا پھر ایک غیر مساوی جوڑا ظاہر کرتا ہے۔ ہر صورت میں شہادت اس امر کی مطابقت میں ہے کہ تناسلی مواد اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ انسان میں نر دگر زواجی صنف ہے۔

گیارہواں باب

صنف اور بین صنف

(۱۱۲)

اب تک جو شہادت پیش کی گئی اس کی بناء پر ایک فرد کی صنف پوری طرح اس کی ایسی بناوٹ پر منحصر ہے جس کا تعلق لون جسدوں کے ایک ہی مخصوص جوڑے سے ہے۔ جہاں تک خلوی مشمولات کے لحاظ سے تمام دوسرے لون جسدوں یا موسومہ خود جسدوں کا تعلق ہے یہ یکساں ہوتے ہیں اور ہم کسی طریقہ پر بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کوئی اثر صنفی سیرتوں کے اظہار پر ڈالتے ہیں۔ دس و سو فائیلہ پر چند حالیہ مشاہدات جو برجس نے کیے۔ ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خود جسد بھی اس سلسلہ میں حصہ لیتے ہیں۔ خوش قسمتی سے برجس کو مکھیوں کی ایک ایسی نسل سے سابقہ پڑا جس میں معمولی لون جسدی تناسب میں کسی نہ کسی وجہ سے گڑبڑ ہو گئی تھی اور اس گروہ سے اس نے مناسب باروری کے ذریعے ایسی مکھیاں تیار کیں جن میں صنفی لون جسد اور خود جسد غیر معمولی تناسب میں موجود تھے۔ اپنے مشاہدات کی بناء پر وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ صنف کا انحصار کسی ایک فرد کے خلیوں میں لا لون جسدوں کی تعداد ہی پر مبنی نہیں ہے بلکہ اُن کا انحصار لا لون جسدوں اور خود جسدوں کی تعداد کے تناسب پر ہے۔ اگر ہم تین خود جسدوں کو مجموعی طور پر اُسے (دیکھو شکل ۲۵) اور صنفی لون جسد کو

(۱۱۳)

لا سے ظاہر کریں تب ایک معمولی مادہ ڈسوسو فائیڈ کا لون جسڈی ضابطہ
 $۱۲ + ۱۲$ اور نر کا لا $(+ ما) + ۱۲$ ہوگا۔ اپنے کام کے دوران
 میں برجس نے ایسی مکھیاں معلوم کیں جن کا ضابطہ $۱۳ + ۱۳$ اور دوسروں
 کا $۱۴ + ۱۴$ تھا۔ باوجود صنفی جسدوں کی تعداد کے اضافہ کے ایسی مکھیاں
 معمولی مادائیں معلوم ہوتی تھیں بمقابلہ ان کے دوسروں میں جن کا ضابطہ
 $۱۳ + ۱۳$ تھا تو مادوں کی سیرتیں خاص طور پر نمایاں تھیں اور مکھیاں
 ”فوق مادائیں“ ہو گئیں۔ برجس کے مطابق یہ اس وجہ سے ہوا کہ صنفی
 لون جسدوں اور خود جسدوں کے تناسب میں تبدیلی ہو گئی۔ $۱۳ + ۱۳$
 مکھیوں میں ایک تناسب صنفی لون جسڈی مادہ کا بمقابلہ خود جسد کے موجود
 تھا جبکہ ان کا مقابلہ $۱۲ + ۱۲$ یا $۱۳ + ۱۳$ مکھیوں سے کیا جائے۔
 بر خلاف ان کے جب صنفی لون جسڈی مادہ کا تناسب بمقابلہ خود جسدوں کے
 گھٹ جاتا ہے تو مکھی نمایاں میلان نرین کی جانب ظاہر کرتی ہے۔ لا: ۱
 کے تناسب کے لحاظ سے ایک $۱۲ + ۱۳$ بناوٹ کی مکھی ایک معمولی مادہ
 $(۱۲ + ۱۲)$ اور ایک معمولی نر $(۱۳ + (ما + ۱۲))$ کی درمیانی
 حالت کی ہوگی۔ ایسی مکھی اپنی صنفی سیرتوں کے لحاظ سے ایک معمولی مکھی
 اور ایک معمولی نر کی درمیانی صورت ہوگی۔ یہ ایک صنفی شکل نوعیت کی ہے
 جس کو اب مین صنف کی اصطلاح سے موسوم کرتے ہیں۔ لا کے تناسب
 کی مزید مکھی ضابطہ $۱۲ + ۱۲$ کی مکھیوں کی پیدائش کا باعث ہوتی ہے جو ظاہر
 شکل میں معمولی نر ہوتی ہیں۔ ضابطہ $۱۳ + ۱۳$ کی مکھیوں میں بمقابلہ ۱ کے
 لا کا تناسب اور بھی گھٹ جاتا ہے۔ ایسی مکھیاں برجس کے ”فوق نر“
 ہیں جو دراصل بانجھ کیڑے ہیں لیکن بہر صورت نہایت نمایاں طور پر مخصوص
 نر سیرتیں ظاہر کرتے ہیں۔ برجس کی تقلید کرتے ہوئے ہم اپنے مختلف
 مجموعوں کو ایک سلسلہ میں اگر اب اس طرح ترتیب دیں کہ وہ جن میں لا
 اور ۱ کا اعظم ترین تناسب ہے سب میں اوپر اور اقل ترین تناسب
 والے سب سے نیچے رہیں تو ایسا کرنے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ لون جسڈی

(۱۱۴)

سلسلہ ایک ایسے صنفی سلسلہ سے مطابقت رکھتا ہے جو ایک فوق مادہ سے شروع ہو کر ایک فوق نر پر ختم ہوگا۔

فوق مادہ	۱۲ + ۹
مادہ	۱۲ + ۶ (یا ۳ + ۳ یا ۴ + ۲)
بین صنف	۱۳ + ۶ (یا ۲ + ۱۱ یا ۳ + ۱۰)
نر	۱۲ + ۹ (یا ۱ + ۱۱ یا ۲ + ۱۰)
فوق نر	۱۳ + ۹

لہذا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ خود جسک اور ساتھ ہی ساتھ اصل صنفی جسک ایک متین حصہ صنفی سیرتوں کے اظہار میں لیتے ہیں ڈروسوفائیل میں یہ ظاہر ہو گا کہ لا لون جسک اثر انداز ہو کر نمو پالنے والے جفتہ کو مادہ پن کی طرف راغب کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ خود جسکوں کا اثر نیز خصوصیت کی جانب ہے۔ فی الوقت ہم اس سے زیادہ آگے نہیں جاسکتے لیکن یہ ناممکن نہیں ہے کہ آئندہ تحقیقات کے ذریعہ یہ تجزیہ زیادہ حد تک کیا جاسکے اور شاید اس کا بھی تصفیہ ہو سکے کہ صنف کے لیے دراصل ایسے مخصوص عوامل موجود ہیں جس لحاظ سے کہ اس قسم کے عوامل دوسری سیرتوں کے لیے پائے جاتے ہیں۔

صنف کا مفہوم جو اوپر بتایا گیا ایسا مفہوم ہے جو لون جسک میکانیت کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ یہ جفتہ کے بنانے والے زواجوں کے ذریعے ایک یا دوسری قسم کے لون جسک جموعے کے حصول پر مبنی ہے جس کی وجہ سے یہ نر یا مادہ میں نمو پاتا ہے۔ یہ عموماً طبعی نمو کے لیے درست ہے۔ لیکن غیر معمولی حالات میں ایسا نہیں ہوتا اور جفتہ زیادہ یا کم درجہ میں صنف کی ایسی سیرتیں پیدا کر لیتا ہے جو اس کے بالکل متضاد ہوتی ہیں جس کے لیے وہ اپنی لون جسک بناوٹ کے لحاظ سے اظہار کرتا ہے۔ ایک رہنما بیت عمدہ مثال مولیشیوں میں ملتی ہے۔ جب ایک گائے جڑواں بچے پیدا کرتی ہے تو وہ یا تو ایک ہی صنف کے

ہوتے ہیں یعنی دو نر یا دو مادائیں یا مختلف صنفوں کے ہو سکتے ہیں۔ بعد کی حالت میں پچھرا ہمیشہ طبعی ہوتا ہے۔ لیکن اس کا جڑواں خاندہی طبعی رہتا ہے۔ عموماً یہ ایک "آزاد صنف بچہ" جو ایک عجیب اور درمیانی حالت ہے جس کی نوعیت کی بابت جان ہنٹر کے زمانے یعنی ایک صدی سے اختلاف رائے پایا جاتا تھا اور حال ہی میں اس گتھی کو پروفیسر لئی نے شکاگو کے مسکنوں میں حل کیا۔ آزاد صنف بچہ زندگی ایک مادہ کی شکل میں شروع کرتا ہے جو غالباً بناوٹ میں دوسرے پستانوں کی طرح ۹۹ ہوتا لیکن اس کا جڑواں بھائی لامبا ہے جڑواں جنین رحم کے اندر جا کر اس کی دیواروں سے حسب معمول چپٹ جاتے ہیں۔ شروع میں ہر ایک جدا جدا چمٹا رہتا ہے۔ لیکن جوں جوں یہ نمو پاتے ہیں یہ اکثر ہوتا ہے کہ ایک دموی ربط دونوں جڑواں بچوں کے مشیمی دموی ادعیہ کے مابین قائم ہو جاتا ہے اس طرح سے کہ ایک کا خون کم و بیش آزادی کے ساتھ دوسرے کے اندر گردش کرتا ہے۔ اب نر بچہ کا اُنشیہ ابتدائی میں ایک حل پذیر مادہ پیدا کرتا ہے جس کو ہارمون کہتے ہیں جو خصوصیات نرہ کو تیز کر دیتی ہے۔ خونی ربط کے ذریعہ نر ہارمون مادہ جڑواں بچہ کے جسم تک پہنچ جاتی ہے جہاں وہ خصوصیات کی پیدائش میں تحریک کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مادہ خصوصیات کو روکتی ہے۔ کس حد تک نرین کی جانب مادہ جڑواں بچہ کی تبدیلی ہوئی ہے اس وقت پر منحصر ہے۔ جبکہ دموی ربط قائم ہوتا ہے اور غالباً انحصار اس کی جسامت پر بھی ہے۔ جتنی جلدی یہ ربط پیدا ہوگا اتنا ہی امکان مادہ جڑواں میں تبدیل ہونے کا ہے (۱۱۶) یہ کہ آزاد صنف بچہ ہمیشہ ایک تبدیل شدہ مادہ ہوگی وہ غالباً ایک ہی ہارمون کی تکمیل کیوجہ سے ہے جو پہلے اُنشیہ میں متقابلہ بیضدان کے ہوتی ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ خفتر بیضدان بھی ایک ہارمون تیار کرتا ہے جو مادہ خصوصیات کی

لے بالکل ہی جدا گانہ ہوتا اس کے لیے اس امر میں متا ہے کہ ایک مادہ جو ہے یا گنی پاک سے بیضدان نکال کر جب اُنشیہ یافت لگا دی گئی تو اُن میں نر سیر میں پیدا ہو گئی۔

پیدائش میں محرک ہوتی ہے۔ ایک آختہ نر میں بیضدانہ بافت کو پیوست کرنے سے ایسے جانور میں "مائیت" پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بات کہ ہمیں کبھی موشیوں میں ایسے جڑواں نہیں ملتے جن میں ایک آزاد صنف اور ایک لبعی مادہ ہو درحقیقت اس وجہ سے ہے کہ اُنٹہ بمقابلہ بیضدان کے بلحاظ نمو جسد فعل انجام دینے لگتا ہے اور اس لیے بیضدان غلبہ حاصل کر لیتا۔ ہمیں اس جگہ یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ قدرت کے اس خوبصورت تجربہ کے نتائج انسان کے مصنوعی آختہ اور پیوست کرنے کے نسبتاً بحدے طریقوں کے نتیجوں سے عام طور پر مطابقت کرتے ہیں۔ بہر حال ہمیں تقریوں میں ہر صنف کو ایسا سمجھنا چاہیے کہ مشکل تصور کرنا چاہیے جو ایک ابتدائی جنینی درجہ پر معین ہارمون کی تکمیل کیوجہ سے ایک یا دوسری سمت فوراً رخ کر لیتا ہے۔ معمولی حالات کے تحت ایسے ہارمون کی پیدائش توں جسدی میکائیت کا ایک فعل ہے۔ ۹۹ جنینوں میں ہارمون کا میلان دو صنفوں میں سے ایک خاص صنف کی پیدائش کی جانب زیادہ ہو جاتا ہے۔ لاکھ جنینوں میں دوسری قسم کے ہارمون غالب آ جاتے ہیں اور دوسری صنف پیدا ہوتی ہے۔ جب معمولی حالات گرا ہو جاتے ہیں تو توں جسدی میکائیت مغلوب ہو جاسکتی ہے اور تب ایک فرد جزاً یا بالکل ہی مکمل طور پر ایسے مخالف صنف کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس کے لیے اس کی توں جسدی بناوٹ مخصوص تھی۔

(۱۱۷)



شکل ۲۹

لائمنٹریا ڈسپار (Lymantria dispar) نر اور مادہ

صنف کی نوعیت کے اس نقطہ خیال کی مزید توثیق گولڈ شمیٹ کے جیسی

پروانہ (لائمنٹریا ڈسپار) (*Lymantria dispar*) پر قابل قدر

تحقیقات کے نتائج سے ہوتی ہے۔ یہ پرانی دنیا کا ایک عام کیڑا ہے جو برطانیہ

سے جاپان تک پایا جاتا ہے۔ صنفیں شکل میں نہایت مختلف ہوتی ہیں۔ ایک

نسبتاً چھوٹا اور زیادہ سیاہ کیڑا ہوتا ہے (شکل ۲۹) جس کے محاس نہایت گھنے

رہتے ہیں (دیکھو شکل ۳۰) اور ب) اپنے کشادہ پھیلاؤ کے حصول خصوصاً

جاپان میں اس کی ایسی نمایاں نسلیں پائی جاتی ہیں جو معمولی یورپی کیڑے سے

(۱۱۸)



شکل ۳۰

نر کے محاس (۱) اور مادہ کے (ب) لائمنٹریا (*Lymantria*)

اھدو درجے بین صنفوں کے (ج اور د)

جسامت اور رنگ کے لحاظ سے اکثر بہت زیادہ مختلف ہوتی ہیں۔ حالانکہ

یہ ہمیشہ امتیازی صنفی و تشکیلیت ظاہر کرتا ہے اور ان نسلوں کے مابین

باروری کے ذریعے ہی گولڈ شمیٹ نے اپنے نتائج حاصل کیے۔ مثلاً

جب جاپانی نسلوں میں ایک (جس کو اس وقت ہم آسانی کے لیے جیپونیکا

(Japonica) کہیں گے) کی باروری لمبی یورپی ڈسپار (*Dispar*)

سے کرائی گئی تو یہ معلوم ہوا کہ ♀ جیپونیکا × ♂ ڈسپار کے ملاپ سے
طبعی نر اور مادائیں حاصل ہوتے ہیں لیکن جب ملاپ ڈسپار ♀ × جیپونیکا ♂
کا ہوتا ہے تو بے نر پہلے کی طرح طبعی ہوتے ہیں مگر بے مادائیں تمام ایک نمایاں میلان
نرین کی جانب ظاہر کرتی ہیں۔ پروں کا رنگ نر کے پروں سے مشابہ ہوتا ہے۔
(شکل ۳۱) شکم طبعی مادہ کے مقابلہ میں زیادہ نازک ہوتا اور محاس زیادہ گھنے رہتے
ہیں (دیکھو شکل ۳۲)۔ مختصراً یہ ہے کہ اس ملاپ کی حاصل شدہ مادائیں بین صنعتوں
کی نوعیت کی ہیں۔ بین صنعت کے اوسط درجہ کا انحصار ان نسلوں پر ہے جن کا



شکل ۳۱

لائمنٹریا Lymantria کے نر اور مادہ بین صنعت۔

ملاپ کرایا جائے۔ چند صورتوں میں تبدیلی بہت دور تک نہیں پہنچتی اور بین صنعت
ایک طبعی مادہ کی طرح فعل انجام دیتی ہے دوسری صورتوں میں تبدیلی اتنی
نمایاں ہوتی ہے کہ مادہ ایک نر میں تبدیل ہو جاتی ہے اور بجائے بیضوں کے
کارآمد منوی حوین پیدا کرتی ہے۔ ان دونوں انتہائی حالتوں کے درمیان
مختلف درجے پائے جاتے ہیں جن کا انحصار ان نسلوں پر ہوتا ہے جو ملاپ
میں استعمال کی جاتی ہیں۔ گوڈر شمرٹ نے اپنے تجربات کے نتائج کی بناء پر
مختلف نسلوں کو ”طاقت“ کے ایک پیمانہ پر ترتیب دیا ہے۔ ایک



(۱۱۹)

خاص نسل کے نر کا جتنا زیادہ میلان بین صنفی بچے پیدا کرنے کا ہوگا جبکہ اس کا ملاپ دوسری نسلوں کی ماداؤں سے کرایا جائے تو نر سے تعلق رکھنے والی نسل کو "زیادہ طاقتور" کہیں گے۔ اس طرح مثال جو ہم نے لی ہے اس میں جلیپو نیکا مقابلہ طبی یورپی ڈسپاسا کے زیادہ طاقتور نسل ہے اور زیادہ بہتر طور پر اس کو اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ اگر نسل سے پیمانے کے طاقتور سرے سے نر پسند کریں اور ان کا ملاپ تدریجی طور پر اس پیمانے کی مختلف نسلوں کی ماداؤں سے کرائیں تو ہم دیکھیں گے مادہ بچوں کی بین صنفی نوعیت تدریجی طور پر زیادہ نمایاں ہو جائے گی حتیٰ کہ وہ جو پیمانے کے بالکل نیچے "کمزور ترین" نسل کی ماداؤں سے حاصل ہوں گی وہ پوری طرح نروں کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گی۔

اب ہمیں اس عجیب منظر کے سمجھنے کے لیے توجہ دینی چاہیے۔ لاٹمنٹریا (Lymantria) ایک پروانہ ہے جو ایسے گروہ سے تعلق رکھتا ہے جس میں نر کے لیے لون جلدی بناوٹ لا لا اور مادہ کیلئے لا ما ہے۔ لا لون جلدوں سے ہارمون آتے ہیں وہ خواہ کچھ بھی ہوں یہ نمویانے والے جنین کو ایک محرک فراہم کرتے ہیں جو اس کے صنفی پیچیدہ حالت کو نر جانب منعطف کر دیتا ہے۔ وہ جو پیچیدگی کی مادہ جانب کو نمودینے میں محرک ہوتے ہیں ان کے لیے یہ فرض کیا گیا ہے کہ وہ خود بیضہ کے خلیہ مایہ (=خلیہ نخر مایہ) میں پیدا ہوتے ہیں۔ لا لا افراد میں طبعی حالت کے تحت نر سیلانی ہارمون کافی مقدار میں (یا کافی تیزی کے ساتھ نمویانے ہیں) خلیہ مایہ


(۱۲۰)

۱۔ گولڈ شمٹ (Goldschmidt) خیال کرتا ہے کہ ان کی تکمیل ما لون جلد کے ذریعہ کسی درجہ پر بیضہ کے پختہ ہونے کے قبل ہوتی ہے۔ بہر حال یہ شکل ایسی صورتوں میں ہو سکتا ہے جہاں کوئی ما لون جلد نہیں رہتا جیسا کہ سائلر (Seiler) کے ان مشاہدات سے ظاہر ہوا جو اس نے پروانوں کی چند انواع پر کیے۔ یہ امر کہ لاٹمنٹریا (Lymantria) میں دراصل ایک ما لون جلد ہوتا ہے یا ما موجود ہی نہیں ہوتا۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو ہم فی الوقت نہیں جانتے۔

میں مادہ رجحانات پر قابو پانے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ بہر حال لا ما افراد میں خلیہ مایہ غالب آتا ہے اور ایک مادہ پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح کسی ایک خاص نسل میں طبعی حالات کے تحت جفتوں کی پیدائش لون جسدی میکائیت کے زیر اثر رہتی ہے۔ یہ تقریباً مساوی تناسب میں نمودار ہوتی ہیں۔ بہر حال مختلف نسلیں ہارمون کی تیزی میں فرق ظاہر کرتی ہیں جو دونوں یعنی لا نر میلانی اور خلیہ مایہ میں مادہ میلانی اقسام کا ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ طاقتور نسل ہوگی اتنی ہی قوت کے ساتھ یا زیادہ پہلے وہ اپنا کام انجام دینے لگیں گے۔ اگر دوسری چیزیں مساوی ہوں تو ایک طاقتور نسل کا لا لون جسد متقابلہ ایک کمزور نسل کے لا لون جسد کے ایک زیادہ قوت نر ہارمون پیدا کرے گا اور یہی صورت ایسے مادہ ہارمون کے لیے بھی ہوگی جو طاقتور بیضہ کے خلیہ مایہ کے اندر موجود ہوں گے۔ ایک طاقتور نسل کا ایک کمزور نسل سے ملاپ کرانے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مخالف ہارمون کا باہمی طبعی توازن بدل جاتا ہے اس لیے کہ وہ مختلف نسلوں کے کمزور اور طاقتور ہارمون کے درمیان مختلف غیر معمولی مشتقات کا باعث ہوتا ہے۔ اس طرح سے کہ جب ڈسپاسر  کا بلاپ جیپونیکا  سے کرایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ منوی حوین ایک طاقتور لا عنصر ایسے انڈوں میں داخل کر دیتا ہے جن تمام کا خلیہ مایہ کمزور ہوتا ہے۔ حاصل ہونیوالے نصف جفتوں میں ایک کمزور لا ماں سے اور ایک طاقتور لا باپ سے آتا ہے (دیکھو شکل ۳۲)۔ چونکہ ڈسپاسر نسل کے دو کمزور لا خود اپنے کمزور خلیہ مایہ پر غالب آتے اور طبعی نر پیدا کرتے ہیں تو ہمیں قدرتی طور پر توقع رکھنی چاہیے کہ طاقتور کا کمزور لا سے ملاپ اس پر قابو حاصل کر لے گا۔ نتیجہ حاصل ہونیوالے نصف جفتوں میں صرف ایک ہی لا لون جسد رہتا ہے یعنی ایک ایسا طاقتور لون جسد جو جیپونیکا منوی حوین سے حاصل ہوا ہے۔ جیسا کہ خالص ڈسپاسر میں دکھایا گیا ہے (دیکھو شکل ۳۲) کمزور مادہ خلیہ مایہ ایک کمزور لا لون جسد کے نر تعینی میلان پر قابو پاسکتا اور طبعی مادوں کی پیدائش کا

(۱۳۲)

(۱۲۱)



شکل (۳۲)

لاٹمنٹریاڈ سپار (*Lymantria Dispar*) اور لاٹمنٹریا جیپو نیکا (*L. Japonica*) کے جواہی ٹاپوں کو ظاہر کرنے کے لیے خاکہ۔ طاقتور خلیہ مایہ نقطہ دار اور کمزور سادہ دکھایا گیا ہے۔

ان کے علاوہ طاقتور جیپو نیکا سے حاصل شدہ ٹون جند گہرے اور کمزور ڈ سپار کے ٹون جند باریک خط میں دکھائے گئے ہیں۔

باعث ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک طاقتور لا لون جسد کے نہ تعلق میلان پر پوری طرح غالب نہیں ہو سکتا جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طبعی مادوں کی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ بین صنف پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر باپ ایک نہایت طاقتور نسل سے تعلق رکھتا ہے اور ماں کا تعلق ایک نہایت کمزور نسل سے ہے تو نتیجہ کے طور پر ایک ایسی جھول حاصل ہوگی جو صرف نروں پر مشتمل رہے گی۔ لیکن ان میں سے نصف بناوٹ کے لحاظ سے ایسی مادائیں ہیں جن کی لا لون جسدی میکانیت بیرونی لا کی قوت یا تیزی کی وجہ سے مخلوب ہو گئی ہے۔

جوانی ملاپ یعنی جیپونیکا ♀ اور ڈسپارم کی باہمی باروری سے (شکل ۳۲) نصف جفتوں میں ایک ہی کمزور لا طاقتور مادہ خلیہ مایہ کے اندر رہتا ہے۔ یہ طبعی مادائیں ہیں۔ دوسرے نصف میں ایک طاقتور اور ایک کمزور لا طاقتور مادہ خلیہ مایہ میں رہتا ہے اور یہ فرض کرنا لازمی ہے کہ دو لا حالانکہ ان میں سے ایک کمزور ہی کیوں نہ ہو طاقتور خلیہ مایہ کے مادہ پن پر غلبہ پانے کے لیے کافی ہیں اور طبعی نروں کی پیدائش کا باعث ہوں گے۔ اس لیے اس ملاپ سے جب میں صرف طبعی نر اور مادائیں ہی حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن جب نسل حاصل کرنے میں علاوہ دونوں صنفوں کے طبعی افراد کے بین صنفی افراد بھی نمودار ہوتے ہیں۔ ایسے بین صنفی افراد جو ماؤں سے طاقتور خلیہ مایہ حاصل کر چکے ہیں بطور ایک گروہ کے ایک نمایاں جماعت کا اظہار کرتے ہیں متقابلہ آن بین صنفوں کے جو کمزور خلیہ مایہ کی ماؤں سے حاصل ہوئے ہیں۔ یہ ظاہرہ شکل میں زیادہ تر نمایاں اور پروں پر صنفوں کے رنگوں کا آمیزہ بے قاعدہ پچی کاری کی صورت میں ظاہر کرتے ہیں (شکل ۳۱)۔ ان کو بناوٹ کے لحاظ سے ایسے تر خیالی سمجھا جاتا ہے جن کے اندر طاقتور مادہ خلیہ مایہ میں دو کمزور لا لون جسد پائے جاتے ہیں اور ان کو ان مادہ بین صنفی افراد سے تمیز کرنے کے لیے جن کا ذکر کیا جا چکا ہے تر بین صنفی افراد کہیں گے۔ طاقتور خلیہ مایہ کمزور تر لا لون جسدی میکانیت پر غلبہ پانیکا میلان رکھتا ہے جو دراصل اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جب نسلی ملاپ اس

قسم کا ہو کہ دو نہایت کمزور لاؤن جسد ایک نہایت طاقتور خلیہ مایہ کے اندر آجائیں تو بین صنفی تری پوری طرح پاد اوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔

نہایت قدیم زمانے سے خفشی شکل باعث دلچسپی رہا ہے اور ان کا وجود طبی اور دوسرے لٹریچر میں بکثرت موجود ہے۔ ان میں سے زیادہ تر بلاشبہ بین صنفوں کی صورتیں ہیں اور حالانکہ ظاہرہ سبب مختلف صورتوں میں نہایت مختلف ہو سکتا ہے پھر بھی صحیح تجزیہ غالباً یہ ظاہر کرے گا کہ دراصل یہ ایک ایسے صنفی ہارمون کے ادخال کے غیر طبعی اثر کے تحت ہوا جس کی وجہ سے لاؤن جسد میکانیت کا طبعی عمل درہم برہم ہو گیا۔

حالیہ علم کی روشنی میں یہ ظاہر ہو گا کہ جس قدر جلد غیر معمولی اثر اپنا فعل انجام دینے لگے گا اتنا ہی بہتر موقع صنف کے منقلب ہونے کا ہے۔ غالباً جب حیاتی کیمیا داں ان ہارمون کی مخصوص اہمیت کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرے گا تو صنف پر قابو حاصل کرنے کا مسئلہ عملی شکل اختیار کر سکے گا۔

ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حالانکہ بنیادی لاؤن جسدی میکانیت کا فعل ایک فرد میں درہم برہم ہو سکتا ہے پھر بھی وہ اس فرد کے زواجوں میں اپنی طبعی حالت پر قائم رہ سکتے ہیں۔ مثلاً فرض کرو کہ لاؤن نمونہ کی ایک مادہ (یعنی ایک نوع میں جہاں ♀ = لاؤن اور ♂ = لاؤن) ایک کارآمد نمونہ میں تبدیل ہو جائے تو تمام منوی حیویوں میں جو "وہ" پیدا کرے گی لاؤن موجود ہو گا۔ جب ان کو ایک ایسی طبعی مادہ کو بارور کرنے کے لیے استعمال کیا جائے جس کے تمام اندوں میں لاؤن موجود ہو تو تمام تیار ہونے والے جفتے بناوٹ میں لاؤن ہوں گے اور کسی گٹر بڑ کرنے والے سبب کی عدم موجودگی میں طبعی مادوں کی شکل میں نمونہ پائیں گے۔ اگر ضروری صنفی انقلاب عمل میں لایا جاسکے تو راستہ ایسے انڈے دینے والے خاندانوں کے لیے کھلا رہے گا جو صرف ایک ہی صنف پر مشتمل ہوتے ہیں۔ شہادت کے طور پر یہ بتانے کے لیے کہ یہ محض خیال ہی نہیں ہے معمولی مینڈک کی مثال دی جاتی ہے۔ اس نوع میں

بین صنف کا وجود غیر معمولی نہیں ہے اور ایک لائن سلسلہ کے امتحان کے بعد کریو اس نتیجہ پر پہنچا کہ وہ ایسی مادائیں ہیں جو جزو انوروں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ خوش قسمتی سے اسے ان بین صنفی جانوروں میں سے ایک نر کارآمد مل گیا جسے اس نے ایک طبعی مادہ کے انڈوں کی باروری کے لیے استعمال کیا۔ اس نے ... سے زائد غوکچے حاصل کیے جو تمام مادہ تھے۔ ایک دوسرے مینڈک سے دلتی نے اور بھی عجیب نتیجہ حاصل کیا اس لیے کہ وہ ایک نسل ایسی بین صنف کی خود باروری کے ذریعہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا جو کارآمد بیضے اور منوی خویں پیدا کر رہی تھی۔ جیسی کہ توقع تھی بچے تمام مادہ تھے۔ پہلی نظر میں اس مثال سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی مدد سے ہم صنف کی مجموعی عام اسکیم میں ایسے ادنی جانوروں کے گروہ بھی شامل کر سکتے ہیں جن میں کارآمد خنثی اشکیت عام ہے۔ لیکن جب کہ بین صنفی فرد ایسے زواجے پیدا کرتا ہے ایک کا دوسری صنف سے مطابقت کرتے ہیں اصل خنثی اشکال ایسا عمل کرتا ہے جیسے کہ وہ "خنثی اشکال" زواجے تیار کر رہا ہے۔

(۱۲۵)

ایسی ہی وقت کا سامنا پودوں کے بارے میں ہے جہاں صنفی منظر سے متعلق ہمارا علم بمقابلہ جانوروں کے اور بھی پیچھے ہے۔ خنثی اشکال پودے جو ایسے بہت زیادہ ہیں طبعی طور پر خنثی اشکال قسم کے ہی پودے پیدا کرتے ہیں۔ پچھلے چند سال میں ایسے مشاہدات کیے گئے ہیں جن سے پودوں اور جانوروں کے صنفی حالات میں قریبی مماثلت پائی جاتی ہے۔ متعدد جدا صنفی پودے پائے جاتے ہیں جن میں صنفیں جدا گانہ ہیں اور خسرو بینی تحقیقات سے ظاہر ہوا کہ بہر حال ان میں سے چند کے اندر تنشلی لون جنیدی میکانیت پائی جاتی ہے۔ مثلاً معمولی لکسنی (Lychnis) کے نر میں ایک غیر یکساں لا ما جوڑا لون جس کا مادہ کے اصل لا لا جوڑے کے مثل

(دیکھو شکل ۳۳) پایا جاتا ہے۔ دوسری صورتوں کے لحاظ سے بھی یہ نوع جانوروں

کے حامل سیرتیں ظاہر کرتی ہے خشتی شکل

افراد کبھی کبھی ملتے ہیں اور جب ان سے

نسل حاصل کی جاتی ہے تو یہ بین صنفی

نروں کی طرح عمل کرتے ہیں نہ کہ اصل

خشتی شکل کی طرح لکفس میں صنف رابطی

وراثت کی مثال بھی ملتی ہے۔ متعلقہ سیرتوں

کا جوڑا ایک عجیب پتلی قسم کی پتی ہے جو

بمقابلہ طبعی شکل کے مغلوب ہوتی ہے۔ طبعی

شکل $\times \phi$ کی باروری سے ب

ہیں طبعی پودے حاصل ہوتے ہیں جن سے

جب میں پتلی پتی والے پھر نمودار ہوتے

ہیں لیکن یہ صرف ٹر پودے ہی ہیں۔

پودوں میں صنف کے مطالعہ میں کئی فنی مشکلات ہیں جو اس

گروہ کے لیے مخصوص ہوتی ہیں لیکن اب چونکہ نباتیات داں اس جانب


زیادہ توجہ کر رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ مستقبل قریب میں زیادہ نمایاں

ترقی اس شعبہ میں ہوگی۔ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس لیے کہ

مثلاً اصل پیدا کرنے والے خشتی شکل کی نوعیت کو تناسلی لحاظ سے جداگانہ

صنف رکھنے والے پودوں سے مقابلہ کرنے کے بعد اس مسئلہ کو حل کرنے

کے زیادہ امکانات ہیں۔



شکل ۳۳

لکفس (Lychnis) میں زیرہ ماں

خلیہ کے تقسیم ہوتے ہوئے لون جدر میں

زیادہ بڑے لا عنصر کو چھوٹے ما عنصر سے

جدا ہوتا ہوا ظاہر کیا گیا ہے۔

(۱۲۶)

بارہواں باب

(۱۲۷)

رابطہ

پچھلے تین ابواب کے بعد جن میں کچھ دوسری باتیں بیان کی گئی تھیں اب ہم سیرتوں کی وراثت کی جانب لوٹتے ہیں جو صنف سے راست تعلق نہیں رکھتیں۔ حالانکہ مختلف عوائل باہم عمل کر کے اپنے تفاعل کے ذریعہ جفتہ کے اندر مخصوص نتائج پیدا کرتے ہیں پھر بھی تمام صورتوں میں جن پر ہم نے اب تک غور کیا ہے مختلف عوائل میں سے ہر ایک کی وراثت بالکل ہی جداگانہ ہے۔ عوائل کا تفاعل جفتہ کی سیرتوں پر اثر انداز ہوتا ہے مگر جداگانہ عوائل کے انتشار میں کوئی فرق پیدا نہیں کرتا جو ہمیشہ پوری طرح معمولی مینڈلی اسکیم کی مطابقت سے رہتا ہے۔ اس لحاظ سے ہر عامل اس طرح عمل کرتا ہے کہ گویا دوسرے موجود ہی نہیں تھے۔

بہر حال اب کئی مثالوں پر کام ہو چکا ہے جن میں زواجوں تک مختلف عوائل کے انتشار میں تبدیلی جفتہ کے اندر ان کی متواتر موجودگی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک دلچسپ مثال میٹھے مٹر میں ملتی ہے جس میں یہ منظر اس میں ظاہر ہوا تھا۔ یہ پہلے ہی باب ۸ میں بتایا گیا ہے کہ رنگ کے لحاظ سے میٹھے مٹر کو دو جماعتوں یعنی ارغوانی اور سرخ میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ (۱۲۸) ارغوانی بمقابلہ سرخ کے ایک سادہ غالب کی طرح عمل کرتا ہے۔ کسی

ایک خاص ارغوانی اور مثل سرخ کا درمیانی فرق یہ ہے کہ ارغوانی میں ایک نیلا عال (ن) موجود ہوتا ہے جو سرخ (ن) میں نہیں رہتا۔ میٹھے مٹر پودوں میں ایک غیر معمولی سیرت اس لحاظ سے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ زیرے کے دو نمایاں نمونوں میں سے ایک یا دوسری قسم کا پیدا کرتے ہیں زیادہ تر ایسے زیرے پیدا کرتے ہیں جو خشک ہونے پر شکل میں مستطیل ہوتے ہیں اور ان کو عموماً "لابنے" زیرے کہتے ہیں۔ ابتدائی حالت میں اور جب ان کو کچھ نم کیا جاتا ہے تو یہ بیضوی ہوتے اور ۳ مساوات ظاہر کرتے ہیں۔ پھر چاند میٹھے مٹروں میں نوخیز زیرہ بجائے بیضوی کے گول ہوتا اور صرف ۲ مساوات رکھتا ہے۔ لابنے زیرہ (ل) کی سیرت گول (ل) پر غالب ہوتی ہے اگر ایک لابنے زیرہ والے ارغوانی (جیسا کہ تختی ۴، ۴ میں دکھایا گیا ہے) کی باروری ایک گول زیرے والے سرخ (تختی ۴، ۷) سے کرائی جائے تو تمام حاصل لابنے زیرے والے ارغوانی ہوں گے۔ اس کا بھی کوئی اثر نہیں پڑتا کہ ان میں سے کس کو زیرہ پر کھے (نر) کی حیثیت سے استعمال کیا گیا۔ ایسے جب پودوں کی جب خود باروری کرائی جائے تو ایک ایسی جب نسل حاصل ہوتی ہے جو متوقعہ ۴ نمونوں پر مشتمل ہے یعنی ارغوانی لابنے، ارغوانی گول، سرخ لابنے اور سرخ گول۔

اب تک تو حالات معمولی نیڈائی اصولوں کے مطابق ہیں۔ علاوہ اس کے اگر ہم دونوں متعلقہ حوال میں سے ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ غور کریں تو نتائج توقع کے مطابق ہیں۔ ارغوانی اور سرخ کا تناسب ۳:۱ ہے اور یہی صورت لابنے زیرے والوں کی گول زیرے والوں کے ساتھ ہوگی۔ نمایاں فرق صرف اسی وقت ظاہر ہوتا ہے کہ جب کہ ہم ان کے ان تناسب کو دیکھیں جن میں یہ چاروں جماعتیں جب میں ظاہر ہوتی ہیں۔ بجائے اس کے کہ یہ چاروں جماعتیں حسب معمول ۹:۳:۳ کے تناسب میں نمودار ہوں یہ معلوم ہوا کہ دو جماعتیں یعنی ارغوانی لابنے اور سرخ گول توقع سے بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس قسم کے ملاپ سے (۱۲۹) اب تک ... پودے اگلے گئے ہیں اور چاروں جماعتوں کی حقیقی

(۱۳۰)

۴۹ ن ن ل ل + ۷ ن ن ل ل + ۷ ن ن ل ل + ۹ ن ن ل ل
 + ۷ ن ن ل ل + ۷ ن ن ل ل + ۱ ن ن ل ل
 + ۱ ن ن ل ل
 + ۹ ن ن ل ل

۱۷۷ ارغوانی لانبے

+ ۱ ن ن ل ل + ۷ ن ن ل ل + ۱ ن ن ل ل + ۷ ن ن ل ل + ۹ ن ن ل ل
 + ۷ ن ن ل ل + ۷ ن ن ل ل

۱۵ ارغوانی گول ۱۵ سرخ لانبے ۴۹ سرخ گول

جب نسل کو ایسی چار جماعتوں پر مشتمل ہونا چاہیے جن میں ارغوانی لانبے ،
 ارغوانی گول ، سرخ لانبے اور سرخ گول ۱۷۷ : ۱۵ : ۱۵ : ۴۹ کے تناسب
 میں ہوں۔ اس طریقہ پر حاصل کیے ہوئے پودوں کی جملہ تعداد ۶۹۵۲
 تھی۔ اس مفروضہ کے مطابق جو اوپر دکھایا گیا ہے ہمیں توقع کرنی چاہیے
 کہ وہ ۴۸۱۴ ارغوانی لانبے ، ۴۸۱۴ ارغوانی گول ، ۴۸۱۴ سرخ لانبے اور
 ۶۹۵۲ سرخ گول زردانوں پر مشتمل ہوگی۔ صفحہ ۱۳۲ کی اسکیم پر نظر ڈالنے
 سے ظاہر ہوگا کہ یہ توقع کس درجہ قریبی طور پر نتائج سے مطابقت
 کرتی ہے۔ سرخ گول پودوں کی جب کے زیروں سے باروری کر کے
 تائیدی شہادت بھی فراہم کی گئی تھی۔ دہرے مغلوبوں سے باروری
 کرانے کے اس طریقہ سے ایسے زواجی سلسلے کی نوعیت کی راست طور
 پر جانچ ہوئی جو ۷ : ۱ : ۱ : ۷ کے تناسب میں پیدا ہوئے اور حقیقی
 تعداد جو حاصل ہوئی وہ ۵۰ ارغوانی لانبے ، ۷ ارغوانی گول ، ۴۸ سرخ لانبے
 اور ۴۸ سرخ گول پر مشتمل تھی، یہ بھی توقع سے قریبی طور پر مطابقت کرتی ہے
 ایک ایسا مٹرجون اورل کے لیے دگر حقیقی ہو صورتوں میں ظاہر

ہوگا، یا تو ایک ن ل زواجہ کے ن ل زواجہ کے ملاپ سے یا پھر
 ن ل کے ن ل زواجہ سے ملنے کے ذریعہ۔ پہلی صورت پر ہم ابھی
 بحث کر چکے ہیں: اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دوسری صورت میں کیا
 ہوتا ہے۔ جب ایک ارغوانی گول کا ملاپ ایک سرخ لانبے سے کرایا
 جائے تو جب پودے مثل پہلی صورت کے لانبے زردانی ارغوانی ہوں گے
 یہاں بھی جب مثل پودوں کی کم ممکنہ جماعتوں پر مثل ہوگی اور مثل پہلی صورت
 کے ارغوانی کا سرخ کے ساتھ تناسب ۳:۱ ہوگا اور یہی تناسب لانبوں
 کا گول کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن وہ تناسب جس میں یہ چاروں جماعتیں
 ظاہر ہوں اب ایک نمایاں فرق ظاہر کرتی ہیں۔ ارغوانی لانبے جملہ
 تعداد کے تقریباً نصف ارغوانی گول اور سرخ لانبے تقریباً ایک ربع
 ہوتے ہیں لیکن سرخ گول نہایت ہی نادر ہیں۔ پہلی صورت کے مقابلہ میں
 اس ملاپ سے نہایت ہی کم پودے حاصل کیے گئے ہیں لیکن ضمیمہ صورت
 جس میں حقیقی حاصل شدہ تعداد بتائی گئی ہے صاف طور پر ظاہر کرتی ہے
 کہ وہ پہلی صورت سے کتنی زیادہ ہٹی ہوئی ہے۔

ارغوانی گول x سرخ لانبے

ارغوانی لانبے

سرخ گول

سرخ لانبے

ارغوانی گول

ارغوانی لانبے

۱

۹۷

۹۵

۲۲۶

یہاں بھی ہم اس عجیب تناسب کو ایک سادہ مفروضہ کے ذریعہ
 سمجھا سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ فرض کریں کہ جب ارغوانی نسل جو ارغوانی گول اور
 ایک سرخ لانبے کے ملاپ سے پیدا ہوئی ہے تو وہ طبعی زواجوں کا ایک
 سلسلہ ۱ ن ل : ۷ ن ل : ۷ ن ل : ۱ ن ل نوعیت کا ظاہر کرتی ہے

بجائے اس کے کہ وہ مساوی تعداد میں پیدا ہوں۔ اس طرح ہم ان عجیب
تناسب کو سمجھ سکتے ہیں جن میں ب نسل کی چاروں جماعتیں ظاہر ہوتی ہیں۔
بیضدانوں کے ایک ایسے سلسلے کے لیے جن کی باروری اگر زردانوں کے
ایسے ہی ایک سلسلے سے ہو تو وہ نیچے بتائی ہوئی مشتمل ترتیب کے مطابق
ایک نسل تیار کرے گی:

ا ن ن ل ل + ن ن ل ل + ن ن ل ل + ا ن ن ل ل
+ ن ن ل ل + ن ن ل ل + ن ن ل ل + ن ن ل ل
+ ن ن ل ل + ن ن ل ل + ن ن ل ل
+ ا ن ن ل ل

۱۲۹ ارغوانی لائے

۴۹ ن ن ل ل + ن ن ل ل + ۴۹ ن ن ل ل + ن ن ل ل + ا ن ن ل ل (۱۳۲)
+ ن ن ل ل + ن ن ل ل

۶۳ ارغوانی گول ۶۳ سرخ لائے ۱۳۲ سرخ گول

ب نسل چار جماعتوں یعنی ارغوانی لائے، ارغوانی گول، سرخ لائے
اور سرخ گول کو ۱۲۹ : ۶۳ : ۶۳ : ۱ کے تناسب میں ہونا چاہیے۔ دوسرے
معنی میں چاروں جماعتوں میں سے پہلی تین ۲ : ۱ : ۱ کے بالکل قریبی تناسب
میں ملنی چاہئیں اور بقیہ جماعت یعنی سرخ گول ہر ۶۵۶ پودوں میں صرف
ایک مرتبہ نمودار ہونی چاہیے۔ تجرباتی حروف جو اوپر کی ایکم میں دیے گئے
ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ صورت تقریباً پوری ہو جاتی ہے۔

تجرباتی نتائج کے ان دونوں سلسلوں پر یکجا غور کرتے ہوئے ایک
امر نمایاں طور پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ ہر صورت میں ب پودے کے تیار کیے
ہوئے زواجوں کی بڑی تعداد اسی قسم کی ہے جیسے وہ دونوں زواج جن کے

ملاپ سے خود پودا پیدا ہوا تھا۔ ن ل اور ن ل زواجوں سے تیار شدہ جب پودا ان دونوں نمونوں کے ساتھ گنا زواجے بمقابلہ ن ل اور ن ل کے نمونوں کے تیار کرتا ہے۔ جب پودا جو ن ل اور ن ل سے بنتا ہے۔ بمقابلہ ن ل اور ن ل کے نمونوں کے ان دونوں نمونوں کے ساتھ گنا زواجے تیار کرتا ہے۔ اور یہ بات دوسری صورتوں کے لیے بھی درست ہے جہاں عوائل کے باہمی ارتباط کو جانچا گیا ہے۔ ایسی تمام صورتوں میں وہ پودا جو عوائل کے لیے دگر زواجی ہے اور جو یہ ربط ظاہر کرتا ہے دونوں اسلامی نمونوں کے زیادہ تر زواجے پیدا کرتا ہے۔ اس منظر کے مطالعہ کے ابتدائی زمانے میں اس کو عموماً اصطلاحات عوائل کے ”مزدوجیت“ اور ”دفع“ سے موسوم کیا جاتا تھا۔ جب ملاپ کی نوعیت ایسی ہو کہ دونوں عوائل ن اور ل ایک سلف سے داخل ہوئے اور ان میں سے کوئی دوسرے سے نہیں آیا۔ جبکہ ملاپ ن ل x ن ل قسم کا ہو تو عوائل ن اور ل کے لیے یہ کہتے ہیں وہ جزوی مزدوجیت ظاہر کرتے ہیں۔ جب پودے سے زواجوں کی تیاری میں ان کا میلان یہ تھا کہ وہ ایسے ہی زواجے کے اندر سات مرتبہ داخل ہوئے بمقابلہ اس کے کہ وہ دوسروں میں ایک مرتبہ داخل ہوئے۔ اسی طرح جبکہ ملاپ ن ل x ن ل نوعیت کا ہے تو جب پودا ایسی ہی ساخت یعنی ن ل ن ل کا ہے۔ لیکن زواجوں کی زیادہ تر تعداد ن ل اور ن ل نوعیت کی ہے۔ دونوں عوائل مختلف زواجوں میں سات مرتبہ داخل ہوتے ہیں اور ان کے مقابلہ میں صرف ایک مرتبہ یکساں زواجہ میں داخل ہوں گے۔ جب پودے کے زواجی تولید کے دوران میں یہ ایک دوسرے کو دفع کرتے ہوئے ظاہر ہوئے لیکن یہ ہر صورت میں نہیں ہوتا اسی وجہ سے اصطلاح جزوی دفع کی بنا پڑی۔ اس وقت جبکہ یہ اصطلاحیں بنائی گئیں یہ معلوم نہ تھا کہ مزدوجیت اور دفع و حقیقت ایک ہی منظر کا حصہ ہیں۔ آجکل عموماً اس منظر کو رابطہ کہتے ہیں حالانکہ اصطلاحات ”مزدوجیت“ اور ”دفع“ کو اس کی دونوں قسموں کے ظاہر کرنے کے لیے

(۱۳۳)

تقایم رکھنا ہی زیادہ موزوں ہے۔

۱۰۔ سیٹھے مٹریس اصل زیرے کے رنگ کی مثال کے معلوم ہونے کے بعد

اس پودے میں دوسری مثالیں بتدریج معلوم ہوئیں اور جوں جوں یہ معلوم ہوتی گئیں یہ ممکن ہو گیا کہ اس منظر کے لیے ایک عام اسکیم بنائی جاسکے۔

جب عوائل اور جب ربط سے منظر کو نظر کرتے ہیں تب

جب نسل کی نوعیت اُس لحاظ سے مختلف ہوتی ہے اور اس کا انحصار

ملاپ کی نوعیت پر ہے جو $a \times b$ یا $a \times b$ قسم کا

ہو۔ پہلی مثال میں (مزدوجیت) جب پودا زوجوں کے ایک سلسلے کو بناتا

ہے جن کی نوعیت لا ا ب : ا ب : ا ج : لا ا ب کی ہوتی ہے۔

بر خلاف اس کے بعد ہی مثال (دفع) میں سلسلہ اء عجب : لا اء ب :

لا اذ ب: اذ ب ہے۔ ہر صورت میں لا کی قیمت یحساں اور ایک
سبز باوم سے لکھن کے لئے قیمت چار انکے ہمیشہ سے زیادہ مل کر

کے زیادہ ہے۔ لیکن لا فی میت حال کو ہمیشہ سے ان کے انکوائری کے ایسے مختلف حوڑوں کے لئے مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہ جو رشتہ کے ۳۱ منظر کہ ظاہر کے تشریح

زیرہ رنگ کی مثال میں لا کی قیمت جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں تقبلاً ہے۔

ایک دوسری صورت میں جہاں متقابلہ "کریٹین" کے (دیکھو شکل ۱۷) طبعی بھول

کی سیرتوں کے جوڑوں سے سابقہ ہے لا کی قیمت تقریباً ۳۰ ہے۔ جہاں

سیرتوں کے دو جوڑے ارغوانی، سرخ رنگ اور اتنا وہ ہتھکڑیوں کے دو جوڑے

پھول معیار کے ہیں اس کی قیمت .. اسے زائد ہوتی ہے۔

اس آخری مثال کا بیان رابطی مظاہر کے سلسلے میں ایک دوسرے سے

ی جانب اشارہ کرتا ہے۔ لائبرالوں زیرے کا جوڑا ارغوانی سرخ جوڑے کے
ساتھ رابطہ قائم کرتا اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور رابطہ قائم کرتا ہے۔

کے ساتھ رابطہ ظاہر کہ تلامذہ تکمیل رابطہ جزو کر کے

جورے ایک دوسرے کی جانب میلان رکھتے ہیں، نتیجہ کے طور پر یہ معلوم ہوا

کہ وہ بھی ایک دوسرے کی جانب رابطہ خاطر کرتے ہیں۔ - تیز عوازل، کسر

دو ایسے گروہ میٹھے مہٹر پر ابتدا فی کام کرتے ہوئے یا نئے سکے اور یہ کتاب

1890

ہوا کہ جبکہ ہر گروہ کے اراکین نے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ظاہر کیا تو ایسے اراکین نے کسی رابطہ کا اظہار نہیں کیا جن کا تعلق مختلف گروہوں سے ہے بلکہ اُن کا رجحان ایک دوسرے کی طرف معمولی خود مختارانہ تھا۔

یہ صورت خاص سیرتوں کے لحاظ سے رابطے کے منظر کی تھی جبکہ اس کو

میٹھے مٹر میں معلوم کیا اور اس پر کام کیا گیا۔ حالانکہ شروع میں اس کا مفہوم

مبہم تھا اور اس کتاب کی ایک ابتدائی اشاعت میں جو بیس سال قبل

شائع ہوئی تھی یہ بیان کیا گیا تھا کہ "اس کا بہت زیادہ امکان ہے کہ

جوں جوں اس کی بابت بہتر معلومات فراہم ہوں گی یہ معلوم ہوگا کہ وہ

زواجہ کی ساخت کو سمجھانے کے لیے عجیب طور پر اہم پائی جائیں گی۔"

کس قدر عمدگی سے یہ پیشینگوئی پروفیسر مارگن اور اُن کے ساتھیوں نے

پوری کی یہ بعد کے باب میں ظاہر ہوگا۔

بہر حال علاوہ اس کے کہ جو روشنی رابطے نے خلیے کی ساخت اور تقسیم

کی میکینیت پر ڈالی ہے اس کا بھی امکان ہے کہ وہ عوامل کے کئی

ناقابل فہم گروہوں کے سمجھنے میں مدد دے گا۔ وہ لوگ جو مینڈلی وراثت

کے امور کے لحاظ سے انسان میں وراثت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں

اُن کو سلف اور بچے میں اکثر قریبی مشابہت پائے جانے کی وجہ سے وقت

کا سامنا ہوا ہے۔ تمدن یافتہ انسان ایک ایسا دو غلہ ہے جس میں بہت

زیادہ تعداد وراثتی سیرتوں کی موجود ہے اور اتنا زیادہ دیگر جفتی ہے کہ

کسی باہمت کام کرنے والے کے خیال میں بھی یہ مایوسی کا باعث ہوگا اگر

انسانوں کی خالص نسل کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی جائے پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ

ایک بچہ اکثر کتنا زیادہ غیر معمولی طور پر باپ سے مشابہت رکھتا ہے اور

دوسرا ماں سے۔ اگر یہ تمام وراثتی سیرتیں جدا گانہ طور پر ایک دوسرے سے

بغیر تعلق کے منتقل ہوتیں تو ایسی قریبی مشابہتوں کی مثالیں شاذ ہی ملتیں۔

یہ امر کہ یہ اتنی زیادہ ہیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان
میں عوامل بغیر کسی تبدیلی کے گروہوں کی شکل میں منتقل ہوتے ہیں اور یہ
غیر ممکن نہیں ہے کہ ان صورتوں کا مطالعہ جن میں مزدوجیت اور دفع نمودار
ہوتے ہیں آخر کار اس کو زیادہ صاف کر دیں گے جو خود ہماری نوع کی وراثت
کی درحقیقت ایک اہم خصوصیت ہے۔



تیرہواں باب

(۱۳۶)

لون جسدی نظریہ

فینڈلیٹ سے متعلق زیادہ حالیہ ترقیوں میں سے کسی نے اتنی دلچسپی پیدا نہیں کی اور نہ اُن سے اتنے زیادہ نتائج حاصل ہوئے جتنے کہ مارگن اور اس کے ساتھیوں کے نام کے ساتھ امریکہ میں ہیں۔ ان میں سے چند پر ہم نے صنف کے سلسلہ میں بحث کی ہے میوہ کی چھوٹی مکھی ڈرو سو فایلا میلا نوگیسٹو (*Drosophila melanogaster*) جس پر انھوں نے کام کیا وراثت کے مسئلوں کو سلجھانے کے لیے اب تک جو کچھ جانور دستیاب ہوئے ہیں اُن میں موزوں تیرن ہے۔ یہ ۴۰۰ سے زائد ایسے حوالہ فراہم کرتی ہے جو فینڈلی افتراق کو ظاہر کرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے لون جسد نمایاں اور تعداد میں نہایت کم ہیں۔ یہ سخت جان ہے اور بہت زیادہ بچے پیدا کرتی ہے۔ یہ آسانی کے ساتھ تجربہ خانہ میں رکھی جاتی ہے اس لیے کہ وہ نہایت کم جگہ گھیرتی ہے اور اس پر کام نہایت کفایت سے کیا جاسکتا ہے اس لیے بھی کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں چند سٹرے ہوئے کیلوں پر پالی جاسکتی ہیں۔ گزشتہ دس سال میں ان خوبیاں کا فائدہ امریکی کام کرنے والوں نے پوری طرح اٹھایا ہے اور انھوں نے اپنے نتائج تکی بنا کر پر ایک ضابطہ تیار کیا ہے جس کو وراثت کا لون جسدی نظریہ


کہتے ہیں۔ اس نظریہ کے لحاظ سے لوں جند وراثت کی ماوی اس
بناتے ہیں۔ مختلف عوامل جن پر ان سیرتوں کے اظہار کا دار و مدار ہے
لوں جندوں کے اندر رہتے ہیں اور وہاں سے وہ خلیوں کی نوعیت اور
(۱۳۷) ایسے عضویوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن کو یہ خلیے بناتے ہیں۔ کس طرح
سے افتراق کا مظہر اس مظہر سے مماثلت رکھتا ہے جو لوں جند زواجوں کی
تیار میں اثر انداز ہوتا ہے اس کے سمجھانے کے لیے نفس مضمون سے کچھ
ٹنٹا پڑے گا۔

ایک جانور یا پودے کے خلیوں کے لوں جندوں کی تعداد عموماً ایک
معین تعداد ہے جو دو کی اعداد ضربی ہوتی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ جندوں کا
ایک نصف ہر اس زواجہ سے حاصل ہوتا ہے جس سے نیا فرد تیار ہوتا
ہے۔ جب منوی حوین اور انڈا ملتے ہیں تو ہر طرح تیار ہونے والے جفتہ کے اندر
لوں جندوں کی تعداد ہر دو زواجوں کے لوں جندوں کی دو گنی ہو جاتی ہے
ایک زواجہ کے لوں جند اکثر حیامت اور شکل میں اختلاف رکھتے ہیں اور
جب ایسا ہوتا ہے تو ہر زواجہ کے اندر خواہ وہ انڈا ہو یا منوی حوین
لوں جندوں کا ایک معین سلسلہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے جفتہ میں ایک جوڑا
لوں جندوں کے ایسے سلسلہ کا رہتا ہے جو زواجہ کے مفرد سلسلہ سے مطابقت رکھتا
ہے۔ اب ہمیں ایک ایسی فرضی مثال لینی چاہیے جس میں زواجہ کے اندر دو لوں
جند ہیں ایک لانا اور ایک چھوٹا (شکل ۴۳)۔ علاوہ ان کے ہم پیری اور
ماوری لوں جندوں کو نمایاں کریں گے یعنی وہ جو جفتہ کے اندر انڈا اور
منوی حوین دونوں سے جاتے ہیں یہ رنگ کے مختلف طریقوں سے خاک میں
دکھائے جائیں گے۔ ایک جفتہ ۴۴ لوں جندوں والا تیار ہوتا ہے جس میں
ایک جوڑا لانیوں اور ایک جوڑا اچھوٹوں کا رہتا ہے۔ مسلسل تقسیم سے یہ جفتہ
ایک پودہ یا جانور میں جیسی بھی صورت ہو نمو پاتا ہے۔ ہر تقسیم پر ایک

۴۵۔ یہ ان عجیب صنفی لوں جندوں سے علاحدہ ہیں جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔

(۱۳۸)

لون جند آدھا ہو جاتا ہے اور ہر نصف حصہ ایک مکمل لون جند بن جاتا ہے اس طرح سے کہ تمام تیار ہونے والے خلیوں میں مثل اصل جفتہ کے ہم لون جند ہوتے ہیں۔ لیکن جب زواجے بنانے کا وقت آتا ہے تو ایک عجیب عمل ہوتا ہے جسکی



شکل (۳۴)

جہ جفتہ سے بنے ہوئے خاندانوں میں مادری و پدری لون جندوں کی تقسیم کو ظاہر کرنے کے لیے خاکہ۔ بقیہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔

وجہ سے ہر زواجہ میں لون جندوں کی تعداد کم ہو کر ۲ رہ جاتی ہے۔ ان خلیوں میں جو بعد میں زواجے بنائیں گے مائل لون جند ایک دوسرے سے بالکل مل جاتے ہیں اور اکثر ایسے اجسام بناتے ہیں جن کو باغیہ کہتے ہیں۔ تب دو تفریقیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لون جندی مادہ پہلے نصف میں اور پھر باغیہ درجے کے ایک چوتھائی پر منقسم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ شکل (۳۴)

(۱۳۹)


میں دکھایا گیا ہے ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ پہلی تقسیم صرف مقداری ہے جو دو خلیے بناتی ہے جن میں سے ہر ایک کے اندر دو مادری اور دو پدری لون جندوں کی نمایندگی ہوتی ہے۔ بہر حال دوسری تقسیم کو ہم توصیفی تصور کر سکتے ہیں اس لیے کہ

۱۔ اب یہ عموماً تسلیم کیا جا چکا ہے کہ پہلی تقسیم عموماً توصیفی اور دوسری صرف مقداری ہوتی ہے۔ بہر حال اس سے استدلال پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

عامل کے حامل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایک شکل پیدا ہو گئی ہے۔ ہمیں یہ فرض کرنا چاہیے کہ متصورہ صورت میں جس پر ہم ابھی بحث کر رہے تھے لائبے مادری نوں جند و عوائل ۱ اور ج کے حامل ہوتے ہیں۔ لیکن چھوٹا جب کا حامل ہوتا ہے۔ چونکہ نوں جندوں کے لیے یہ فرض کرنا لازمی ہے کہ وہ اپنی انفرادیت کو قائم رکھتے ہیں اور اس کے لیے جو دوسرے ذرائع سے شہادتیں ملی ہیں یہ نمایاں ہے کہ ۱ اور ج کو ہمیشہ پوری طرح آپس میں جڑا رہنا چاہیے۔ اگر ہم یہ معلوم کریں کہ یہ جدا کیے جاسکتے ہیں تو ہمیں یا تو نوں جندی نظریہ کو بالکل ترک کر دینا پڑے گا یا کوئی قابل فہم حل معلوم کرنا ہوگا۔

اس مشکل کو حل کرنے کے لیے امریکی کام کرنے والوں نے ایک نہایت عمدہ نظریہ بنایا ہے ڈسروسو فائیل میں ۴۰۰ سے زائد مختلف عوائل پائے جانے کا ثبوت ہے لیکن نہ واجہ میں نوں جندوں کی تعداد صرف ۴ ہے (دیکھو شکل ۲۵)۔ تجربات کی بڑی تعداد جس میں لاکھوں لکھیوں کی افزائش شامل ہے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ متعدد عوائل جو ڈسروسو فائیل میں بتائے گئے ہیں چار گروہوں کے تحت آتے ہیں ان گروہوں میں سے

(۱۴۱)




شکل (۲۵)

ڈسروسو فائیل کے تمام نوں جندوں میں عوائل کی لائبی ترتیب کو ظاہر کرنے کے لیے خاکہ جداگانہ عوائل کی تعداد کے لیے یہ فرض کرنا چاہیے کہ وہ دکھائی ہوئی تعداد سے بہت زیادہ ہوگی۔

کسی ایک کے اراکین ایک دوسرے کی جانب رابطہ کا منظر ظاہر کرتے ہیں۔ جند اگانہ گروہوں کے افراد کے مابین رابطہ کے اس منظر کی کوئی شہادت عموماً نہیں پائی جاتی۔ اس کا ماحصل یہ ہے کہ عوائل کے یہ چاروں گروہ نوں جندوں کے چاروں جوڑوں سے مماثلت رکھتے ہیں اور اس امر کی تصدیق ذیل کی وضاحت سے ہوتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ عوائل کے چاروں گروہ تعداد میں کبھی مساوی نہیں ہوتے۔ ان میں سے تین ہتھابلہ چوتھے کے بہت زیادہ عوائل اپنے اندر رکھتے ہیں جس میں صرف تین اتک تھیز کیے گئے ہیں یہی ہوتا ہے جیسا کہ اس امر سے توقع کیجا سکتی ہے کہ نوں جندوں کے جوڑوں میں سے ایک (نوں جند ۴) نہایت چھوٹا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گروہوں میں سے ایک ایسے عوائل پر مشتمل ہے جن میں سے تمام صنف رابطی وراثت ظاہر کرتے ہیں برخلاف اس کے اس نوعیت کے عوائل دوسرے تینوں گروہوں میں سے کسی میں بھی نہیں پائے جاتے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ عوائل کا یہ گروہ صنفی خلیوں شکل ۳۵ میں نوں جند (۱) کے ذریعہ منتقل ہوتا ہے۔

(۱۳۲) ایک اہم بات نوں جند میں عوائل کی ترتیب ہے۔ اس کے لیے تصور کیا جاتا ہے کہ وہ طوی ہے۔ ہر نوں جند منکوں کی ایک لڑی ہے اور ہر منک ایک عائل کے حامل ہے (دیکھو شکل ۳۵)۔ ہر ایک عائل جو ایک نوں جند کے اندر رہتا ہے ایک معین جگہ یا چیئر پر نوں جند کے اندر جمارہتا ہے۔ ایک تقریباً وسط میں اور دوسرا نوں جند کے سرے کے قریب ہو سکتا ہے۔ لیکن خواہ وہ کہیں بھی ہو کسی ایک عائل کا مقام ایک ایسے نوں جند کے اندر جس میں وہ پایا جاتا ہے اس نوع کے افراد کے لیے طبی طور پر یکساں ہو گا۔ نوں جندوں اور عوائل کے اس باہمی ارتباط کے اس سرسری تذکرہ کے بعد جو نوں جندی نظریہ کے مطابق پایا جاتا ہے اب ہم وراثت کی میکائنت پر اور ان دو عوائل کی صورت حال پر بحث کرتے ہیں جو ایک ہی نوں جند کے ذریعہ منتقل ہوتے ہیں۔

مثال کے طور پر ہم سیرتوں کے دو جوڑوں کو لے سکتے ہیں جن کے عوامل نوں جسدوں یعنی نوں جسد ۲ کے دو لائے جوڑوں میں سے ایک ہی کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ یہ بخلاف سیاہ جسمی رنگ کے بھورے اور بجائے



شکل (۳۶)

باقیاتی پر والوں کے طبعی پر والے ہوتے ہیں۔ پہلی صورت ایسی ہے جس میں پرجامرت میں اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ کٹا اڑ نہیں سکتا۔ سیرتوں


کے ان جوڑوں میں سے بھورے رنگ اور طبعی حالت غالب ہیں۔ جب ایک باقیاتی پر والی سیاہ مکھی کو بھوری طبعی مکھی سے ملائیں تو بچے تمام بھورے طبعی ہوتے ہیں اور نتیجہ ایسا ہی رہتا ہے خواہ سیاہ باقیاتی نر یا مادہ سلف ہو۔

(۱۳۳)

جب ہم ۵ کا دھڑے مغلوب یعنی سیاہ باقیاتی سے ملاپ کریں تو وہ صرف دو نمونوں کے ہی بچے پیدا کرتے ہیں یعنی بھورے طبعی اور سیاہ باقیاتی مساوی تعداد میں حاصل ہوتے ہیں۔ نوں جسدی نظریہ کے لحاظ سے اس کی سادہ ترین حالت میں یہی توقع کی جاتی ہے۔ اس لیے دوسرے جوڑے سے تعلق رکھنے والے دونوں نوں جسدوں میں سے ایک بھورے طبعی اور دوسرا سیاہ باقیاتی سلف سے حاصل ہوا ہے۔ لہذا جب یہ نوں جسد زواجوں کو بنانے میں پھر جدا ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ ان میں سے نصف میں طبعی نوں جسد اور دوسرے نصف میں سیاہ باقیاتی ہوگا۔ ہم ۵ کو دھڑے سے ملانے کا نتیجہ ظاہر کرتا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بھورے اور طبعی پر کے لیے عوامل یکجا

رہتے ہیں اور اس طرح اس نقطہ نظر سے مطابقت کرتے ہیں کہ نون
جند کی یکجا ئیت جس میں دونوں پائے جلتے ہیں قائم رہتی ہے۔
بہر حال جب ہم جب ۰ کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں تو بالکل ہی
مختلف صورت حال نظر آتی ہے۔ اس کو دہرے مغلوب یا سیاہ باقیاتی
نر سے ملانے سے چار قسم کے بچے یعنی بھورے طبعی، بھورے باقیاتی سیاہ
طبعی اور سیاہ باقیاتی پیدا ہوں گے۔ دونوں جماعتیں یعنی بھوری
طبعی اور سیاہ باقیاتی تقریباً پانچ گنا اتنی زیادہ ہیں جتنی کہ دونوں
جماعتیں بھوری باقیاتی اور سیاہ طبعی۔ اس منظر کو ہم نے پہلے ہی مواصلت
کے نام سے بیان کیا ہے جس میں جب زواجہ کی ان دونوں اقسام میں
سے ایک یا دوسری کو زیادہ تعداد میں پیدا کرتی ہے جن سے جب
تیار ہونی تھی جو اس صورت میں بھورے طبعی اور سیاہ باقیاتی ہیں۔
لیکن اگر بھورے اور طبعی پر کے لیے عوامل ایک ہی نون جند میں موجود
ہوں تو یہ کس طرح ہوتا ہے کہ جب ۰ زواجہ کے دونوں نمونوں میں
سے ایک یا دوسرا ہی پیدا کرتی ہے یعنی بھورے باقیاتی اور سیاہ طبعی جن
میں بھورے اور طبعی کے عوامل ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں۔
جب ۰ کا طرز عمل اپنے ساتھ نر کے مقابلہ میں اتنا مختلف کیوں ہے؟
امریکہ کے مشاہدین نے اس شکل پر قابو پانے کے لیے نہایت کارآمد نظریہ
قائم کیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نون جندوں کے جوڑے کے پداری اور
مادری افراد کے مابین ماؤں کے کا اڈل بدل ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے
ہیں ایک فرد کے خلیوں میں نون جندوں کا دسرا مجموعہ رہتا ہے ان
خلیوں میں سے ہر ایک میں اتنے ہی جوڑے نون جندوں کے رہتے
ہیں جتنے کہ ہر زواجہ کے اندر مفرد نون جند ہیں۔ دہرے مجموعہ میں
ہر جوڑے کے اندر سے ایک پداری اور دوسرا مادری زواجہ سے حاصل
ہوتا ہے۔ جب ایک خلیہ منقسم ہو کر دو دختر خلیے بناتا ہے تو ہر مفرد نون جند
نصف ہو جاتا ہے اس طرح سے کہ نون جندوں کی تعداد اور بناوٹ کے

لحاظ سے دُختر خلیے اپنے مادر خلیوں سے مشابہ اور ایک دوسرے سے بھی ملنے جلتے ہیں۔ عموماً کے رابطہ کو سمجھانے کے لیے یہ تصور کیا گیا ہے کہ زواجی



شکل (۳۴)

بھڑے دار لون جندیوں کی درمیانی "بجائیت" کو ظاہر کرنے کے لیے خاکہ جبکہ نقطہ اتصال اس طرح رہتا ہے جیسا کہ ۱ اور ۲ میں تو تیار ہونے والے زواجی جب اور ط عموماً کے لحاظ سے "غیر بجائیتی" ہوں گے جبہ نقطہ اتصال ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ۳ میں تو تیار ہونے والے زواجی جب اور ط کے لحاظ سے بجائیتی ہوتے ہیں۔

(۱۳۵) کی تیاری سے قبل چند درجوں پر کسی ایک خاص جوڑے کے نُون جَند سے دوسرے کے اندر ماڈے کی منتقلی عمل میں آتی ہے۔ بہر حال اس قسم کی کوئی منتقلی ایسے نُون جَندوں کے مابین نہیں ہوتی جن کا تعلق مختلف قسم کے جوڑوں سے ہوتا ہے۔ یہ غالباً زیادہ آسانی کے ساتھ ایک خاص مثال کے ذریعہ سمجھی جاسکتی ہے اور اس مقصد کے لیے ہم بھورے جسمی رنگ اور طبعی کے لیے عوائل کے طرز عمل کو لے سکتے ہیں جس پر باقیاتی پروں کے مقابلہ میں ج ب ڈسٹو سوافٹلہ کے سلسلہ میں اوپر بحث کی گئی ہے۔ یہ عوائل نُون جَند ۲ شکل (۳۵) میں ملتے ہیں اور یہ تصور کیا گیا ہے کہ یہ دونوں نُون جَند کے وسط کی جانب موجود ہوتے اور ایک دوسرے سے نُون جَند کی تقریباً ۱ لمبائی کے ذریعہ جُدا رہتے ہیں جیسا کہ شکل (۳۴) میں دکھایا گیا ہے۔ اب ہمیں یہ فرض کرنا چاہیے کہ زواجوں کی تیاری سے ایک خاص درجہ پر جبکہ جوڑے کے دو افراد اپنی پوری لمبائی میں پوری طرح ایک دوسرے سے ملجاتے ہیں تو جیسا کہ شکل (۳۴) میں ہے وہ ایک دوسرے سے ہجانبیت کا میلان ظاہر کرتے ہیں۔ علاوہ اسکے ہمیں یہ بھی فرض کرنا چاہیے کہ وہ اُس نقطہ پر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتے ہیں جہاں وہ ہجانبیت کرتے ہیں اور جب وہ بعد میں جُدا ہوتے ہیں تو وہ نُون جَند کے اُس حصہ کو بدل لیتے ہیں جو اتصال کے نقطہ کے بعد رہتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نُون جَندوں کا یہ جوڑا شکل (۳۴) ۱ میں دکھائے ہوئے طریقہ پر ساخت ظاہر کرے گا۔

لیکن چونکہ نقطہ اتصال یہاں نُون جَند کے اُس حصہ کے بعد ہے جو ج ب اور ط کے درمیان ہے تو ان دونوں عوائل کے درمیان ملاپ گڑبڑ نہیں ہوگا۔ بہر حال اگر نقطہ اتصال ج ب اور ط کے درمیان ہے جیسا کہ ۳۴ ج میں تو نُون جَندوں کی ایک دوسرے سے علحدگی ج ب اور ط کے درمیان جدائی کا باعث ہوگی۔ بجائے ایک بھورے اور ایک سیاہ باقیاتی نُون جَند کے ہمیں ایک بھورا باقیاتی اور ایک سیاہ طبعی حاصل ہوگا۔


(۱۳۷)

”ہجانیٹ“ کا عمل جیسا کہ اس کو موسوم کیا گیا ہے ایسے زواجے بناتا ہے جو ایسے دونوں سلتی نمونوں سے بالکل مختلف ہوں گے جنہوں نے جب مادہ بنائی تھی۔ پھر اگر ہم یہ فرض کریں کہ نقطہ اتصال مساوی امکان کے ساتھ لون جندوں کے کسی نقطہ پر واقع ہو تو اس طرح دونوں عوائل کے جدا ہونے کے امکان کا انحصار اس فاصلہ پر ہوگا جو ان کو لون جندوں کے اندر ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔ یہ جتنے بھی ایک دوسرے کے قریب ہوں گے اتنا ہی کم امکان ان کے ایک دوسرے سے جدا ہونے کا ہے اور جتنے ہی یہ ایک دوسرے سے دور ہوں گے اتنا ہی امکان ان کے جدا ہونے کا ہے۔ اس تناسب کی وجہ سے جو ”ہجانیٹی“ زواجوں اور ”غیر ہجانیٹی“ زواجوں کے مابین پایا جاتا ہے عوائل کے درمیانی فاصلے لون جندوں کے اوپر قائم کیے گئے ہیں اس تصور پر کہ عوائل لون جند پر اس طریقہ سے ترتیب دیئے ہوئے رہتے ہیں جیسے کہ ایک ہار میں اسلحہ اس خاص مثال میں جو زیر بحث ہے مادہ ڈسوسوفائیڈ جو ایک بھورے طبعی اور ایک سیاہ باقیاتی زواجہ کے ملاپ سے بنتی ہے ہجانیٹی زواجے یعنی بھورے باقیاتی اور سیاہ طبعی کے جگہ کا تقریباً ۱/۲ بناتے ہیں۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ بھورے عائل اور طبعی پر عائل کا درمیانی فاصلہ لون جند کی لمبائی کا تقریباً ۱/۲ ہے۔ اسی طرح لون جند ۲ شکل (۳۵) میں دوسرے عوائل کی جگہ کا تعین بھورے جسمی رنگ اور طبعی پر کے لحاظ سے کیا گیا ہے۔ اس طریقہ پر عمل کرتے ہوئے امریکہ کے مشاہدین نے چاروں لون جندوں میں سے ہر ایک کا نقشہ تیار کیا ہے جہاں ہر ایک پر وہ صحیح جگہ بتائی گئی ہے جس پر مختلف عوائل پائے جاتے ہیں۔ اور ان نقشوں کا انحصار نہایت بڑے اور مسلسل تجرباتی نتیجوں پر ہے۔

در اصل یہ توضیح مساوی طور سے اس پر بھی حاوی ہے جس کو پہلے دفع کے نام سے موسوم کیا گیا اور ساتھ ہی مواصلت پر بھی۔ جب ایک بھورے باقیاتی اور ایک سیاہ طبعی زواجہ میں ملاپ ہوتا ہے تو جب

(۱۳۸)

لکھیاں بھوری طبعی مثل پہلے کے ہوں گیں۔ جب مادوں کو سیاہ باقیاتی نروں سے ملانے سے حاصل ہونے والی نسل مثل پہلے کے چار نمونوں یعنی بھورے طبعی، بھورے باقیاتی، سیاہ طبعی اور سیاہ باقیاتی پر مشتمل ہوگی۔ اب وہ بھورے باقیاتی اور سیاہ طبعی ہیں جو دوسرے جماعتوں کے مقابلہ میں نہایت کثیر تعداد اور ۵ تا ۱۱ تناسب میں ہیں۔ یہ دراصل دونوں ابتدائی سلفی نمونے ہیں اور ان کی زیادہ پیدائش بمقابلہ دونوں غیر سلفی نمونوں کے اس وجہ سے تھی کہ مثل پہلے کے غیر ہجانیٹی زواجے بمقابلہ ہجانیٹی زواجوں کے بہت زیادہ تعداد میں پیدا ہوئے۔ جب نر کی صورت میں بھی نتیجہ بالکل اُس سے ملتا ہوا ہے جو قبل کے ملاپ میں دیکھا گیا۔



شکل (۳۸)

جب اس کی باروری دوسرے مغلوب یعنی سیاہ باقیاتی مادہ سے کرائی گئی تو وہ صرف بھورے باقیاتی اور سیاہ طبعی بچے تقریباً مساوی تعداد میں پیدا کرتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نہ صرف دو سلفی نمونے نوں جند کے پیدا کرتا ہے اور یہ کہ اس صنف میں کوئی ہجانیٹ وقوع میں نہیں آتی۔ یہ نہ صرف زیر بحث خاص مثال کے لیے ہی درست نہیں بلکہ ان صورتوں کے لیے بھی جہاں ڈسوسوفائیلڈ نر کی بناوٹ اس طریقہ پر معلوم کی گئی ہے۔ اس کی ابھی تک کوئی وضاحت نہیں ہوئی کہ یہ ہجانیٹ کیوں ایک صنف میں وقوع پذیر ہوتی لیکن دوسرے صنف میں نہیں ہوتی۔ اگر

راست مشاہدہ سے یہ معلوم ہو جائے کہ نوں جندوں کا طرز عمل دونوں
صنفوں میں مختلف ہوتا ہے تو ہمیں نوں جندی نظریہ کی موافقت میں بین
ثبوت مل جاتا ہے۔ لیکن فی الوقت ایسا تصور کرنے کے لیے ہمارے پاس
کافی وجوہ موجود نہیں ہیں۔ درحقیقت یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ نوں جندوں
کی ایک دوسرے پر مفروضہ خمیدگی ڈسوسوفائیلہ کی مادہ کے لیے ابھی
تک ظاہر نہیں کی گئی۔ فنی مشکلات بلاشبہ بہت زیادہ ہیں پھر بھی جنک
ایسا حل معلوم نہ ہو اس وقت تک اس شہادت کی زنجیر میں لازماً ایک
کڑی باقی رہے گی جس کے ذریعہ نوں جندی نظریہ کی اعانت ہوتی ہے۔
بہر صورت یہ ایک قابل فہم توضیح کئی متضاد امور فراہم کرتی ہے
اور اس لیے آجکل تناسلیات داں اس کو عام طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ جب
سے یہ بتائی گئی ہے اس وقت سے ہی اس کو خلویاتی جانب حمایت حاصل
ہوئی خصوصاً ان جماعتوں کی مثالوں میں جہاں ایک مشاہدہ شدہ کمی یا
نوں جندی مادے کی وافریت خاص طور پر جفتہ کی سیرتوں کے ساتھ
مماثلت کرتی ہے لیکن اگر ہم ان حالیہ ترقیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے
تو وہ اس پھوٹی کتاب کے حدود سے کہیں زیادہ ہو گا۔ ان نہایت عمدہ
حیاتیاتی تحقیقات کے کاموں کا مقابلہ کمیا داں اور طبیعیات داں کی حقیقی
کامیابیوں سے کیا جاسکتا ہے اور ہم پروفیسر ٹی۔ ایس۔ مارگن اور اس
کے ساتھیوں کے ممتون ہیں کہ ان کی تحقیقات کی وجہ سے تناسلیات داں
تمام دنیا میں اب نوں جندوں کے پیش نظر اس امر پر کام کر رہا ہے۔
ایک مزید مسئلہ ہے جس پر صحیح طریقہ سے اس باب میں بحث کی جاسکتی ہے

(۱۵۰)

۱۔ اگر اس بارہ میں مزید معلومات حاصل کرنا ہوں تو کتاب

The Mechanism of Mendelian Heredity, 2nd Edit. New York, 1923

مصنفہ ٹی۔ ایچ مارگن۔ اے۔ ایچ اسٹریوانٹ۔ ایچ۔ جے۔ ملر اور سی۔ بی۔ جی۔ C. B. Bridges

کامطالعہ کریں۔ پرانی اصطلاح ”عائل“ کی جگہ امریکہ والے ”جین“ کو استعمال کرتے
ہیں جو غالباً یونانی زبان سے لیا گیا ہے۔

یعنی نوں جسدی نظریہ کا تعلق حاضر و غائب نظریہ کے ساتھ۔ اگر ہر عامل کی نمائندگی
نوں جسد کی لمبائی کے ایک معین حصہ سے کی جائے (اگر عوامل ایک لائینا
سلسلہ منکوں کی لڑی کی طرح بنائیں) تب یہ صاف ہے کہ حاضر و غائب
نظریہ کے لحاظ سے ایک معین حصہ نوں جسدی لمبائی کا موجود یا غیر موجود
ہو سکتا ہے اور چند میکانیکی مشکلات ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ ایک نوں جسد
جس میں غالب سیرتوں کے متعدد عوامل موجود ہوتے ہیں اس سے زیادہ لائینا
ہوگا جس میں یہ عوامل موجود نہیں ہیں۔ لڑیاں جن کو ایک دوسرے سے
جفت کرنا ہے نامساوی لمبائی کی ہوں گی اس لیے مثال عوامل ایک دوسرے کے
بالکل متقابل نہیں ہوں گے اور پجائیت کے عمل میں نتیجہ گڑبڑ ہوگی۔ نوں
جسدی نظریہ کے لحاظ سے یہ فرض کرنا چاہیے کہ ایک مفروضہ جوڑہ کا ہر فرد
ہمیشہ ایسے حصوں کی یکساں تعداد سے بنا ہوا ہے جو عوامل سے مماثلت رکھتے
ہیں۔ اس سے یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ مغلوب سیرت کی نمائندگی ایک ایسے
خاص عامل کے ذریعہ ہوتی ہے جو نوں جسد کی لمبائی کے ایک ایسے ہی معین
حصہ پر مشتمل ہے جس طرح سے کہ غالب سیرت کا عامل کرتا ہے۔ ڈھروسو فائیل
میں ایک معین عامل سیاہ جسمی رنگ اور ساتھ ہی ساتھ بھورے کے لیے اور ایک
معین عامل باقیانی پردوں اور ساتھ ہی طبعی پروں کے لیے بھی پایا جاتا ہے۔
(۱۵۱) اس طریقہ پر ایک مغلوب عامل ہمیں اس جگہ پر ملتا ہے جو عامل غالب عامل
کے ساتھ تبدیل کے لیے ضروری ہے جبکہ پجائیت نونی جسدوں کے درمیانی ہوتی
جو اس نقطہ نظر کے حامی ہیں وہ اس کو مزید تقویت اصطلاح کثیرتبادل شکل
کا حوالہ دے کر پہنچانے کے عادی ہیں، ایک سادہ مثال سے اس کو واضح کیا جاسکتا
ہے۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ہمایائی خرگوش ایک خود رنگ جانور کے ساتھ سادہ
مغلوب کی طرح عمل کرتا ہے۔ برخلاف اس کے ہمایائی اصل سفید کے مقابلہ میں
سادہ غالب کی طرح عمل کرتا ہے۔ حاضر و غائب نظریہ کے مطابق ہمیں یہ
ماننا چاہیے کہ خود رنگ میں ایک ایسا عامل موجود تھا جو ہمایائی میں
نہیں پایا جاتا اور ہمایائی کے مقابلہ میں سفید میں ایک عامل اور بھی

کم تھا۔ اس طرح خود رنگ اور سفید کے مابین دو عوائل کا فرق ہونا چاہیے جن کی افزائش ہمالیائی سے کی گئی ہے اور ان کی باہمی باروری سے نہیں جب میں خود رنگ، ہمالیائی اور سفید خرگوشوں کی ۹ : ۳ : ۴ تناسب میں توقع رکھنی چاہیے۔ درحقیقت ایسے ملاپ سے نہیں صرف خود رنگ اور سفید ہی حاصل ہوئے ہیں۔ افزائش نسل کے امور کے مطابق سادہ ترین نظریہ ہے کہ تینوں سیرتوں یعنی خود رنگ، ہمالیائی اور سفید کے لیے تین عوائل پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متبادل ہیں اس لحاظ سے ایک مفروضہ زواجہ کے اندر ان میں سے صرف ایک ہی رہ سکتا ہے لہذا ایک خاص جفتہ میں ان متبادل عوائل کے ایسے سلسلے کے صرف دو ہی موجود ہو سکتے ہیں۔ چونکہ ایک دیگر جفتی خود رنگ میں ایک عامل اس غالب سیرت کا موجود ہونا چاہیے جس میں علاوہ اسکے یا تو ہمالیائی کا عامل یا سفید کے لیے عامل موجود ہوگا لیکن دونوں کے لیے نہیں پایا جائے گا۔

کثیر متبادل الشکل کے ایسے سلسلوں کی کافی تعداد زندگی کے مختلف شعبوں میں ملتی ہے اور بعض صورتوں میں ان میں تین سے زائد افراد پائے گئے ہیں۔ مثلاً خود ہمارے خرگوش کی مثال میں یہ حال ہی میں بتایا گیا ہے کہ ”چنچلا“ کا تعلق بھی اسی سلسلے سے ہے اس لیے کہ یہ خود رنگ کے مقابلہ میں مغلوب اور ہمالیائی یا سفید کے مقابلہ میں غالب ہوتا ہے۔ ایسے سلسلے چند مشترک سیرتیں ظاہر کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کا اثر ہمیشہ ایک ہی سیرت پر پڑتا ہے مثلاً پوشش کی لونیت کے درجہ، آنکھ کے رنگ کی تیزی وغیرہ اور دوسرے یہ ہے کہ ایک معین ترتیب غلبیت کی متعلقہ سیرتوں کی تدریجی ترتیب کے مائل پائی جاتی ہے۔ خرگوش کی مثال لونیت کے نزولی پیمانہ میں اس طرح ترتیب دی جاسکتی ہے۔

(۲) چنچلا رنگ

(۱) خود رنگ

(۴) سفید


(۳) ہمالیائی رنگ

(۱۵۲)

اور جب یہ ہو گیا تو ایسا ہو گا کہ کوئی ایک درجہ اپنے اوپر کے درجہ کے مقابلہ میں مغلوب اور ترتیب میں اپنے نیچے درجہ والوں کے مقابلہ میں غالب ہو گا۔ مثلاً چھلا رنگ مغلوب ہے خود رنگ کے مقابلہ میں مگر ہالیائی اور سفید کے مقابلہ میں غالب ہے۔ یہ قابل تعریف ہے کہ ایسے عامل کا خیال کیا جائے جو کسی عمل کے ذریعہ خود رنگ اور سفید کے مابین تبدیلی پیدا کر کے چند مستقل جگہیں پیدا کر لے۔ چھلا عامل ایک خود رنگ۔ عامل ہے جس میں سے کچھ کم ہو گیا ہے اور ہالیائی عامل ایک ایسا خود رنگ عامل ہے جس نے کچھ اور زیادہ کھودیا ہے۔ آخری اصطلاح کو ایسے سلسلہ میں جو یہاں سفید (بیزنگ) ہے ہم خود رنگ عامل کی عدم موجودگی کی وجہ سے خیال کر سکتے ہیں جو کسریت کے ذریعہ یا بغیر اس کے تبدیل ہوا ہو۔ اس نقطہ نظر کو بیٹسن نے حال ہی میں بتایا ہے جو نہ صرف ایک قابل قبول توضیح کثیر متبادل شکلیت کی عجیب خصوصیت کی فراہم کرتا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ حاضر و غائب نظریے میں ایک ایسا عام اصول قائم رکھنے میں مدد دیتا ہے جو تناسلیاتی حقیقتوں کی متعدد صورتوں سے عموماً مطابقت رکھتا ہے۔

(۱۵۳)

چودھواں باب



چند پیچیدگیاں



وراثت کے ہمارے موجودہ علم کی روشنی میں ایک پودہ میلا جانور کا تجزیہ یعنی اُن عوائل کا تعین جن پر مختلف سیرتوں کا انحصار ہے اکثر ایک نہایت سادہ عمل ہے باوجودیکہ وہ وقت طلب بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی مٹیٹے مٹر کے پھولوں میں پیدا ہونے والے تمام رنگوں کے مکمل عوامی تجزیہ کو حل کرنے کا پوری طرح ارادہ کر لے تو اس کو غالباً چند مشکلات کا سامنا ہو گا۔ اگر اس کو رنگ کے گہرے اور ہلکے پن کی تمیز ہو اور اس کے ساتھ ساتھ استقلال اور بیڈلی وراثت کے اصولوں کی ابتدائی واقفیت بھی رکھتا ہو تو اس کے لیے مناسب وقت میں ہر قسم کے پھول مع عوائل کے نمونوں ضابطہ کے فراہم کر لینا مشکل نہیں۔ لیکن اکثر ہوتا ہے کہ غیب متوقع پیچیدگیاں نمودار ہو جاتی اور متمولی طور پر کیے ہوئے تجزیے کو خراب کر دیتی ہیں۔ ایک ہوشیار کام کرنے والا جس کو آجکل پار پاروری کے طریقوں سے ایک جانور کی تناسلی بناوٹ کا پتہ لگانے کی جستجو ہوگی وہ غالباً ضرور اپنے

تجربات کے ابتدائی درجہ پر ہی کوئی کار آمد نظریہ قائم کر لے گا۔ ایک
جب نسل کی نوعیت، مختلف شکلوں کا تناسب اور تعداد جب نسل
میں ایسے عوامل کے بارے میں نتائج کا فوراً پتہ دیں گے جو تحقیق سیرتوں
(۱۵۵) کے سلسلہ میں قابل غور ہیں۔ وہ تب اپنے نظریہ کو جانچنے اور مخصوص نکات
کی صداقت کے لیے مخصوص تجربے نکالے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مثال جو
اس نے پسند کی تھی کوئی خاص مشکل مکمل اور سادہ عوامی تجربہ کے لحاظ
سے ظاہر نہ کرے۔ ایسی صورت میں اس سے آگے ایسی تجربہ شدہ سیرتوں
کو وہ قابو میں رکھ سکے گا اور اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی طرح کی اقسام
حاصل کر سکے گا۔ بہر حال تحقیق کرنے والے کے لیے خوش قسمتی سے عموماً اکثر
ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا کار آمد نظریہ اکثر ایک غیر متوقع مشکل کی وجہ
سے اکثر ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کے کام میں کوئی تازہ منظر حاصل
ہو جاتا ہے اور کام فوراً زیادہ دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ غیر متوقع
بات اپنے ساتھ کسی انئی چیز حاصل کرنے کی امید لاتی ہے۔ اس باب
کا مقصد ایسی ہی چند غیر متوقع مثالوں کی بابت اور اس طریقہ کے لیے بھی ہے
جس کے ذریعہ ان کو سمجھا یا گیا ہے۔

جانوروں سے متعلق کئی زیادہ ابتدائی تجربات غیر معمولی چوہوں
پر کیے گئے۔ ان کی پوشش کے رنگوں کے مدارج، ان کا تیزی کے
ساتھ بچے دینا اور ان کے پالنے کے کم اخراجات ایسی باتیں تھیں
جن کی وجہ سے یہ شروع سے ہی تناسلیاتی کام کے لیے نہایت موزوں
جانور ثابت ہوئے ہیں۔ مختلف رنگوں میں جو احتمال کیے گئے زرد بھی
تھا جس کے لیے کوئینوں نے جلد ہی یہ بتایا کہ وہ کسی بھی دوسرے رنگ
کے مقابلہ میں غالب ہے۔ کسی دوسرے رنگ کے جانور سے باروری کرانے
پر دگر خفی مساوی تعداد میں زرد اور غیر زرد جانور پیدا کرتے ہیں لیکن
جب ایسے دگر خفی زرد جانوروں کی آپس میں باروری کرائی گئی تو یہ
معلوم ہوا کہ انہوں نے حالانکہ مقابلہ دوسرے رنگوں کے زرد بہت

(۱۵۶)

زیادہ پیدا کیے لیکن زرد جانوروں کا تناسب اتنا زیادہ نہیں تھا جیسا کہ تناسب ۱:۳ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ علاوہ اس کے یہ بھی معلوم ہوا کہ زرد x زرد کے ملاپ سے کوئی ہم جفتی زرد پیدا نہیں ہوئے حالانکہ سادہ بندلی توقع پر ایسے ملاپ سے ہر تین میں سے ایک اس قسم کا ہونا چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ دیگر جفتی زرد کیوں پیدا نہیں ہوئے؟ ایک تجویز یہ پیش کی گئی تھی کہ کوئی اس قسم کی انتخابی باروری تھی کہ ایک "زرد" منوی حوین نے ایک "زرد" بیضے کو باور کرنے میں رغبت ظاہر نہیں کی۔ ہر حال یہ بتایا گیا ہے کہ "زرد" بیضوں نے "غیر زرد" منوی حوین سے نفرت کا اظہار نہیں کیا۔ یہ کہ اگر یہ نظریہ درست ہے تو تمام "زرد" بیضے ایسے "غیر زرد" منوی حوین کے ذریعے بارور ہوں گے جن کی بہتات تھی۔ اس طرح تمام "زرد" بیضے دیگر جفتی زرد بنائیں گے برخلاف ان کے "غیر زرد" بیضوں میں سے ایک نصف سے دیگر جفتی زرد اور دوسرے نصف سے غیر زرد تیار ہوں گے۔ اور چونکہ "زرد" اور "غیر زرد" بیضے مساوی تعداد میں پیدا ہوتے ہیں تو دو زرد جانوروں کے باہمی ملاپ کا اصل نتیجہ زرد، غیر زرد ۱:۳ کے تناسب سے ہونا چاہیے۔ لیکن کئی سوچو ہوں نے جو زرد x زرد سے حاصل کیے گئے اس بات کو بلاشبہ ثابت کر دیا کہ زرد اور غیر زرد کا تناسب ۱:۲ تھا۔ ظاہر ہے کہ نظریہ بیکار ہو گیا اور تب یہ بات تجویز کی گئی کہ یہ امور اس وقت سمجھ میں آجائیں گے اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ "زرد" منوی حوین "زرد" انڈے کو بارور کر سکتا ہے لیکن حاصل ہونیوالا جفتہ یا دیگر جفتی زرد اتنی کافی ہو جانے کے ناقابل تھا کہ وہ پیدا ہو سکے۔ اس کی حمایت میں یہ بتایا گیا تھا کہ اوسطاً دو زرد جانوروں کے جھول اس سے کم تھے جو زرد x غیر زرد سے حاصل ہوئے۔ یہ ہی توقع کی جاسکتی ہے کہ ہم جفتی زرد جلد ہی رحم کے اندر مر گئے۔ حال ہی میں اس کی توثیق کئی امریکی محقق کرنے والوں کے کام سے


(۱۵۷)

ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ معلوم کیا کہ حل کے زیادہ ابتدائی زمانہ میں جب رحم کو کھولا گیا تو مردہ جنینوں کی تعداد ان زرد مادوں میں بہت زیادہ تھی جن کی باروری زرد نروں سے کرائی گئی بمقابلہ ان زرد مادوں کے جن کو غیر زرد نروں سے بارور کرایا گیا۔ یہ غیر متوقع پچیدگی جو معمولی ۱:۳ تناسب کے حاصل نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئی جب کہ زرد جانوروں کی آپس میں باروری کرائی گئی اور اس کی وجہ سے یہ ایک اہم اور دلچسپ انکشاف ہوا کہ چند زواجی ملاپ ایک ایسے جفتہ کو تیار کرتے ہیں جو بغیر کسی ظاہری سبب کے قبل از وقت مر جائے گا۔ یہ ہے میں اس منظر کے انکشاف کے بعد اس بات کا ثبوت ملا ہے کہ یہ صورت ڈسوفائیکل مرغیوں اور موشیوں میں بھی پائی جاتی ہے اور اس بات کی بھی غالباً شہادت ملیگی کہ وہ جانوروں اور پودوں دونوں میں بہت زیادہ ملتی ہے۔

ایک اور دلچسپ پچیدگی کے لیے ہمیں پودوں کی جانب دیکھنا چاہیے۔ ایک دوسری قسم کا پھول ایک باغبانی پسندیدہ چیز ہے اور صد ہا سال سے یہ معلوم ہے کہ وہ خود بیج نہیں بناتا بلکہ اس کو اکہری قسم کی ایک خاص نوع سے حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں جان پارکینسن نے اپنے گلو پھولوں کے لیے لکھا ہے تم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ پودے جن پر دھیرے پھول ہوتے ہیں بیج پیدا نہیں کرتے۔۔۔۔۔ لیکن دھیرے پھول حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سال اس قسم کے پودوں کے بیج جمع کرو جن پر اکہری پھول تھے اس لیے کہ ان بیجوں میں سے چند سے اکہری اور چند سے دھیرے پھول اگیں گے۔ ان دھیری اقسام پیدا کرنے والے اکہروں کی نوعیت کے بارے میں مس سوٹڈرس کے کام کی وجہ سے چند دلچسپ امور معلوم ہوتے ہیں اس نے دھیرے اقسام

(۱۵۸)

پیدا کرنے والے اکہروں کی باروری ایسے اکہروں سے کرائی جن کا تعلق
ایسی انواع سے تھا جن میں دہرے کبھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ملاپ
دونوں طرح سے کر دیا گیا اور دونوں صورتوں میں تمام جب پودے
اکہرے تھے۔ بہر حال امتیاز اس وقت ہوا جب کہ جب پودوں سے
ایک اور نسل حاصل کی گئی۔ دہرے پیدا کرنے والے اکہرے کے




شکل (۱۳۹)

ایک ہی سلف سے اگلے ہوئے اکہرے اور دہرے پھول۔


زردان سے حاصل شدہ تمام جب پودوں نے دہرے اگائے لیکن جب پودوں میں سے دہرے پیدا کرنے والوں کے بیضدانوں میں سے چند نے دہرے پیدا کیے اور چند نے خالص اکہروں کی طرح عمل کیا۔ اس لیے ہمیں یہ نتیجہ حاصل ہوا کہ دہرے پیدا کرنے والوں کے بیضدانوں اور زردانوں میں سے دونوں حالانکہ ایک ہی پودے سے تیار ہوتے ہیں لیکن وہ عامل (یا عوامل) کی نوعیت کے لحاظ سے دہرے پن کے لحاظ سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ایسے پودوں کے تمام زردانوں کے ذریعہ غالباً دہرا پن منتقل ہوتا ہے لیکن دہرے پن کے حامل چند ہی بیضدان ہوتے ہیں۔ ان امور کی وجہ سے مس سوئڈرس نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ایک ہی پودے کے بیضدان اور زردان خصوصیات

(۱۵۹)



کی منتقلی کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں غالباً یہ افراق کے کسی ایسے عمل سے بڑھتے ہوئے پودے کے اندر ہوتا ہے جس کی وجہ سے چند یا دوسرے عوامل کی نامساوی تقسیم ایسے خلیوں کے اندر ہوتی ہے جو بیضدان بناتے ہیں بمقابلہ ان کے جن سے آخر کار زردان نکلتے ہیں۔ بہر حال ایک اور طریقہ اس کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے اکہرا پن (۱) دہرے پن (۲) پر

سادہ طریقے سے غالب ہے اور دہرے پیدا کرنے والا اکہرا اس صورت میں ایک معمولی جفتہ (۱ ۱) ہوگا۔ یہ بھی فرض کرنا چاہیے کہ پورا ایک عامل ۱ کے لیے دگر جفتی ہے اور یہ کہ یہ عامل اسی نوٹن جند میں رہتا اور ۱ سے قریبی رابطہ رکھتا ہے۔ زیر غور نوٹن جندوں کے جوڑے تک ہی خود کو محدود رکھ کر ہم مختلف قسم کے ملاپ کو شکل ۴۰ کے ذریعے



شکل (۴۰)


اسکیم جو دہری نوع کی دراشت ہلاکتی عامل کے نظریے کے لحاظ سے ظاہر کرتی ہے۔

(۱۶۰) ظاہر کر سکتے ہیں۔ دہرا پیدا کرنے والا نر اور مادہ دونوں جانب دو قسم کے ذریعے زواج یعنی ۱ ۱ اور ۱ ۱ مساوی تعداد میں بناتا ہے ان میں سے ۱ ۱ نر زواج اس لیے فعل انجام نہیں دیتے کہ ان میں ۱ کی عدم موجودگی ایک "ہلاکتی" اثر پیدا کر دیتی ہے۔ اس طرح دونوں اقسام کے بیضدان خود باروری پر صرف دو قسم کے پودے یعنی ۱ ۱ اور ۱ ۱ مساوی تعداد میں پیدا کریں گے جو دہرے ہیں اور ۱ ۱ اور ۱ ۱ پودے

جو دہرے پیدا کرنے والے ہیں اکہرے ہیں پُرکھے کے مثل بناوٹ رکھتے ہیں۔ پھر جب ایک طبعی مثل اصل پیدا کرنے والا اکہرا (ل ل ل) دہرے پیدا کرنے والے کے زیرے سے بارور کرایا جاتا ہے تو صرف ایک نمونہ کا پودا (ل ل ل) حاصل ہوتا ہے یعنی ایسا اکہرا سادہ مغلوبوں کی شکل میں دہرے خارج کرے گا۔ بہر حال مادہ جانب دہرا پیدا کرنیوالا دو قسم کے زواجے یعنی ل ل اور ل ا پیدا کرتا ہے اور جب اُن کی باروری ایک خالص اکہرے کے زیرے سے کرائی گئی تو دو قسم کے اکہرے پیدا ہوتے ہیں یعنی وہ (ل ل ل ل) جو دہرے سادہ مغلوبوں کی صورت میں اور وہ (ل ل ل ل) جو مثل اکہرے کے پودے اُگاتے ہیں۔ نوں جندی نظریے کے لحاظ سے اس قسم کا انکشاف جاذب ہوگا اور زیرے کے ایک "ہلاکتی" عامل کے تصور کی تصدیق دوسرے پودوں کی شہادت سے ہوتی ہے۔ اس کو تسلیم کرنے میں جو خاص رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ دہرے پیدا کرنے والوں سے تیار کیے ہوئے دہرے اکہروں سے نمایاں طور پر تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کو مس سوئڈرس نے سمجھایا ہے جہاں "ہلاکتی" کو سمجھنے کے لیے دو نمونوں کا مساوی تعداد میں ظاہر ہونا ضروری ہے۔

اس نوع میں جب یہ منظر پہلے معلوم کیا گیا تھا تو اس کے بعد کئی ایسی صورتیں ظاہر ہوئی ہیں جن میں تقابلی فرق ایک خنثی شکل پودے کے نر اور مادہ جانوں کی منتقل کرنے والی قوتوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ ایسی صورتوں کے اس گروہ کے لیے بیٹسن نے اصطلاح ناہم تولید تجویز کی ہے۔ پودے جن میں نر اور مادہ زواجے یکساں طور پر عمل کرتے ہیں سوئی تولیدی ہیں وہ جن میں یہ غیر یکساں ہیں ناہم تولیدی اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک قسم کا "جندی" افتراق اُگتے ہوئے پودے میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے زیروں کو بنانے والی نیچ بیضدانوں سے متعلق نیچ سے مختلف ہو جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں سن کی ایک نہایت

دلچسپ مثال ہے جس کو پہلے سیمپٹن اور مس گیرڈ نے بیان کیا تھا۔ جب ایک ایسے تیلیہ بونے سن کی باروری (جو عادتاً ریٹنگنے والا تھا) ایک لائے ریشی سن کے زیرِ ہستے کرانی گئی تو جب پودے درمیانی اونچائی کے اور مثل دونوں والدین کے خنٹی شکل تھے (شکل ۱۴) اونچائی کے لحاظ سے جب نسل پیچیدہ ثابت ہوئی اور یہ ظاہر ہوا کہ اس میں کئی عوامل کو سرکار ہے۔ بہر حال ایک دوسری صورت میں نمایاں افتراق ظاہر ہوا



شکل (۱۴)

خاکہ جو سن (Linum) میں نربانجھ پن کی وراثت کو ظاہر کرتا ہے

اس لیے کہ ایک چوتھائی پودے اور وہ جو پوری طرح لائے شکل کے تھے نربانجھ (۱۶۳) بانجھ تھے۔ جب ان کو مثل مادوں کے استعمال کیا گیا تو انھوں نے

(۱۶۳)


اصل بونے اور لانے اقسام کے زیروں سے باروری پر ایک نہایت مختلف
نتیجہ ظاہر کیا۔ بونوں کے زیرے کے ساتھ اُنھوں نے تمام خشتی شکل
پیدا کیے لیکن لانبوں کے زیروں کے ساتھ اُن سے سوائے مغلوب
نر بانجھ پودوں کے اور کچھ حاصل نہیں ہوئے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ
لانباسن نام تو لیدی ہے جو مادہ پن اپنے زیرہ اور خشتی شکلیت اپنے
بیضدانوں کے ذریعہ منتقل کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب خود باروری کرائی گئی
تو یہ صرف خشتی شکل ہی پیدا کرتا ہے۔ حال ہی میں آر۔ جے چسٹنٹن
اور مس پلینو نے اس کے لیے ایسے غلیہ مایہ کے لحاظ سے جو مادہ
پُرکھے سے حاصل ہوا تھا ایک بالکل مختلف ہی بیان دیا ہے جو چند
صورتوں میں لائنٹریا یا پرستھولڈ شمٹ کے خیالات کے مماثل ہے۔
(ملاحظہ ہو صفحہ ۱۲۰) وہ فرض کرتے ہیں کہ ایک نر بانجھ اُس وقت ہی پیدا
ہوتا ہے جب کہ بونا غلیہ مایہ رکھنے والا ایک پودا عوازل سے ایک ایسے
(ل) کے لیے ہم جفتی ہے جو لانی عادت کی جانب لے جاتا ہے۔ اس طرح
جب میں ایسے نر بانجھوں کے نمودار ہونے کی وجہ معلوم ہوتی ہے جو
بونے x لانے کے لاپ سے حاصل ہوئے ہیں جب کہ بونے کو
بطور مادہ استعمال کیا گیا ہے (دیکھو شکل ۴۲) اور ساتھ ہی ساتھ جوابی
باروری سے نر بانجھوں کے نمودار نہ ہونے کی وجہ بھی معلوم ہوتی ہے۔
اس لیے کہ بعد کی صورت میں جب لانے کو بطور مادہ پودا استعمال کیا گیا تو
غلیہ مایہ صرف مادری جانب ہی منتقل ہو گا اور پوری طرح وہ ہو گا جو
لانے پرکھے سے حاصل ہوا۔ یہ تجویز بونے اور لانے کے زیروں کے
مختلف طرز عمل کو بھی سمجھاتی ہے جبکہ وہ نر بانجھ کو بارور کرنے کے لیے
استعمال کیے گئے۔ حالانکہ ہر صورت میں تیار ہونے والے جفتے کے اندر
ایسا غلیہ مایہ رہتا ہے جو اصل بونے پرکھے سے مادری جانب ہی منتقل
ہوا ہے پھر بھی ایک صورت میں وہ ل کے لیے دگر جفتی اور خشتی شکل
برخلاف اس کے دوسری میں وہ ل کے لیے ہم جفتی اور اس لیے

ایک بانجھ نر ہوگا (دیکھو شکل ۴۴)۔

خلیہ مایہ کے اثر کا تخیل بارور زردالوں کے نمو پر دوسری ایسی صورتوں کو سمجھانے میں مدد دینگا جہاں پر کہ اب تک کوئی قابل اطمینان بیان ان کے سمجھانے کے لیے موجود نہیں ہے۔ عام سیوری (سیٹورا یا ہورٹینس)

(*Satureia hortensis*) دو اشکال میں ملتا ہے جن میں سے ایک خنثی شکل اور دوسری مادہ ہے۔ کئی سال گزرے کہ کورینٹس نے یہ ظاہر کیا کہ خنثی شکل خنثی شکل پیدا کرتا ہے اور مادہ جس کی باروری دراصل

(۱۶۴)



شکل (۴۴)

خاکہ جو کہ سن میں نر بانجھ پن کی مادری وراثت کو ظاہر کرتا ہے اس مفروضہ پر کہ بونے کا خلیہ مایہ (ل) زردالوں پر بمقابلہ نر کے خلیہ مایہ (ل) کے مختلف اثر ڈالتا ہے۔ بونا ظاہر ہے گہرا ہے اور لانا خلیہ مایہ سا وہ چھوڑ دیا گیا ہے مزید تشریح کے لیے متن دیکھا جائے۔

ایک خفشی شکل کے زیرے سے ہونا ضروری ہے تب مادہ میں حاصل ہونگی۔
 اس نتیجے کو آسانی کے ساتھ سمجھا یا جاسکتا ہے اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ دونوں
 اقسام کا خلیہ مایہ اس لحاظ سے اختلاف رکھتا ہے کہ ایک میں زروان
 اپنے پورے تن کو پہنچتے ہیں لیکن دوسری میں ایسا نہیں ہوتا۔
 یہ کہ خلیہ مایہ کو تناسلیاتی کام میں بھی دخل ہے وہ ذیل کی مثال سے
 بھی ظاہر ہوتا ہے کسی کام کے دوران میں جھلکے دار اینٹریٹیمس کی دو انواع جدا
 کی گئیں جن میں ایک زیادہ لانی اور ایک زیادہ بونی تھی (شکل ۴۳) جو دوسری



شکل (۴۳)

یہاں حالات میں انٹریٹیم (Antirrhinum) سے حاصل کیے ہوئے پودے بونے
 (بائیں جانب) اور اونچے (دائیں جانب)۔ یہ ایک نوٹ سے لیکر چھاپے گئے ہیں جو پھول
 نکلنے سے کچھ قبل لیا گیا تھا۔

۴۔ کوہیلینس بیان کرتا ہے کہ اس نے چند مستثنیات معلوم کیں۔ چند سال قبل میں نے ان تجربوں کو اس
 امید میں دہرایا کہ شاید چند اور مستثنیات جانچ کے لیے مل جائیں۔ لیکن حالانکہ میں نے کئی ہزار پودوں کی بارور
 اور افزائش کی مجھے اس قاعدہ سے استثناء حاصل نہیں ہوا۔

خصوصیات میں بھی اختلاف رکھتی تھیں۔ زیادہ بونے پودے میں پتیاں دیگر
کچھ زیادہ گہری سبز رنگ کی، پھول کچھ زیادہ شوخ اور ان کے اوپر کے
رنگین پھلکے متحد اور زیادہ نمایاں ہیں۔ جوابی باروری سے ظاہر ہوا کہ ان
سیرتوں کی وراثت خالص ماوری تھی۔ زیادہ بونے پودے کی باروری
لانے پودے کے زیرے سے کرانے میں جب میں صرف بونے پودے ہی
حاصل ہوئے اور پھر جب میں بونے پودوں کے مثل ہی اپنی افزائش
کی حالانکہ رنگین عوازل (سرخ گلابی، سفید و غیرہ کے لیے) کے لحاظ سے
انھوں نے حسب معمول افتراق کیا۔ اسی طرح جب کہ لانا بطور ماں کے
استعمال کیا گیا تو بعد کی نسلوں نے خود باروری پر لابی سیرتوں کے
لحاظ سے ہی اپنی افزائش کی۔ ایسے نتائج پر زور طریقہ پر خلیہ مایہ کے
اثر کی جانب اشارہ کرتے ہیں یہ ایک ایسا موضوع ہے جس سے اس
کام کے جوش میں غفلت برتنی گئی ہے جو لون جندی نظریے کی اشاعت
کے بعد ظاہر کیا گیا۔

(۱۶۶)

تیسری مثال کے طور پر جس میں ایک غیر معمولی پیچیدگی پائی جاتی
ہے خود نیلڈل کے وہ تجربے ہیں جو اسے نرسل (Hieracium) پر
پرکام کرتے وقت ہوئے۔ پودوں کی یہ جنس ایسی اشکال کی کثرت ظاہر کرتی
ہے جو ایک دوسرے سے بعض اوقات ایک مفرد اور کبھی کئی سیرتوں میں
اختلاف رکھتی ہیں۔ یہ امور کہ کس طرح ان متعدد اشکال کی درجہ بندی
کر کے جداگانہ انواع کس طرح بنائی جائیں اور کس حد تک اقسام اور
کس حد تک ان کو اتفاقی دو غلیت کا حاصل تصور کیا جائے اس وقت بھی
نباتیات دانوں کے مابین بہت زیادہ اختلاف رائے کا باعث تھے۔
اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نیلڈل نے نرسلوں پر اپنے تجربات اسکاٹی
سیرتوں کو حل کرنے کی توقع سے کیے تھے جن کو اس نے میٹھے مٹریں نہایت
خوبی کیسا تھو دکھایا اور ان سے نرسلوں میں اشکال کی بہتات کا پتہ چلتا
ہے۔ اپنے نہایت چھوٹے پھولوں کی وجہ سے یہ پودے پار باروری کے راستے میں

بہت زیادہ فنی مشکلات ظاہر کرتے ہیں۔ بہر حال نہایت استقلال اور مشقت سے مختلف اشکال کے درمیان مینڈل چند ملاپ کرانے اور ان سے پودے حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ ان دو غلوں کو بڑھایا گیا اور بعد میں ان سے نسل حاصل کی گئی اور اس میں شک نہیں کہ ان میں سے ہر ایک نے مثل اصل کے اپنی افزائش نسل کی جو مینڈل کی ایک حد تک مایوسی کا باعث تھا۔ ان سیرتوں کا افتراق پورے طور پر غائب تھا جن کی موجودگی اُس نے مٹر اور سیم میں ظاہر کی تھی اور ہڈولیشیم میں ان کے پائے جائے گا اُسے کچھ یقین تھا۔ تیس برس سے زیادہ گزرنے کے بعد یہ معاملہ صاف ہوا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ دو غلہ ہیریشیم کا عجیب طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے بیج عموماً اچھوت پیدائش کے عجیب عمل کے ذریعے پیدا کرتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ایک بند پھول کو لے کر اُس سے اس کے نر اعضا کو تراش دیا جائے اور ساتھ ہی ان کلیوں کو بھی جن کے ذریعے زیرہ بیضدانوں تک پہنچتا ہے۔ پھر بھی پھول مکمل اور اچھے بیج پیدا کرتا ہے لیکن خلیے جن سے بیج پیدا ہوتے ہیں اسی نوعیت کے نہیں ہیں جیسے کہ ایک پودے کے بیضے۔ وہ زاوچے نہیں ہیں بلکہ ماوری خلیوں کی دوسری ساخت کو برقرار رکھتے ہیں۔ ان کو کچھ کچھ کلیوں کی قسم کا خیال کیا جاتا ہے جو ابتدا ہی میں پُرکھا پودے سے علیحدہ ہو کر جداگانہ زندگی بسر کرتیں اور مثل کلیوں کے وہ ماوری خصوصیات پیدا کرتی ہیں۔ اس مثال کی اصل نوعیت کا انکشاف اسی وقت ممکن ہوا جب کہ خلویات کے علم کو ترقی ہوئی اور مینڈل اپنی مدت تک زندہ نہ رہ سکا کہ وہ یہ سمجھ سکتا کہ اس کے دو غلے ہیریشیم کیوں مثل اصل کے اپنی افزائش نسل کرتے رہے۔

پندرھواں باب

درمیانی صورتیں

(۶۰)

اب تک ہم جہاں تک پہنچے ہیں ہم نے معلوم کیا کہ جانوروں اور پودوں کی مختلف سہرتوں کو ان معین عوامل کے لحاظ سے بیان کر سکتے ہیں جو زواجوں کے ذریعہ منتقل ہوتے ہیں اور ان کی تقسیم ایک معین نظام کے ذریعہ ہوتی ہے۔ ان عوامل کی نوعیت کچھ بھی ہو تجزیہ کے مقصد کے لیے ان کو ایسی غیر منقسم و حدیں خیال کر سکتے ہیں جو کسی ایک خاص زواج میں موجود ہو سکتی یا نہیں پائی جاتیں۔ جب عامل موجود ہو تو وہ مکمل طور پر پایا جائے گا۔ نمایاں خصوصیات جو ایک جفتہ اپنے دور ان نمونہ میں پیدا کرتی ہے ان کا انحصار ایسے عوامل کی نوعیت اور قسم پر ہے جو اس کے تیار کرنے والے دونوں زواجوں کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں اور کچھ کم حد تک اس کا انحصار اس پر بھی ہے کہ ہر عامل دونوں زواجوں

۱۔ اس نقطہ نظر سے استحکام کی ثانوی حالتیں جو ایک ایسے ابتدائی عامل کی کسرت سے حاصل ہوتی ہیں جہاں کثیر متبادل شکلیت سے سابقہ پڑتا ہے ان کو مکمل عوامل خیال کر سکتے ہیں۔

تختی



۱- ریشمی مرغ - ۲- مرغی جو ریشمی مرغی x خاکی لیگھارن مرغ سے حاصل ہوئی
۳- مرغ جو ریشمی مرغی x خاکی لیگھارن مرغ سے حاصل ہوا۔

کے ذریعہ آیا تھا یا صرف ایک ہی کے ذریعہ۔ اگر زیر غور عامل صرف ایک ہی زواجہ کے ذریعہ آیا ہے تو تیار ہونے والا دیگر جفتہ کم و بیش درمیانی صورت یا ایسی ہم جفتی شکل ہوگا جس میں دہرا اثر عامل کا ہے اور یہ ایسی ہم جفتی شکل ہے جس میں یہ عامل بالکل ہی موجود نہیں۔ ایسی صورتیں وہ ہیں جو پریمولا پھولوں اور اندسی مرغیوں میں ملی ہیں۔ کچھ بھی ہو یہ درمیانی صورتیں صرف خالص زواجہ ہی تیار کرتی ہیں جیسا کہ اس امر سے ظاہر ہے کہ خالص آبائی نمونے اپنی اولاد کے ایک مخصوص تناسب میں نمودار ہوتے ہیں۔ ایسی صورتوں میں جیسی کہ یہ ہیں درمیانی صورت کا صرف ایک ہی نمونہ موجود ہے اور سادہ تناسب جس میں یہ اور دونوں ہم جفتی شکلیں نمودار ہوتی ہیں اس اظہار کو اور بھی نمایاں کر دیتا ہے۔ لیکن جب نسل کی نوعیت بہت زیادہ پیچیدہ ہو سکتی ہے اور جہاں ہم ایسے عوامل سے واسطہ رکھتے ہیں جو ایک دوسرے پر تفاعل کرتے ہیں تو یہ ایسی درمیانی صورتوں کے ایک سلسلے کی موجودگی کو ظاہر کر سکتے ہیں جو ان میں سے ایک اصل پرکھے میں پائی جانے والی حالت سے بتدریج دوسرے پرکھے میں پائی جانے والی حالت تک موجود ہے۔ مثال کے طور پر ہم بھورے لینگھارن اور ریشمیں مرغیوں کے ملاپ پر غور کر سکتے ہیں۔ مرغیوں کی ریشمین نسل کی دوسری خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں سیاہ لون کی کثرت ہوتی ہے۔ جلد بھدی سیاہ اور کھنی اور نیچے لٹکا ہوا گوشہ گہرے ارغوانی رنگ کے ہوتے ہیں جو اس کے سفید پروں کے بالکل متضاد ہے (تختی یا فوٹو ۳۷)۔ تقطیع سے معلوم ہوتا ہے کہ سیاہ لون تمام جسم میں بہت زیادہ پھیلا رہتا ہے جو خصوصاً ایسی جھلیوں مثلاً ماساریقہ گرد استخوان اور دماغ کو ڈھکنے والی ام جافیہ میں زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ یہ عضلات کی درمیانی اتصالی بافت میں بھی پایا جاتا ہے۔ بھورے لینگھارن میں برخلاف اس کے لون نہیں پایا جاتا۔ ایک ریشمی مرغی اور بھورے لینگھارن کے ملاپ کے چوزے دونوں صنفوں کے ایسے پرند ہوں گے جن میں کچھ نہ کچھ

(۱۷۰) نشان ریشمی لونیت کا موجود ہو گا لیکن جب ایسے پرندوں کی باہمی باروری کرائی جاتی ہے تو وہ چوزوں کی ایک نسل پیدا کرتے ہیں جن میں گہرے لوندار چوزے اصل ریشمی مرغی کی طرح بھورے لیکھارن کی طرح، بے لون چوزے اور ایسے چوزے پائے جاتے ہیں جن کے اندر لونیت مختلف درمیانی مدارج میں ملتی ہے۔ درحقیقت اس طرح حاصل کیے ہوئے سوچوزوں میں سے یہ ممکن ہے کہ ایسے چنے جاسکیں جنہیں تقریباً ایک تدریجی سلسلہ میں لونیت کے لحاظ سے رکھا جاسکتا ہے جس کے ایک سرے پر بالکل بے لون اور نہایت لوندار دوسرے سرے پر پایا جائے۔ پھر بھی یہ ایسی صورت ہے جس میں مختلف عوامل کا مکمل افتراق عمل میں

ف ل ر	ف ل ر	ف ل ر	ف ل ر
ف ل ر	ف ل ر	ف ل ر	ف ل ر
♀	♀	♀	♀
ف ل ر	ف ل ر	ف ل ر	ف ل ر
ف ل ر	ف ل ر	ف ل ر	ف ل ر
♀	♀	♀	♀
ف ل ر	ف ل ر	ف ل ر	ف ل ر
ف ل ر	ف ل ر	ف ل ر	ف ل ر
♂	♂	♂	♂
ف ل ر	ف ل ر	ف ل ر	ف ل ر
ف ل ر	ف ل ر	ف ل ر	ف ل ر
♂	♂	♂	♂

شکل (۱۶۱)

خاکہ جو ایسی جہ نسلوں کی بنیاد اور لونیت کو طاسا ہر کرتا ہے جو ریشمی مرغی اور بھورے لیکھارن مرغی کے ملاپ سے حاصل ہوئی ہیں۔

آہستہ ہے۔ بتجزیہ سے ظاہر ہوا ہے کہ ایک عامل لونیت (۱) کے لیے اور

دوسرا (د) لون کے نوکوروکنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب ۵ کی بناوٹ ف ف ل ل س ر ہے اور ایسا پرند مساوی تعداد میں چار طرح کے زواجے ف ل س ر۔ ف ل ر۔ ف ل ر۔ ف ل ر پیدا کرے گا۔ جب ۶ کی بناوٹ اس مثال میں ف ف ل ل س ر ہے۔ ف اور س کے درمیان رد عمل یا دفع کی وجہ سے وہ چار قسم کے زواجے ف ل ر۔ ف ل س ر۔ ف ل س ر۔ ف ل س ر بناتی ہے۔ زواجوں کے ایسے دو سلسلوں کو یکجا کرنے کا نتیجہ شکل ۴۴ میں دکھایا گیا ہے۔ سولہ نمونوں کے تیار شدہ جفتوں میں سے ایک (ف ف ل ل ر ر) لونیتی عامل کے لیے ہم جفتی ہے اور اس کے اندر رنگ کوروکنے والا (۱۴۱) عامل نہیں پایا جاتا۔ ایسا پرند اتنا ہی گہرا لوندار ہوگا جتنا کہ خالص ریشمی پھر دونوں میں سہ کی عدم موجودگی میں ل کا اکہرا میلان پایا جاتا ہے۔ یہ خالص ریشمی کی طرح تقریباً تاریک ہوتے ہیں۔ چار جفتوں میں ل موجود نہیں ہے حالانکہ ان کے اندر سہ موجود ہو سکتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ ایسے پرندوں میں مثل بھورے لنگھارن کی طرح لون بالکل ہی نہیں پایا جاتا۔ بقیہ نو جفتے دونوں عوامل ل اور س کے مختلف متفات ظاہر کرتے ہیں جو ل ل س ر۔ ل ل س ر۔ ل ل س ر یا ل ل س ر میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے اور ان میں سے ہر ایک صورت میں لون زیادہ یا کم تیز ہوتا ہے جو پرند کی بناوٹ سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس طرح ل ل س ر بناوٹ کا پرند لونیت کے لحاظ سے ل ل ر ر بناوٹ رکھنے والے پرند کے قریب پہنچ جاتا ہے بر خلاف ان کے جس کی بناوٹ ل ل س ر ہو اس میں بے لون پرند سے کچھ ہی زیادہ لون موجود ہوگا۔ اس طرح ہم لونیت کے سات نمایاں درجے دیکھتے ہیں اور یہ سلسلہ اس بات سے اور بھی زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ مختلف درجے کچھ مختلف مقدار لونیت کو ظاہر کرتے ہیں اور یہ اس لحاظ سے بھی اختلاف رکھتے ہیں کہ جانور نر ہے یا مادہ۔ اس لیے کہ عموماً کسی ایک خاص درجہ کی مادہ اسی درجہ کے نر کے مقابلے میں زیادہ لون رکھتی ہے

اس طریقہ سے پیدا کیے ہوئے پرندوں کی ایک تعداد کا امتحان کرنے پر یہ ظاہر ہوا کہ اس صورت میں ہم ایک ایسے عامل سے بحث کر رہے ہیں جو ٹوٹ سکتے اور دونوں انتہائی قسم کے پرندوں کے درمیان بین تدریجی نمونوں کے مسلسل سلسلہ کو بنا سکتے ہیں۔ بڑی تعداد پر مسلسل کام کرنے سے مختلف درجوں میں سے زیادہ کو تمیز کرنا ممکن ہو سکیگا حالانکہ اس میں بھی غلطیاں کرنا ممکن ہے۔ پھر بھی جیسا کہ نسلیاتی امتحانات نے کافی طور پر ظاہر کیا ہے کہ یہاں ہم دو ایسے تفاعلی عوامل سے واسطہ رکھتے ہیں جو بالکل صحیح طور پر مینڈلی اصول کے مطابق ایک دوسرے سے کامل طور پر افتراق کرتے ہیں۔ تخیز میں تسلسل جو جب تسلسل میں ظاہر ہوا اس امر پر مبنی ہے کہ یہ دونوں عوامل ایک دوسرے پر تفاعل کرتے ہیں اور مختلف درجوں تک اس لحاظ سے کہ جفتہ ان میں سے ایک یا دوسرے یا دونوں کے لیے ہم جفتی یا دگر جفتی حالت میں ہے۔ علاوہ انہیں ان میں سے چند درمیانی صورتیں لونیت کی ایک درمیانی حالت کے لحاظ سے مثل اصل اپنی انفرایش کریں گی۔ ایک نر کو جس کی بناوٹ ف ف ل ل نر ہوا جب ف ف ل ل نر بناوٹ کی مادوں سے باروری کرے گا تو خود اس کی وضع کے نر اور مادری پرکھے کے مثل مادائیں پیدا ہوں گی۔

ایک اور بہتر مثال درمیانی صورتوں کے سلسلہ کے تجزیہ کی ولندیزی خسر گوش کے ذریعہ فراہم ہوئی جس کا حوالہ پیچھے دیا جا چکا ہے۔ ولندیزی خسر گوش اس لحاظ سے مشہور ہیں کہ ان کو مثل اس اصل نمونے کے پیدا کرنا مشکل ہے جس کو شوقین چاہتے ہیں اور جیسا کہ تختی I شکل ۱ سے ظاہر ہے۔ اس لیے کہ سفیدی کی مقدار قابل حیرت درجہ تک متغیر ہوتی ہے۔ ایسے خسر گوش جو شکل میں ہمیشگی ولندیزی ہوں آپس میں بارور کرانے کے بعد ایسے جانوروں کا اخراج کرتے ہیں جو ذاتی رنگ سے زیادہ ہٹے ہوئے نہیں ہوتے اور دوسرے ایسے بھی پیدا ہوتے ہیں



جو تقریباً سفید ہوتے ہیں۔ ان دونوں میں انتہائی درجوں کے درمیان ہر ممکنہ درجہ پایا جاسکتا ہے۔ اس سلسلہ کے دونوں انتہائی جانور شل اصل کے بچے پیدا کر سکتے ہیں۔ جب ان کا باہمی ملاپ کرایا جائے تو وہ جب میں درمیانی جانور پیدا کرتے ہیں اور جب میں اشکال کا ایک مکمل سلسلہ تیار کرتے ہیں جو ایک انتہا سے دوسرے تک پایا جاتا ہے۔ پھر بھی تجربات کے ایک لائن سلسلہ نے ظاہر کیا ہے کہ اس صورت کو صرف ایسے چند عوامل کے حوالہ سے بیان کیا جاسکتا ہے جو معمولی میڈلی طریقہ پر منتقل ہوتے ہیں۔ اس بیان کی نوعیت فوراً شکل ۴۵ کے حوالہ سے سمجھ میں آجائے گی۔

دو عوامل میں اور ت موجود ہیں جو تقریباً یکساں طور پر عمل کرتے ہیں اور ہر صورت میں لونیت کی مقدار میں زیادتی کا باعث ہوتے ہیں۔ سفید ترین ولندیزی خرگوش (شکل ۱ الف) میں یہ دونوں عوامل موجود نہیں ہوتے اور اس لحاظ سے کہ ایک یا دونوں ایک وگر جفتی یا ہم جفتی حالت میں موجود ہوں تو درجہ وار نمونوں کا سلسلہ پیدا ہو جاتا ہے جیسا کہ سب سے اوپر شکل ۴۵ (الف تا ۵ الف) میں دکھایا گیا ہے۔ جب جانور میں اور ت دونوں کے لئے ہم جفتی ہو تو وہ ایک نمونہ شوقین کے تمثیلی ولندیزی خرگوش (۵ الف) کی مانند ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایسے ہی ایک سلسلہ کی خصوصیت ہے کہ شبکیہ کا طبعی پورا بھورا حصہ کبھی نیلے دہبے (ہیڈروکرومیا اسرایڈس Heterochromia iridis) بھورے لون کے جزوی طور پر عدم موجود ہونے کی وجہ سے ظاہر کرتا ہے۔ اور دراصل خصوصاً ادنیٰ تر درجوں میں ایسا اکثر ہوتا ہے کہ بھورالون بالکل نہیں پایا جاتا اور اس طرح آنکھ ہلکی نیلی نظر آتی ہے۔ علاوہ دونوں عوامل میں اور ت کے ہیں ایک تیسرے عامل کی موجودگی کو بھی فرض کرنا چاہیے جو عمل کر کے لونیت کے درجہ کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے اور یہ عمل

(۱۶۳)

ولندیزی خرگوشوں میں لونیت کی وراثت کے مدارج ظاہر کیے گئے ہیں تفصیل کے لیے بیان کو پڑھو۔

شکل ۴۵



بمقابلہ ہم جفتی کے وگرنہ جفتی حالت میں زیادہ نمایاں حد تک پایا جاتا ہے۔
 ل کے ایک ہی اثر کے شامل ہونے سے ا الف تا ہ الف ایک ایسا
 سلسلہ تیار ہو جاتا ہے جو اشکال ا ب تا ہ ب میں دکھایا گیا ہے۔
 اور دوسرے اثر کے شامل ہونے سے وہ سلسلہ حاصل ہوتا ہے جو اشکال ا ج تا ہ ج
 سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ اُن خرگوشوں کی خصوصیت ہے جن میں ل
 موجود ہوتا ہے اور وہ آنکھوں میں کوئی اثر نیلے رنگ کا ظاہر نہیں
 کرتے اس لیے وہ ہمیشہ پوری طرح بھوری رہتی ہیں۔ ایک دلچسپ بات
 یہ ہے کہ یکساں درجہ کی لونیت والے خرگوش تناسلیاتی بناوٹ میں
 پھر بھی بالکل مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ہ الف ظاہرہ شکل میں ا ب سے
 مشابہ ہے پھر بھی پہلے خرگوش میں تناسلیاتی بناوٹ ل ل س س س ق ت
 اور بعد والے میں ل ل س س س ت ت ہے۔ حالانکہ دونوں
 دیکھنے میں تمثیلی و لندیزی خرگوش (دیکھو شکل ۱۶۷) معلوم ہوتے ہیں
 لیکن سفید ترین خرگوش (ا الف) سے باروری کرانے پر بالکل
 ہی مختلف نتائج پیش کرتے ہیں پہلی صورت ایک یکساں نسل پیدا
 کرتی ہے جو نمونے کے لحاظ سے ۳ الف سے مشابہ ہوتے ہیں۔ برخلاف
 اس کے دوسری صورت مساوی تعداد ہر ایک پر کھے یعنی الف اور ا ب
 سے مشابہ پیدا کرتی ہے جن میں کوئی درمیانی درجہ نہیں پایا جاتا۔
 یہ بات کہ تمثیلی و لندیزی شکل کے جانور تناسلیاتی بناوٹ کے لحاظ
 سے اتنے مختلف ہو سکتے ہیں بلاشبہ اُن ”ناقص“ جانوروں کی پیدائش
 کو سمجھاتا ہے جو اکثر شوقین لوگ اپنے جانوروں کے جھول میں پاتے ہیں
 ہم ان دونوں صورتوں پر کافی تفصیل کے ساتھ بحث کر چکے
 ہیں اس لیے کہ ایسے خاندانوں کی موجودگی جو دوسروں کے درمیان
 ایک سلسلہ درمیانی درجوں کا ظاہر کرتے ہیں بعض اوقات اس نقطہ خیال
 کے خلاف لائے گئے ہیں کہ عضویوں کی سیرتوں کا انحصار ایسے خاص عوامل پر
 ہے جو مینڈلی اصول کے مطابق منتقل ہوتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ خرگوش اور

مرغیاں صاف طور پر ظاہر کرتے ہیں نہ تو ایسے درمیانی جانوروں کے ایک مسلسل سلسلہ کی موجودگی اور نہ یہ بات کہ ان میں سے چند درمیانی



شکل ۴۶

دو تیشلی و لندیزی خرگوش جن میں سے بالائی کا تعلق ایک مثل اصل افزائش کرنیوالی نسل سے ہے (شکل ۴۵، الف) اور زیرین سفید و لندیزی (شکل ۴۵، اے) اور ایک زیادہ بلند درجہ کی لونیت رکھنے والے خرگوش کی درمیانی دیگر خفی شکل ہے۔ (شکل ۴۵، ج)

حالت کے مثل اصل اپنی افزائش کرتے ہیں افراق کے بنیڈلی اصول کے


متضاد ہے۔

درمیان صورتوں کے سلسلہ میں ایک زیادہ قابل قبول اعتراض
مبطلی نقطہ خیال کے لیے ایسی دو معین اقسام کے مابین پہلے ملاپ کی مثال
ہے جو بعد میں مثل اصل افزائش کرتی ہیں۔ مثال جو قدرتاں اس کتاب
کے پڑھنے والے کے سامنے آئے گی وہ ملیٹو کی ہے جو حبشی اور سفید
صنفوں کے ملاپ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ عام خیال کے مطابق یہ ملیٹو جو درمیان
لونیت کے ہوتے ہیں بعد میں ملیٹو ہی پیدا کرتے ہیں لیکن جب اس
اصل کو معلوم کرنے کی جستجو کی جاتی ہے جس پر یہ عام خیال مبنی ہے تو یہ
معلوم ہوگا کہ یہ تقریباً ہمیشہ مشتبہ اور مبہم ہے۔ چند سال گزرے کہ
زیادہ اصحح معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیوینورٹ نے
مالک متحدہ امریکہ میں کوشش کی تھی۔ کئی خاندانوں پر کام کرنے کے بعد وہ
اس نتیجہ پر پہنچا کہ مخصوص مبطلی افتراق پایا جاتا ہے۔ اس کے مطابق
نتائج کو دو عوائل کے لحاظ سے بیان کیا جاسکتا ہے جو ۱ اور ۲
ہیں جن میں سے کوئی بھی موجود ہونے کی صورت میں جلد کی مخصوص
لونیت پیدا کرتا ہے۔ دونوں عوائل مجموعی طور پر بمقابلہ ایک کے
پیدا شدہ رنگ کے گہرا اثر ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ
ریشمی مرغی میں ہوتا ہے ایک عامل کا پیدا کیا ہوا اثر ہم حقیقی میں بمقابلہ
دگر حقیقی حالت کے زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ کیا ان نتائج کی توثیق
آئندہ مزید تحقیقات کے ذریعہ ہوگی وہ خود زمانہ بتا دے گا۔ بہر حال
یہ صاف ظاہر ہے کہ نہایت صحیح معلومات جو فی الوقت ہمارے پاس ہیں
وہ اس تصور کی تائید میں ہیں کہ ملیٹو کی نہایت زیر بحث صورت میں
بھی مبطلی افتراق پایا جاتا ہے۔

ڈیوینورٹ کے بیان میں دو جدا گانہ عوائل کا تصور ہے جن میں
سے ہر ایک بطور خود یکساں اثر پیدا کرنے کے لیے کافی ہے اور یہ اثر
اس وقت زیادہ تیز ہو جاتا ہے جبکہ دونوں ایک دم کام کرتے ہیں ایسے

کے لحاظ سے سرخ پودوں کی درجہ بندی رنگ کی بنا پر کی جاسکے۔
 ہر حال نلین اہلی کے کام نے اضافی عوائل کے تختل کو ایک
 مضبوط اساس پر قایم کر دیا اور اس زمانے کے بعد اس کا استعمال ایسی
 صورتوں کو سمجھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے جہاں ایک ملاپ سے
 درمیانی صورتوں کا ایک لانا سلسلہ حاصل ہوتا ہے۔ خصوصاً ایسی صورتوں
 میں اس کا استعمال بہت ہے جہاں تعینی خصوصیات مثلاً جسامت اور
 وزن زیر بحث ہوں۔ ایک لانبے اور ایک بوٹے کے مابین ملاپ اکثر
 جیسا کہ کیو پڈ میٹھے مٹریں ہوتا ہے لانبی شکل کی پوری طرح غالب حالت
 میں ظاہر ہوتا ہے اور اس کے بعد ۳:۱ تناسب لانبے اور بوٹوں کے
 مابین جب میں ملتا ہے۔ لیکن یہ اکثر ہوتا ہے کہ جب درمیانی
 رہتا ہے اور یہ کہ جب میں ایک مسلسل سلسلہ اشکال کا اصل بوٹے
 اور لانبے والدین کے درمیان تدریجی طور پر پایا جاتا ہے۔ اس کو
 سمجھانے کے لیے ہم مرغیوں سے ایک مثال لے سکتے ہیں جہاں ایک
 سیبر اسٹ بنیٹم اور ایک سنہری ہیمبورگ میں ملاپ کرایا گیا۔ ہیمبورگ
 عموماً ہمیشہ پہلی نسل کے مقابلے میں وزن میں دوگنی تھی۔ جب پرند
 جسامت میں درمیانی تھے (دیکھو شکل ۱۴۹) حالانکہ اس لحاظ سے وہ
 ہیمبورگ سے زیادہ قریبی مطابقت رکھتے تھے۔ جب پرندوں سے
 حاصل کی ہوئی جب نسل نے تیز رفتاری بہت زیادہ ظاہر کیے جن کے ایک سرے پر
 ہیمبورگ سے زیادہ وزنی پرند تھے اور دوسرے سرے پر سیبر اسٹ سے زیادہ ہلکے
 پرند۔ نتائج جو حاصل ہوئے وہ اس بنا پر سمجھائے جاسکتے ہیں کہ یہاں چار (۱۴۹)
 جدا گانہ عوائل سے واسطہ ہے جن میں سے ہر ایک موجود ہونے کی صورت
 میں نمایاں طور پر وزن بڑھانے کا باعث ہوتا ہے۔ یہ بھی فرض کر لینا
 چاہیے کہ ایک عامل زیادہ اثر ہم جفتی حالت میں بمقابلہ دیگر جفتی حالت کے
 پیدا کرتا ہے۔ جب میں اصل سلفی پرندوں سے زیادہ چھوٹے اور بڑے
 پرندوں کی موجودگی کے لیے ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ ہیمبورگ میں ان

چاروں میں سے تین جسامتی عوامل موجود تھے اور یہ کہ سیراٹ میں بقیہ ایک تھا۔ افتراق اور اس کے بعد دوبارہ اجتماع جب میں ایسے چند پرندوں کی پیدائش کا باعث ہوگا جن میں یہ کل چاروں عوامل موجود ہوں گے (۱۸۰)



شکل ۷۷

سیراٹ اور ہیمبورگ کے ملاپ سے جب ازرب نسلوں میں وزن کی تقسیم کو ظاہر کرنے کے لیے تربیم ہر سیاہ نقطہ ایک فرد کو ظاہر کرتا ہے اور گراموں میں اپنے وزن کے لحاظ سے رکھا گیا ہے۔ جب میں صرف نروں کے وزن دیے گئے ہیں۔ مادہ پڑکھوں کو دیے ہوئے وزن ان کے اصل وزن کے ۱/۲ ہیں۔ ان کو اس طریقہ پر وزن دار کیا گیا ہے اس لیے کہ ایک طبعی مرغی کا وزن ان اقسام میں اوسطاً ۱/۲ داں وزن ایک اسی نسل کے مرغی کے مقابلے میں ہے۔

یعنی ایسے پرند جو ہیمبورگ پر کھے سے زیادہ بڑے ہوں گے۔ ان کے علاوہ دوسرے پرند ایسے ہوں گے جن میں ان چاروں عوامل میں سے کوئی بھی موجود

نہ ہوگا یعنی وہ پرند جو سیراٹ بنیم سے چھوٹے ہوں گے یہ بھی بتا دینا ضروری ہے کہ یہ چھوٹے پرند جب آپس میں ملائے جاتے ہیں تو مثل اپنے چھوٹے بچے ہی پیدا کرتے ہیں اور دراصل جیسی کہ اس نظریہ پر ان سے توقع کی جائے گی۔

ب میں اصل چھوٹے اور بڑے والدین سے چھوٹے اور بڑے دونوں قسم کے پرندوں کا نمودار ہونا ایک نہایت دلچسپ بات کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ اگر ہم چاروں جسامتی عوائل کو ۱۔ ج۔ ج۔ اور ۲۔ سے ظاہر کریں تو یہ صاف ہے کہ متعدد درمیانی اشکال میں سے چند مثلاً ۱۱۔ ج۔ ج۔ ۱۲۔ اور ۱۳۔ ج۔ ج۔ ج۔ ج۔ کو مثل اصل کے افزائش کرنی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ باہمی باروری پر ج۔ میں ہر دو والدین کے مقابلہ میں زیادہ بڑے پرند پیدا کرنے چاہئیں۔ ج۔ میں دوبارہ اجتماع سے حاصل شدہ پرندوں میں چند چاروں عوائل کے لیے ہم جفتی ہوں گے۔ یا یوں کہا جاسکتا ہے کہ یکساں جسامت کے پرندوں سے ہم ایسی نسل حاصل کرنے کے قابل ہوں جو زیادہ بڑی جسامت کے لحاظ سے اپنی اصل افزائش کریں گی۔ ایسے منظر کا باعث غالباً زیادہ تر لوگ ملاپ کے مفید اثرات کو قرار دیں گے جس کی وجہ سے بچہ میں زیادہ قوت آجاتی ہے۔ لیکن خواہ یہ درست ہو یا نہ ہو ہمیں اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ پوری طرح یا کچھ کچھ اضغافی عوائل کے دوبارہ اجتماع کی وجہ سے ہوتا ہے جو اسی طور پر ہوگا جیسا کہ سیراٹ اور نیمبورگ کے تجربات سے ظاہر ہوتا ہے۔ کوئی ایسا ہی عمل اکثر اوقات پھول کی نہایت بڑی جسامت کا باعث ہوتا ہے جس کی مثالیں موجودہ باغبانی کی کتابوں میں بکثرت موجود ہیں۔ جسامت کی یہ زیادتی اکثر یکا یک تبدیلی یا ناگہانی تبدیلی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ بتانے کے لیے تاریخی شہادت موجود ہے کہ یہ صورت (۱۸۱) چینی پرائیمولا اور پرائیمولا ایکونیکا (Primula Obconica) میں بھی

پائی جاتی ہے۔ بڑا پھول یکا یک نمودار ہوا اور چونکہ ان میں سے کوئی بھی نوع کسی باہر کی قسم سے باروری نہیں کرتی اس لیے اس کا امکان نہیں ہے کہ یہ جسامتی عوائل کے کسی دوبارہ اجتماع کا نتیجہ ہو۔ حالیہ کاموں سے معلوم ہوا کہ جسامت میں ایسی زیادتی کسی ایسے عمل کے ذریعہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے کسی خلیہ میں لون جندوں کی تعداد گنی ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے خلیوں کی جسامت اور لودے کے حصے جسامت میں بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن دوسری انواع مثلاً کوفیوڈل ہیں جہاں دو غلبیت زیادہ کامیابی کے ساتھ عمل میں لائی گئی ہے۔ یہ غیر ممکن نہیں ہے کہ اعلیٰ ترین کامیابیاں جو حالیہ باغبانوں نے حاصل کی ہے اکثر ایک ہی لودہ کے اندر متعدد جسامتی عوائل کے ایسے اجتماع کی وجہ سے ہے جو کسی جنگلی یا ابتدائی کاشت کی شکل میں نہیں ملتا۔ اس قسم کی تحقیق کے لیے ڈیفوڈل نہایت بہت افزا پھول ہیں اور باقاعدہ طور پر انجام دیے ہوئے تجربات سے ایسے نتائج حاصل ہونے کی توقع ہے جو سائنس کے نقطہ نظر سے بہت کارآمد ثابت ہوں گے۔



سوطھوال باب

تغیر اور ارتقاء

(۱۸۲) وراثت کے حقائق کے توسط سے ہمیں فرد کا ایک نیا تخیل حاصل ہوا۔ اب تک ہم خرگوشوں کے ایک ایسے خاندان کے افراد کے مابین تمیز کرتے تھے جیسا کہ تختی I میں بتایا گیا ہے۔ ہر ایک کے لیے ایک انفرادیت تصور کر کے اور چند بیرونی سیرتوں کی مدد سے مثلاً جلدی رنگ یا نشانات جو بیرونی شناختیں ہمارے خیال کو ظاہر کرنے کے لیے تھیں اور یہ کہ ان مختلف جانوروں کی انفرادیت مختلف تھی۔ علاوہ اس کے ہمارے تخیل اس بارے میں کہ ہر صورت میں کونسی چیز ان کی انفرادیت بناتی ہے تقریباً بالکل مبہم تھا۔ بینڈلی تجزیہ نے ہمیں ایک زیادہ صحیح طریقہ ایسے تغیرات کو جانچنے اور ظاہر کرنے کے لیے فراہم کیا ہے جو ایک اور دوسرے فرد کے مابین پائے جاتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ فرد پر بہ حیثیت کل خیال کریں جس میں ایک ایسی انفرادیت پائی جاتی ہے جو اس کو اپنے دوسرے ساتھیوں سے متمیز کرتی ہے۔ اب ہم اس کو ایک ایسا عضو یہ تصور کرتے ہیں جو ایک ایسے اصول پر

معین اور ایک دوسرے پر پیوستہ سیرتوں سے بنا ہوا ہے جس سے
 زاید اس وقت ہمارا تجزیہ نہیں پہنچا سکتا۔ ہم یہ محسوس کرنے لگے ہیں
 کہ فرد کی ایک معین ساخت ہوتی ہے اور یہ کہ اس ساخت کا انحصار اولاً
 ایسے عوامل کی تعداد اور تغیر پر ہے جو اس فرد کو بنانے والے دونوں
 زواجوں میں موجود تھے اب زیادہ تر انواع بہت زیادہ تغیر ظاہر کرتی
 (۱۸۳) ہیں اور اکثر ایک یہ بڑی تعداد میں کم و بیش نمایاں اقسام کی شکل میں
 پائی جاتی ہیں۔ کس حد تک یہ بڑا تغیر عوامل کی نسبتہ چھوٹی تعداد کی بنا پر
 سمجھا یا جاسکتا ہے جبکہ ممکنہ اشکال کی تعداد کا انحصار ایسے عوامل کی تعداد
 پر ہے جو موجود یا غائب ہو سکتے ہیں؟

سادہ مثال میں جہاں ہم حقیقی اور دیگر حقیقی حالات میں شکل کے لحاظ
 سے تمیز نہیں کی جاسکتی ممکنہ اشکال کی تعداد ۲ ہے جو متعلقہ عوامل کی
 تعداد کے اصناف تک بڑھائی گئی ہے۔ اس طرح جہاں ایک عامل سے
 تعلق ہے صرف $2 = 2$ ممکنہ اشکال ہیں۔ جہاں دس عوامل کا تعلق ہے
 اس لحاظ سے $2^{10} = 1024$ ممکنہ اشکال ہونگی جو ایک دوسرے سے
 زیادہ سے زیادہ دس اور کم از کم ایک سیرت کے لحاظ سے اختلاف
 رکھیں گی۔ جہاں عوامل ایک دوسرے پر تفاعل کرتے ہیں یہ تعداد
 بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اگر دیگر حقیقی شکل مختلف ہو صورت
 میں ہم حقیقی شکل سے مختلف ہو تو ہر ایک عامل سے تین ممکنہ
 اشکال کا تعلق رہے گا۔ ایسے دس عوامل کے لیے افراد کی ممکنہ تعداد
 $3^{10} = 59049$ ہوگی۔ ایسے بیس عوامل کے لیے مختلف افراد کی ممکنہ تعداد
 $3^{20} = 3486784401$ ہوگی۔ ایک نوع میں عوامل کی نسبتہ کم
 تعداد کی موجودگی یا عدم موجودگی اپنے ساتھ انفرادی تغیر کے کشیر
 امکانات رکھتی ہے۔ لیکن ان افراد میں سے ہر ایک کی مکمل اور معین ساخت
 ہوتی ہے جس کا تعین ہر صورت میں بنیڈلی تجزیہ کے معمولی طریقوں کے
 ذریعہ کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ ہر صورت میں تغیر کا انحصار ایسے معین عوامل

کی موجودگی یا عدم موجودگی پر ہے جو ان زواجوں کے اندر پائے جاتے ہیں جن کے ملاپ سے فرد بنتا ہے اور چونکہ یہ عوائل فرد سے تیار شدہ زواجوں میں صاف طور پر جدا ہو کر جاتے ہیں اور وہ تغیرات جن کا انحصار ان پر ہے جو ہندلی اصول کی بالکل مطابقت سے منتقل ہوتے ہیں۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ زواجوں کی بناوٹ نہیں بدلی تو ایسے تغیر کی وراثت کسی ایسی تبدیلی سے متاثر نہیں ہوتی جو تغذیہ یا ماحول کے ان حالات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہو جو زواجوں کو پیدا کر دیا ہے فرد پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

لیکن جیسا کہ سب جانتے ہیں ایک منفرد عضو یہ خواہ وہ پودا ہو یا جانور ان ماحولی حالات کا اثر نمایاں طور پر قبول کرتا ہے جن کے تحت وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ زیادہ خصوصیت کیساتھ وہاں نظر آتا ہے جہاں ایسی سیڑھیں مثلاً جسامت اور وزن کا تعلق رہتا ہے۔ زیادہ دھوپ یا بہتر زمین کی وجہ سے ایک پودے میں نشوونما بہتر ہوتا ہے۔ بہتر تغذیہ ایک زیادہ عمدہ جانور بنا سکتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے ذریعہ ایک زیادہ ذہین آدمی بن سکتا ہے اگرچہ تبدیل شدہ حالات فرد پر ایک راست اثر ڈالتے ہیں پھر بھی ہمیں ایسی کوئی باوثوق شہادت نہیں ملی جو یہ ثابت کرے کہ ایسی تبدیلیوں کا تعلق ایسے زواجوں کی تبدیلیوں کی نوعیت سے ہے جو اس فرد کو تیار کرتا ہے۔ اور بغیر اس کے ایسے تغیرات وراثت کے ذریعہ منتقل نہیں کیے جاسکتے لیکن وہ حالات جو اثر کو پیدا کرتے ہیں ہر متواتر نسل میں ہمیشہ نئے سرے سے ہونے چاہئیں۔ اس لیے ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ دو قسم کے تغیرات موجود ہیں وہ جو عضو کے اندر نوعی عوائل کی موجودگی کی وجہ سے ہیں اور وہ جو اس کے دور زندگی میں ماحول کے راست اثر سے پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے تغیرات تاگہائی تبدیل کے نام سے موسوم ہیں اور ہندلی اسکیم کے مطابق وراثت منتقل ہوتے ہیں۔

(۱۸۵) اور دوسروں کو خفیف تبدیل کہتے ہیں اور فی الوقت یہ فرض کرنے کیلئے کوئی باوثوق وجہ نہیں کہ وہ کبھی بھی وراثتاً منتقل ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس قسم کی مثالیں ملیں گی جن میں کسی فرد کے دوران زندگی میں پیدا کیے ہوئے اثرات اس کی اولاد کو متاثر کرتے ہوئے معلوم ہوں گے۔ لیکن ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وراثت کی وجہ سے ہوں۔ اس طرح سے کہ پودے جن کو غذا ایت خراب ملے اور ناموزوں حالات میں جن کی نمو ہوئی ہو ایسے بیج پیدا کریں جن سے پودے اکیس جو بیج پیدا کریں اور پھر ان سے اگے ہوئے پودے طبعی پودوں کے مقابلہ میں چھوٹے ہوں باوجودیکہ یہ نہایت ہی موزوں حالات کے تحت اگائے گئے ہوں۔ یہ بتانا قدرتی ہے کہ ایسے بیجوں کی چھوٹی جسامت ان حالات کی وجہ سے ہے جن میں کہ ان کے والدین کو اگایا گیا تھا اور بلاشبہ ہم ایسا کہنے میں حق بجانب ہیں۔ پھر بھی ان کا کوئی تعلق وراثت سے نہ ہوگا۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے بیج ایک بھکاری پودا ہے جو اپنی غذا ایت ماں سے حاصل کرتا ہے۔ بچہ کی جسامت پر اثر اس لیے ہوتا ہے کہ خراب غذا ایت حاصل کیے ہوئے پیرکھے نے نوخیز پودے کو ایک خراب تغذیہ فراہم کیا اور یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ پیرکھے کے زواجوں میں تبدیلی اس کے اگانے والے خراب حالات کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اس صورت میں پیرکھانہ صرف زواجوں کا پیدا کرنے والا ہے بلکہ نوخیز پودے کے ماحول کا بھی ایک جز ہے اور اس آخری نوعیت میں وہ بچہ پر اثر ڈالتا ہے جہاں کہیں بھی ہو خواہ وہ پودوں یا پستانیوں میں عضو یہ اپنے ابتدائی مدارج میں ماں پر طفیلی ہوتا ہے اور غذا ایت کی حالت درحقیقت اس پر اثر انداز ہوگی اور اس طرح منتقل شدہ کمزوری یا طاقت بچہ میں پیدا ہوتی ہے۔ ماں اور بچہ میں ایسا تعلق بالکل ہی ماحول کا ہے اور یہ بات کافی یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق

وراثت کے معمولی عمل سے نہیں ہے۔

تغیر کی ان دونوں اقسام کے مابین امتیاز جن کی پیدائش کے وجود اتنے زیادہ مختلف ہیں ارتقاء کے عمل کو زیادہ بہتر طور پر سمجھنے (۱۸۶) میں مدد دیتے ہیں بمقابلہ اُس کے جو اب تک عام طور پر رائج تھے۔ جیسا کہ ڈارون نے بہت زیادہ قبل ہی محسوس کیا تھا کہ ارتقاء کا کوئی بھی نظریہ ہو وہ وراثت اور تغیر کے متعلق پر مبنی ہونا چاہیے۔ ارتقاء چند تغیرات کی بقا اور دوسروں کے اخراج سے ہی عمل میں آتا ہے۔ لیکن ارتقائی تبدیلی میں کار آمد ہونے کے لیے ایک تغیر کو وراثتاً منتقل ہونا چاہیے۔ اور منتقل ہونے کے لیے اُس کی نمایندگی زوجوں میں ہونی ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں یہ صورت ان تغیرات کے لیے ہے جن کو اصطلاح ناگہانی تبدل کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ برخلاف اس کے تغیرات کے ایسے خفیف تبدلوں کی وراثت کے لیے جو فرد پر ماحول کے راست اثر سے پیدا ہوتے ہیں کوئی بھی حتمی شہادت موجود نہیں۔ لہذا کوئی وجہ نہیں کہ ہم ان کے لیے یہ خیال کریں کہ وہ عارضی مستحکم صورتوں کے سلسلہ کے پیدا کرنے میں کوئی حصہ لیتے ہیں اور جس کو ہم ارتقاء کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اپنے موجودہ علم کی روشنی میں ہمیں ناگہانی تبدل کو ارتقاء کی اساس تصور کرنا چاہیے یعنی وہ مواد جس پر طبعی انتخاب کام کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہی ایک صورت تغیر کی ہے جس کی وراثت کی بابت ہی ہمیں کچھ معلومات ہیں۔

یہ ظاہر ہے کہ ارتقاء کے عمل سے متعلق یہ خیالات چند صورتوں میں ان کے متضاد ہیں جو پچھلی نصف صدی میں عام طور پر رائج تھے۔ اس میں یہ تصور تھا کہ ایک حاصل شدہ نمونہ انواع کی نمایندگی کرتا ہے اور اس سے زیادہ تر افراد مختلف سمتوں میں انشعاب کرتے ہیں حالانکہ یہ عموماً نہایت ہی کم ہوتا ہے۔ یہ فرض کیا گیا تھا کہ ہر تغیر کی

(۱۸۷) خواہ وہ کتنا بھی چھوٹا ہو ایک انتخابی اہمیت ہوگی یعنی وہ بچہ تک منتقل ہو سکے گا۔ ان میں سے چند اس کو اپنے اندر بمقابلہ پر رکھے کے کم درجہ میں اور چند زیادہ درجہ میں رکھیں گے۔ اگر تغیر مفید ہو تو وہ جو اس کے کچھ زیادہ مقدار میں حامل ہیں طبعی انتخاب کے فعل کی وجہ سے اپنے ان ساختوں کے مقابلہ میں زیادہ بہتر رہیں گے جن کو یہ مفید تغیر کم ملا ہے یہ خوش قسمت افراد زیادہ تعداد بچوں کی چھوڑیں گے جن میں سے چند میں یہ تغیر خود ان کے مقابلہ میں زیادہ پایا جائے گا اور اس طرح یہ عمل جاری رہے گا۔ عمل افزائش پذیر تھا۔ کسی بہتر جانب ذرا سا تغیر طبعی انتخاب کو اپنا فعل انجام دینے کا موقع دیتا ہے ہر متواتر مثل پر طبعی انتخاب کے مسلسل عمل کی وجہ سے کار آمد تغیر ندرت سے پیدا ہوا اور آخر کار وہ نوعی امتیاز کی حد تک پہنچ گیا۔ ایسی صورت میں اگر تمام اشکال کو اپنے سامنے رکھنا ممکن ہوتا تو یہ ایک ایسے سلسلہ کی صورت میں پائی جاتیں جو بتدریج ایک سرے سے دوسرے تک ملی ہوئی رہتیں۔

اس خیال پر دو مفروضے بنائے گئے ہیں جو وراثت اور تغیر کی نوعیت کے کسی صحیح علم کے موجود نہ ہونے کی صورت میں غیر فطری نہیں ہیں۔ اولاً یہ فرض کیا گیا تھا کہ تغیر ایک مسلسل عمل ہے اور دوسرے یہ کہ کوئی بھی تغیر سچے میں منتقل ہو سکتا ہے۔ ان دونوں مفروضوں باتوں کے لیے سہا گیا ہے کہ غلط ہیں مینڈل کے کام کے احیاء سے قبل ہی ہارڈن نے تغیر کے غیر متسلل کے عام طور پر موجود ہونے کی طرف توجہ دلائی تھی اور اس کے چند سال بعد اس کی توثیق ولندیزی ماہر نباتیات ہیموگووی ورپز نے اپنی نہایت مشہور کتاب — نظریہ ناگہانی تبدیلی (The Mutation Theory) میں کی۔ نئے خیالات اپنا کام پہلے ہی سے کر رہے تھے اور مینڈل کے کام کے احیاء کی وجہ سے انہوں نے (۱۸۸) ایک اجتماعی شکل اختیار کر لی۔ وراثت کے ایک معین علم کی شکل میں

قائم ہو جانے کی وجہ سے ہمیں اپنے خیالات کو تغیر کی نوعیت کے بارے میں تبدیل کرنا پڑا اور ایک حد تک اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ارتقا کے رجحان کو بھی کچھ بدلنا پڑا۔ وراثتی تغیر کا زواجہ کے اندر ایک مخصوص مقام ہے اور اس لیے ہمیں فرد کی جانب نہیں بلکہ زواجہ کو اس عمل کا شروع کرنے والا خیال کرنا چاہیے۔ کہیں یا اپنی پیدائش کے دوران میں وہ عامل داخل یا خارج ہو جاتا ہے جس کے بننے یا خارج ہونے پر نئے تغیر کا انحصار ہے۔ نیا تغیر کیا ایک وجود میں آتا ہے نہ کہ تدریجی اور تقریباً غیر محسوس ابتداء سے یہ مسلسل نہیں بلکہ غیر مسلسل ہے اس لیے کہ اس کی بنیاد چند معین عامل یا عاملوں کی موجودگی یا عدم موجودگی پر ہے یعنی ان زواجوں کے عدم مسلسل پر جن سے وہ نکلے ہیں ایک مرتبہ بننے کے بعد ان کا غیر مسلسل وجود طبعی انتخاب کے اثرات پر منحصر ہے۔ اگر وہ ان کے وجود کی کشش میں مفید ہوں تو طبعی انتخاب تصفیہ کرے گا اور ان کے لیے جو ان کے حال میں ممتنع بلکہ ان کے جن میں یہ موجود نہیں بہتر موقع بقا کا فراہم کرے گا اور ان کو اولاد چھوڑنے کا اہل بنائے گا۔ اگر یہ فرد کے لیے مضرت رساں ہیں تو طبعی انتخاب جلد ہی ان کا اخراج کر دے گا۔ لیکن اگر نیا تغیر مفید اور نہ مضرت رساں ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ قائم نہ رہے۔

اس طریقہ پر ہم اس شکل سے بچتے ہیں جو پرانے خیال میں ملتی ہے۔ اس لیے کہ اس خیال کے تحت کوئی نئی سیرت پیدا نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ نہایت چھوٹے تغیرات طبعی انتخاب کے عمل سے بہت زیادہ تعداد میں جمع ہو جائیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی بھی سیرت جو جانوروں یا پودوں میں پائی جائے اس کے لیے یہ تصور کرنا چاہیے کہ وہ فرد کیلئے کسی طرح مفید ہوگی۔ نہیں تو وہ طبعی انتخاب کے ذریعہ مٹ نہیں پاسکتی۔ (۱۸۹) لیکن ایسی سیرتوں کی کثیر تعداد ملتی ہے جن کے لیے کوئی افادیت بتانا نہایت مشکل ہے اور اس خیال کے حامیوں کے لیے اکثر ان کے

وجود کو سمجھانے میں بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے۔ زیادہ حالیہ خیالات کے تحت اس مشکل سے گریز کیا گیا ہے۔ نئے تغیر کی ابتدا طبی انتخاب کے زیر اثر نہیں ہے اور اگر وہ راست طور پر نقصان پہنچانے والی نہیں ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ قائم نہ رہے۔ اس طریقہ پر ہم مفید مطلب معلوم کرنے کی اس ذمہ داری سے بری ہو جاتے ہیں جو جاندار عضویوں کی نہایت کثیر سیرتوں کے پس پشت ہے۔ اس لیے کہ اب ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ طبعی انتخاب کا فعل انتخاب ہے نہ کہ تخلیق۔ اس کا کوئی واسطہ نئے تغیر کی تیاری سے نہیں ہے۔ اس کا کام صرف یہ تصفیہ کرنا ہے کہ وہ اس کو قائم رکھے یا معدوم کر دے۔

پرانے نخل کے حامیوں نے اکثر اس دلیل سے کام لیا ہے جو توافق کے مطابق سے حاصل ہوئی ہے۔ عموماً جانور اور پودے بہت زیادہ اہلیت ان ماحول سے مطابقت کرنے میں رکھتے ہیں جن میں وہ زندگی بسر کرتے ہیں اور چند صورتوں میں یہ توافق نہایت نمایاں ہوتا ہے۔ یہ خصوصاً اکثر ایسی صورتوں میں نہایت نمایاں ہوتا ہے جن کو حفاظتی رنگ کہتے ہیں جہاں جانور اپنے اطراف و اکناف سے اتنا زیادہ مشابہ ہو جاتا ہے کہ وہ کافی طور پر اپنے نہایت تیز چشم دشمن کو بھی دھوکا دے سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم کو بتایا گیا ہے ایسا مکمل توافق اتفاق اور اچانک پیدا ہونے والی صورتوں کی محض بقا سے بمشکل پیدا ہو سکتا ہے۔ یقیناً کوئی رہبر طاقت موزوں شکل میں انواع کو ڈھالنے میں کارگر رہے۔ یہ حجت پرانی ہے جان رے کے خیال میں یہ رہبر طاقت خالق کی نہایت اعلیٰ عقلمندی ہے حالیہ ڈاروینی خیال رکھنے والوں کے لیے یہ ایسا طبعی انتخاب ہے جو تغیر کے رجحان کو سنبھالتا ہے۔ ورٹل (۱۹۰) فیڈلیٹ کوئی خیال ایسی طاقت کے لیے ظاہر نہیں کرتی۔ وہ زندہ اشکال کے تغیر کو معین فعلیاتی عوامل کی مطابقت سے ظاہر کرتی ہے اور جانوروں اور پودوں کی اشکال کے تعلقات ان عوامل کی زیادہ یا کم تعداد میں

موجودگی کی وجہ سے ہیں جو نئے حوال کے پیدا ہونے یا پہلے سے موجودہ حوال کے تازہ اجتماع کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں نہ کوئی قابل قبول سبب اس مفروضہ کے خلاف ہے کہ مشابہت کی نہایت مخصوص صورتیں مثلاً جیسے کہ پتی کیڑوں کی ہیں ناگہانی تبدیلی کے عمل کے ذریعہ پیدا ہوتی ہوتی ہیں۔ پالتو جانوروں اور پودوں کا تجربہ ظاہر کرتا ہے کہ نہایت نرالی اشکال اچانک طور پر پیدا ہو سکتی اور اپنی افزائش کر سکتی ہیں۔ اگر ایسی صورتیں طبعی حالات کے تحت پیدا ہوں اور اپنے ماحول میں کسی چیز سے مشابہت رکھنے کی وجہ سے ان کو طبعی انتخاب سے مدد ملے تو ہمیں ایک نمایاں مثال حفاظتی توافقی کی حاصل ہوگی۔ اور یہاں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ نمایاں صورتیں جنکی جانب ہماری توجہ عموماً منعطف کرائی جاتی ہے ان موجودہ زندہ اشکال میں سے چند ہی مثالیں ہیں۔

توافقی منظر کے اس مخصوص گروہ کے لیے جس کو مستوریت کے تحت رکھا گیا ہے میتھلیت ایک سادہ تر تو جیہ بمقابلہ اس کے پیش کرتی ہے جو فی الوقت رائج ہے۔ غالباً اس کو زیادہ بہتر طور پر ایک خاص مثال کے ذریعہ سمجھایا جاسکتا ہے۔ افریقہ میں ڈٹائن تسمیوں کی ایک جنس ملتی ہے جس کو امورسلی (Amauris) کہتے ہیں اور اس بات کا کافی ثبوت موجود ہے کہ وہ گروہ جس سے یہ تعلق رکھتی ہیں ایسی خصوصیات رکھتا ہے جس کی وجہ سے اس کے فوری دشمن مثلاً پرند اور بندر اس کے کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اسی خطہ میں جنس (۱۹۱) یوسریلیا (Eurelia) بھی ملتی ہے جس کا تعلق خاندان ہنسیلڈی (Nymphalidae) ہے جو اس سے بالکل ہوا مختلف ہے جس کیلئے ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ ان میں ڈٹائن تسمیوں کی طرح خواہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ یوسریلیا کی مختلف انواع نہایت قریبی مشابہت امورسلی کی ایسی انواع کے ساتھ ظاہر کرتی ہیں جو

ایک ہی نسل میں اُڑتی ہوئی پائی جاتی ہیں اور یہ خیال کیا گیا ہے کہ وہ "مستوریت" کے ذریعہ اپنے سفر سائیکسوں کی نقل کر کے دشمنوں کو دھوکا دیتی اور اس طرح ان کے حملے سے محفوظ رہتی ہیں۔ یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ وہ کونسا طریقہ ہے جس کے ذریعہ یہ ارادہ کی مشابہت عمل میں آتی ہے۔

یوسر بلیا کی انواع میں سے ایک دو مختلف اشکال میں پائی جاتی ہے (تختیہ) جن کو پہلے جداگانہ انواع خیال کیا جاتا تھا اور جن کو یوسر بلیا و ہالبرگی (*E. Wahlbergi*) اور یوسر بلیا میما (*E. mima*) کے نام دیے گئے تھے۔ یہ دونوں اقسام آمورس ڈومینیکنس (*Amauris dominicanus*) اور آمورس ایکیریا (*A. echeria*) سے علی الترتیب مشابہ ہوتی ہیں۔ بحث کی خاطر ہم یہ فرض کریں گے کہ ان میں سے ایک قسم دوسری سے حاصل ہوئی ہے اور یہ کہ آمورس ڈومینیکنس دونوں میں سے زیادہ حالیہ نسل ہے۔ حالیہ ڈاروینی تحلیل کے لحاظ سے آمورس ایکیریا کے چند افراد ایکیریا نمونہ سے بتدریج انشعابی طور پر نکلے اور آخر کار ڈومینیکنس نمونے تک پہنچ گئے۔ حالانکہ یہ صاف طور پر ظاہر نہیں ہوا کہ ایسا کیوں ہونا چاہیے ساتھ ہی ساتھ یوسر بلیا کے وہ نمونے جو آمورس ڈومینیکنس کی جانب تبدیلی کا رجحان رکھتے تھے ایسی جگہوں پر جہاں یہ نوع بمقابلہ آمورس ایکیریا کے تعداد میں زیادہ پائی جاتی تھی وہاں ان کی طبعی انتخاب نے ہمت افزائی کی اور اس کی رہبر طاقت کے تحت و ہالبرگی آخر کار میما سے نکلی۔

برخلاف اس کے بینڈ لی تصورات کے مطابق ڈومینیکنس نمونہ یکا یک ایکیریا نمونہ سے (یا اس کے برخلاف) نکلی اور اسی طرح و ہالبرگی یکا یک میما سے نکلی۔ اگر و ہالبرگی اس جگہ علی جہاں (۱۹۲) آمورس ڈومینیکنس زیادہ عام ہو اور آمورس ایکیریا نایاب



تو اس کی زیادہ کثیر تعداد میں خراب مزہ والی تتلی سے مشابہت اس کو
 میما کے مقابلہ میں زیادہ فوقیت دی گئی اور اس لیے وہ میما کے مقابلہ
 میں زیادہ بہتر طور پر اپنی افزائش کرے گی۔ حالیہ ڈاروینی تخیل کے مطابق
 طبعی انتخاب بتدریج میما کو وہا لبرگی شکل میں اُمور میں ڈومیسکیٹس
 کی موجودگی کی وجہ سے تبدیل کر دیتا ہے۔ مینڈلی خیال کے مطابق طبعی
 انتخاب وہا لبرگی شکل کو اس کے پیدا ہونے کے بعد قائم رکھتا ہے
 ابستوریت کی یہ مثال خاص طور پر دلچسپ ہے اس لیے کہ ہمارے
 پاس تجرباتی شہادت اس بارے میں موجود ہے کہ میما اور وہا لبرگی
 کے مابین تعلق سادہ مینڈلی طرح کا ہے۔ یہاں میما غالب اور وہا لبرگی
 مغلوب صورت ہے۔ یہ دونوں اقسام ایسے خاندانوں میں پائی گئی ہیں
 جو ایک ہی مادہ سے بغیر درمیانی صورتوں کے حاصل ہوئے ہیں اور یہ
 بات کہ دونوں نمایاں طور پر افتراق کرتی ہیں مینڈلی خیال کی موافقت
 میں نہایت اہم شہادت ہے۔ اس خیال کے مطابق اجناس اُمور میں
 اور یوہریلیا کے اندر یکساں قسم کے نمونوں کے عوامل موجود ہیں اور
 ایسے حالات خواہ وہ کچھ بھی ہوں جو پہلی شکل میں ناگہانی تبدیل پیدا
 کرتے ہیں دوسری میں اسی قسم کے ناگہانی تبدیل کی پیدائش کا باعث
 ہوتے ہیں۔ کسی خط میں یوہریلیا کی پیدائش شدہ مختلف اشکال میں سے
 وہ بقاء کی زیادہ سکت رکھتی ہے جو طبعی انتخاب کے عمل کے توسط سے
 نہایت کثیر تعداد میں پائی جانے والی اُمور میں شکل سے مشابہ ہوتی
 ہے۔ مستوری مشابہت ایک حقیقی منظر ہے لیکن طبعی انتخاب ایک قائم
 رکھنے والے کا فعل انجام دیتا ہے نہ کہ بنانے والے عامل کا۔
 یہ یاد دلانا دلچسپی سے خالی نہ ہو گا کہ ابتدائی زمانہ میں ڈاروین کا

(۱۱۹۳)

لے۔ ناظرین کام میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہوا ہے میری کتاب تتلیوں میں مستوریت (Mimicry in Butterflies)
 میں زیادہ مواد مل سکے گا جو کیمبرج یونیورسٹی پریس میں ۱۹۱۵ء میں طبع ہوئی۔

میلان یہ تھا کہ وہ زیادہ اچانک تبدیلی (Sports) کو دینے لگا تھا جو مسلسل اور نہایت چھوٹے تغیرات کے متضاد ہیں اور یہ خیال کرتا تھا کہ وہ فطرت میں نئی اقسام کے بنانے میں کافی اہم حصہ لے سکتی ہیں۔ بہر حال اس نے بعد میں یہ خیال چھوڑ دیا اس لیے کہ اس نے خیال کیا کہ نسبتاً نہایت کم پیدا ہونے والی اچانک تبدیلیاں یا ناگہانی تبدل زیادہ کثیر تعداد میں پائی جاسنے والی طبعی شکل سے ملاپ کے چھا جانے والے اثرات کی وجہ سے تیزی کے ساتھ غائب ہو جائے گی اور اس طرح باوجودیکہ ان کو طبعی انتخاب سے مدد ملے پھر بھی وہ اپنے آپ کو قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتیں۔

بینڈل کے انکشافات نے اس مشکل کو حل کر دیا ہے۔ اس لیے فرض کرو کہ اچانک تبدیلی اختلاف رکھتی ہے طبعی حالت سے ایک عامل کی کمی کی وجہ سے اور اس لیے وہ مغلوب ہے۔ جب اس کا ملاپ طبعی سے کرایا گیا تو یہ بہت غلبہ غائب ہو جاتی ہے حالانکہ درحقیقت اس کی اولاد کے نصف زواجوں میں یہ موجود ہوگی۔ طبعی شکلوں سے مسلسل ملاپ کے ذریعہ نسبتاً ایک چھوٹی تعداد دیگر جفتوں کی آخر کار اس آبادی میں بکھر جائے گی اور جیسے ہی ان میں سے دو ملاپ کریں گے اس وقت مغلوب اچانک تبدیلی ان کے بچوں کے ایک چوتھائی میں نمودار ہوں گے۔

کئی سال گزرے کہ جی۔ ایچ۔ ہارڈی نے اس مضمون سے متعلق ایک تجویزی اشاعت شایع کی۔ ایک مخلوط آبادی جو دیگر جفتی اور دونوں ہم جفتی شکلوں پر مشتمل ہو اس کے ایک ہی عامل کے انتشار کو زیر غور رکھتے ہوئے اس نے بتایا کہ ایسی آبادی اگر اپنی افزائش قدرتی طور پر کرنی ہو تو وہ ان تینوں شکلوں کے لحاظ سے تیزی کیساتھ ایک مستقل حالت میں آجاتی ہے ان میں چاہے ان تینوں اشکال کا تناسب کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ مثلاً ہم فرض کریں کہ یہ آبادی ایک قسم کے ب و گ جفتوں اور دوسری قسم کے ہ و گ جفتوں پر اور ۲ گ و گ جفتوں پر مشتمل ہے۔ ہارڈی نے یہ بتایا کہ اگر دوسری چیزیں

(۱۴۴) مساوی ہوں تو ایسی آبادی اس خاص عامل کے لحاظ سے اس وقت متوازن ہوگی جب کہ حالت کا = پ ر کو پورا کرتی ہے۔ اگر یہ صورت شروع میں ہی پوری ہو تو آبادی توازن میں رہتی ہے۔ اگر شروع میں ہی یہ صورت پوری نہ ہو تو ہارڈی نے بتایا کہ توازن کی حالت ایک نسل کے بعد ہی قائم ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد یہی حالت رہتی ہے۔ ان تینوں جماعتوں کے تناسب جو ضابطہ کا = پ ر کو پورا کرتے ہیں کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں اور وہ آبادیاں جن میں یہ اس نسبت سے موجود تھیں جو ملحقہ جدول میں دکھائی گئی ہے مثلاً بعد نسل مستقل توازن میں رہیں گی:

پ	ک	ر
۱	۲	۱
۱	۲	۲
۱	۶	۹
۱	۸	۱۶
۱	۲۰۰۰	۱۰۰۰۰۰
۱	۲	۱

در اصل تسلیم کر لیا گیا ہے کہ یہ تینوں جماعتیں مساوی طور پر بارور ہیں اور یہ کہ کسی قسم کا انتخاب بمقابلہ دوسری جماعتوں کے کسی ایک جماعت کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ علاوہ اس کے اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خواہ سپریم جفتی غالب کی نیا پیدا کرے یا وہ مغلوب صورتوں کے لیے اشغال کیا جائے۔ ایک آبادی جس میں ایک نہایت چھوٹی نسبت غالب اشکال کی ہو اور ایک ایسی آبادی جس میں جو اتنا ہی تناسب مغلوبوں کا رکھتی ہو یہ دونوں مساوی طور پر قائم ہونگی۔ اصطلاح غالب حیند لحاظ سے غلط ہو سکتی ہے اس لیے کہ ایک غالب سیرت اپنی غالب حالت کی وجہ سے ایک مغلوب صورت کی جگہ قائم نہیں ہو سکتی۔ چھوٹی انہیں

(۱۹۵) انسان میں نیلی آنکھوں پر غالب ہیں مگر یہ فرض کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ جوں جوں سال گزرتے جائیں گے ان جزیروں کی آبادی بتدریج بھری آنکھ والی ہوتی جائے گی۔ بہر حال اگر غالب یا مغلوب کو انتخاب سے مدد ملے تو حالات بدل جاتے ہیں اور یہ بتایا جاسکتا ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک میں کوئی برتری موجود ہو تو وہ تیزی کے ساتھ دوسرے کو نکال دے گی۔ صرف ۵ فیصد انتخابی برتری سے جو اس کے موافق ہو یہ بتایا جاسکتا ہے کہ ایک کیاب اچانک تبدیلی طبعی شکل پر چند ہی ہجرتوں میں قابو حاصل کر لے گی۔ اس طرح ہم اس مشکل کو حل کر لیتے ہیں جو پرانے تحلیل میں موجود تھی اور جو یہ بتاتا تھا کہ اقسام لائنے مسلسل عمل کے ذریعہ حاصل ہوئیں اور یہ عمل میں نہایت لمبے تغیرات کے اجتماع پر مبنی ہے اس نظریہ پر ایک نئی تشکیل کا قیام ایک نہایت لائیا اور شکل کام تھا جس میں ہزاروں نسلیں مشتمل تھیں۔ اس سبب سے حیاتیات داں کافی وقت کی ضرورت محسوس کرتا ہے جو ایک طبیعیات داں دینے میں محسوس کرتا ہے اور اکثر ایسا ہوا ہے کہ زیادہ وقت کے دینے میں کوتاہی کی گئی ہے۔ زیادہ حالیہ خیالات کے بموجب یہ مشکل پیدا ہی نہ ہوئی چاہے اس لیے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایک نئی شکل کی ابتدا اور قیام نسبتاً بہت زیادہ تیز عمل ہو سکتا ہے بمقابلہ اس کے جو اب تک ممکن تصور کیا جاتا تھا۔

اور یہاں چند الفاظ ہارڈی کے قانون کے دلچسپ ضمیمہ نفس منہن سے ہٹ کر کہے جاتے ہیں جو ناموزوں نہ ہوں گے۔ اگر مشاہدے کے ذریعہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم جفتوں کی دونوں جماعتوں میں سے ایک دوسری کے مقابلہ میں کم تعداد میں ہے تو ہم ضابطہ پ = ر = ک کو کم تعداد والی جماعت کو اکائی تصور کر کے سادہ بنا سکتے ہیں۔ اب ہم یہ فرض کریں کہ مغلوب ہم جفتی غالب کے مقابلہ میں کم تعداد میں ہیں (۱۹۶) اس طرح کہ پ = لار جہاں ل = ڈ ہو۔ تب ر = ڈ تو ضابطہ

پ = ر = ک = ہو جاتا ہے لا = ک اور ایک متوازن آبادی کے لیے
دگر خفیتوں کی تعداد (۳ ک) = لا۔ اس طرح جملہ آبادی میں جماعتوں
یعنی ہم خفیتی غالب و دگر خفیتی اور مغلوبوں پر اضافی نسبتوں لا لا لا : ۱ پر
مشتمل ہونگی۔ لہذا اگر ہمیں مغلوبوں کا فیصد مجموعی آبادی میں معلوم ہوتا
ہے آسانی کے ساتھ تینوں جماعتوں کی متعلقہ تعداد کا حساب
لگایا جاسکتا ہے۔

ایک سادہ مثال اس کو سمجھانے میں مدد دے گی۔ مثال کے طور پر امریکہ
میں کمزور و مانع والوں کا تناسب ۱۰ میں ۳ یعنی ۳۳۳ میں ۱
ہے اور آسانی کے لیے یہ فرض کر لیتے کہ یہ حالت طبعی کے مقابلہ
میں سادہ مغلوب ہے۔ اس لیے یہاں

$$۳۳۳ = ۱ + ۳۳۳$$

$$۳۳۳ = (۱ + ۳۳۳)^۲$$

$$۳۳۳ = ۱ + ۳۳۳$$

$$۱۷۲۵ = ۳۳۳$$

$$۳۳۳ = ۳۳۳$$

دوسری طرح اس کو یوں ادا کیا جاسکتا ہے کہ جہاں مغلوبوں کا تناسب
صرف ۳ فیصد ہے وہاں دگر خفیتوں کا تناسب ۱ فیصد کے اوپر
ہوگا۔ دگر خفیتوں کی ظاہرہ بڑی مناسبت جو ایک قائم آبادی میں مغلوبوں
کے ایک نہایت چھوٹے تناسب کے ذریعہ پیدا ہو گئی ہے اس آسانی
خاندانوں میں ایک ایسی خصوصیت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے جو ایک
وقت منہم معلوم ہوتی تھی۔ مثلاً بے لونیت ایک مغلوب کی طرح عمل
کرتی ہے۔ پھر بھی سفید (بے لونی) صورتیں بچوں میں نمودار ہوتی ہیں

جفت کی کافی مناسبت سے ایسی جگہ جہاں دونوں والدین لمبی ہوتے ہیں اور کوئی بقیعہ کی نظر نہیں آتی اور کمزور دماغ والی مثال کے لیے بھی۔ یہی درست ہے۔ ایسے منظر کے سمجھنے میں کم مشکل ہوتی ہے جبکہ یہ خیال کر لیا جائے کہ اگر جفتے مغلوبوں کی تعداد کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہوں گے اور جہاں بھی یہ موجود ہوں گے ان کا تناسب آبادی میں نہایت کم ہوگا۔

(۱۹۷)

ایک آخری سوال ارتقار سے متعلق ہے۔ کس حد تک منیڈلیٹ انواع کے مبداء کے مسئلہ کے لحاظ سے مدد دیتی ہے؟ پودوں اور جانوروں میں جن سے ہمیں سابقہ پڑا ہے ہم یہ بتا چکے ہیں کہ امتیازی فرق جو کبھی نہایت نمایاں ہوتے ہیں رنگ، جسامت اور ساخت میں منیڈلی عوائل کے لحاظ سے بیان کیے جاسکتے ہیں۔ یہ بھی غیر ممکن نہیں کہ متور عوائل میں سے زیادہ تر جن کو درجہ بندی کرنے والا ایک نوع کو دوسری سے جدا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے یا جن کو اکثر نوعی سیرتیں کہتے ہیں ایسی ہی نوعیت کے ہیں۔ یہ موزوں امتیازات کا کام دیتے ہیں لیکن وہ انواع کے تخیل کے لازمی اجزاء نہیں ہیں۔ ایک درجہ بندی کرنے والا جو جنگلی میٹھے مٹر کی تعریف کرے گا وہ اپنی تعریف میں ایسے امتیازات مثلاً رنگنے کی عادت، ڈورے، زبوروں کی شکل پھول کی شکل اور اس کے ارغوانی رنگ کو بیان کرنا نہیں بھولے گا۔ پھر بھی یہ تمام اور دوسری سیرتوں کے لیے ثابت کیا جا چکا ہے کہ ان کا انحصار معین عوائل کی موجودگی پر ہے جو موزوں باروری کے ذریعہ علیحدہ کیے جاسکتے ہیں۔ اس طریقہ پر ہم ایک چند اینچ اونچا چھوٹا پودا اٹکا سکتے ہیں جو اسادہ ہوگا اس پر ڈورے نہیں پائے جائیں گے اس کے زیرے بجائے پیوی ہونے کے گوں ہوں گے اور پھول بد شکل اور بے رنگ ہوں گے جو شکل میں جنگلی پودے کے پھول سے بالکل مختلف ہوں گے۔ ایسا پودا بالکل مثل اصل کے اپنی افزائش کرے گا اور ایک

نباتیات و اں جس کو یہ دیا جائے اگر اس کی اصل سے ناظم ہو تو وہ آسانی کے ساتھ اس کو ایک مختلف ہی جنس سے متعلق کرے گا۔ پھر بھی حالانکہ ساخت کے لحاظ سے وہ اتنا ملتا ہوا ہے۔ ایسے پودے کو نوع لیتھا میو (۱۹۸) اوڈورٹس (Lathyrus Odoratus) سے تعلق رکھنے والا خیال کیا جائے گا۔ اس لیے کہ وہ اب بھی میٹھے مٹر کی کئی مختلف انواع سے باروری کے قابل رہتا ہے۔ وہ ظاہراً امتیاز نہیں ہیں جو ایک نوع اور دوسری نوع کے مابین اہم فرق پیدا کرتے ہیں۔ اہم فرق خواہ وہ کچھ بھی ہو بانجھ پن کے منظر میں پوشیدہ ہے۔ ظاہراً امتیاز وہ ہیں جن سے درجہ بندی کرنے والے نے حیوانی اور نباتی زندگی کی مختلف مثالوں کو نام دینے کا کام لیا ہے اس لیے کہ اس کے پاس کوئی دوسری چیز موجود نہیں۔ لیکن یہ نہ بھولنا چاہیے کہ اکثر یہ گمراہ کن ہوتے ہیں۔ جب تک کہ ان کی باہمی باروری نہیں کرائی گئی یو سربلیا و ہالبرگی اور یو سربلیا میا کو بالکل ہی جداگانہ انواع خیال کیا جاتا تھا اور اس میں کم شبہ ہے کہ اب جن انواع کو جدا خیال کرتے ہیں ان میں سے آخر کار اکثر اسی طرح باطل ہو جائیں گی جیسے ہی کہ ان کو باروری اور افزائش کے اصولوں سے جانچا جائے گا۔ نیتھ لیت نے یہیں یہ محسوس کرنے میں مدد دی ہے کہ نوعی سیڑھیں ایک نوع کے لیے اتفاقی ہو سکتی ہیں یہ کہ اصل جانچ ایک نوع کی بانجھ پن ہے اور یہ کہ خاص قسم کا بانجھ پن جو دو تندرست زواجوں کو ملنے کے بعد ایک جفتہ بنانے سے روکتی ہیں حالانکہ ان میں تولید اور نمو کی طبعی قوتیں موجود ہیں۔ بانجھ پن کی ایسی مثالیں بھی موجود ہیں جو بالکل میکافی ہیں میلا بلس جلاپا (Mirabilis jalapa) کا زیرہ میلا بلس لونگی فلورا (M. Longi flora) کو بارور نہیں کر سکتا اس لیے کہ پہلے کی زیرہ نلیاں دوسرے کے بیجوں تک پہنچنے کے لیے کافی لمبی نہیں ہیں۔ پھر بھی دو غلے جو ابی ملاپ سے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ اسی طرح ہم ایک سینٹ برنارڈ کتے اور پچکانی ٹیریر کے ملاپ

سے بچے حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ مصنوعی باروری عمل میں نہ لائی جائے یا بانجھ پن مر ضیاتی اسباب کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو زواجوں کو تندرست حالت میں ایک دوسرے سے ملاپ کرنے سے روکتے ہیں لیکن زیادہ تر صورتوں میں یہ ممکن ہے کہ بانجھ پن نسبی دوسری وجہ سے ہو۔ یہ بھی نامکن نہیں کہ کیمیائی بناوٹ کے مابین امتیازات ایک نوع کے شجرہ مایہ کو دوسری کے لیے زہریلا بنا دیتے ہیں اور اگر ایسا ہے تو یہ نامکن نہیں کہ ہم کبھی ان امتیازات کو مینڈلی عوائل کی بنا پر ظاہر کر سکیں۔ ایسی صورتوں کی نوعیت ان کو شجرہ باقی تحقیق کے لیے نہایت مشکل بنا دیتی ہے۔ کچھ بھی ہو اب ہم پہلے سے زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ انواع کا مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کو شکلیات کے عمل یا درجہ بندی کے ذریعہ ہی سے حل کیا جاسکے۔ دراصل یہ فعلیات کا ایک مسئلہ ہے۔

حالیہ کام خصوصاً ایسٹ اور آئس کے سائنس دانوں کا نیکوٹینا (Nicotiana) پر یہ ثابت کرتا ہے کہ ایک نوع کے افراد کے مابین بانجھ پن کا انحصار کیمیائی فرق پر ہے جو زیرہ نلی کو کلغی کے اندر تک جانے سے روکتے ہیں اور ان امتیازات کو مینڈلی عوائل کی بنا پر اب ظاہر کرنا ممکن ہے۔ یہ منظر انواع کی نوعیت کے مسئلہ کے اتنا قریب ہے کہ اس کی بابت مزید کام کا بہت زیادہ دلچسپی کے ساتھ انتظار رہے گا۔

مشہور باب

معاشی اہمیت

(۲۰۰) چونکہ وراثت ہی افزائش نسل کرنے والے کے کام کی بنیاد ہے اس لیے یہ ظاہر ہے کہ اس مضمون کا زیادہ صحیح علم اُس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا اور اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ اپنے طریقہ عمل میں بیٹریا علم سے مستفید ہو سکیگا۔ درحقیقت جیسا کہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ ان خیالات کی وجہ سے نہایت نمایاں نتائج حاصل ہوئے ہیں اور نئی اور زیادہ مفید اقسام پیدا ہوئی ہیں۔ اولاً وراثت افراد سے متعلق ہے۔ شکل کی مشابہت کو اتنی یقینی رہبر تو لیدی صفات کا نہیں ہے۔ وہ ایسے افراد جو یکساں طور پر پیدا ہوئے ہوں اور ظاہری شکل میں ایک دوسرے سے تمیز نہ کیے جاسکتے ہوں پھر بھی افزائش کرنے پر وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلاً تختی ۶ پر دکھائے ہوئے میٹھے مٹر کے خاندان کو لو۔ یہاں جب نسل سات جداگانہ تمثیلوں پر مشتمل ہے جن میں سے تین قسمیں اور غوانی ہیں تین بصری اور ایک سفید ہے ہیں یہ فرض کرنا چاہیے کہ ہمارا مقصد ملکی اور غوانی بچوں کی شکل کی ایک

مثل اصل افزائش کرنے والی نسل حاصل کرنا ہے۔ اب اُن تناسب سے جن میں وہ حاصل ہوئے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہلکا رنگ اُس عامل کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہے جو رنگ کو گہرا کرتا ہے۔ لہذا چوٹی دو زیادہ گہرے رنگ سرخ یا ارغوانی کے نہیں خارج کر سکتا۔ لیکن یہ ارغوانی کرنے والے کے لیے دیگر حقیقی ہو سکتا ہے اُس وقت وہ ہلکا سرخ (رنگدار سفید) خارج کر یگا یا وہ دونوں یا اُن میں سے ایک رنگین عامل کے لیے دیگر حقیقی ہو سکتا ہے اور ایسی صورت میں وہ سفید پھول خارج کر یگا۔ لہذا ایسے خاندان میں جو چوٹی ہوں گے اُن میں سے چند سے صرف چوٹی، رنگدار سفید اور سفید حاصل ہوں گے۔ دوسروں سے صرف چوٹی اور سفید اور پھر ان کے علاوہ دوسروں سے جو تعداد میں سب سے کم ہوں گے اُن سے سوائے چوٹی کے دوسرے حاصل نہ ہوں گے۔ نئی قسم پودوں کے کچھ معین تناسب میں پہلے ہی قائم ہو چکی ہے۔ اس خاص مثال میں وہ ہر ۲ میں سے ایک میں ہوگی۔ اب صرف یہ رہ جاتا ہے کہ ان پودوں کو جن لیا جائے۔ چونکہ تمام چوٹی بھساں نظر آتے ہیں خواہ ان کے افزائش نسل کرنے کی اہلیت کچھ بھی ہو اس لیے پودے چنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ایسے کئی پودوں سے فردا بچ حاصل کیے جائیں اور پھر ان سے ایک مزید نسل حاصل کی جائے۔ ان میں سے چند مثل اصل کے افزائش کریں گے۔ تب یہ قسم قائم ہو گئی اور فوراً اس پودے اطمینان کے ساتھ بازار میں فروخت کی جاسکتی ہے کہ وہ اس کے بعد کوئی دوسری اشکال خارج نہیں کرے گی۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جداگانہ افراد کے بیج بچانے کے بعد علیحدہ علیحدہ بوئے جائیں۔ خواہ وہ کتنے ہی مشابہ ہوں مختلف افراد کے بیج کسی صورت میں بھی مخلوط نہ کیے جائیں۔ اگر اس لحاظ سے کافی احتیاط کی جائے تو انتخاب کے لائبے اور دقیق عمل کی ضرورت کسی بھی خاص قسم کے قیام کے لیے باقی نہیں رہتی۔ ہر حکمہ قسم جو ایک غلاب سے حاصل ہوتی ہے وہ جب

(۲۰۱)

نسل میں نمودار ہو جاتی ہے اگر ان کی کافی تعداد آگائی جائے ان تمام مختلف اقسام میں سے ایک خاص تناسب ہر ایک کا پہلے ہی سے قائم ہوتا ہے۔ وراثت کا تعلق افراد سے ہے اور اس بات کا اگر افزائش کرنے والا خیال رکھے تو اس کی کافی محنت بیج جائے گی اور وہ کم سے کم ممکنہ وقت میں اقسام کو قائم کرنے کے قابل ہو جائے گا۔

ایسی صورتیں جیسی کہ یہ مٹھے مٹر کی ہیں افزائش کرنے والے کے تخیل کی ایک دوسری جانب یعنی تمثیل کے خالص ہونے پر روشنی ڈالتی ہیں۔ اب تک "خالص افزائشی" چیز کا اقتیاز خواہ وہ پودہ ہو یا جانور اس کی نسل پر تھا اور اس فرد کو کسی ایک مفروضہ خصوصیت کے لحاظ سے کم و بیش خالص نسل والا خیال کیا جاتا تھا اور اس کا انحصار ان اجداد کے لابے یا چھوٹے سلسلے پر تھا جو اس خصوصیت کے حامل تھے۔ آجکل ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ لازمی نہیں ہے۔ خالص افزائشی یکوٹی ب خاندان میں نمودار ہوتا ہے حالانکہ اس کا پرکھا ایک ارغوانی دورنگا تھا اور اس کے دور کے اجداد کئی نسل سے سفید تھے اسی طرح خالص سیاہ اور سفید خرگوشوں کے باہمی ملاپ سے ہم ب نسل میں ایسے جنگلی اگوٹی رنگ کے جانور ب نسل میں حاصل کر سکتے ہیں جو بالکل تمثیل کی طرح اپنی افزائش کرتے ہیں اسی طرح سے جیسے کہ بالکل خالص نسل کے جنگلی خرگوش کرتے ہیں۔ خالص افزائشی چیز کی اصل جانچ اس کی وراثت پر نہیں بلکہ ان زواجوں کی نوعیت پر ہے جن سے وہ بنی ہے۔ جب بھی دو یکساں طور پر بنے ہوئے زواجے ملاپ کرتے ہیں تو ان والدین کی نوعیت خواہ کچھ بھی ہو جن سے وہ تیار ہوئے ہیں تیار ہونے والا فرد ہر لحاظ سے ہم جفتی ہوگا اور لہذا مثل اصل کے اس کو اپنی افزائش کرنی چاہیے۔ خالص ہونے کی حالت کا تقصیفہ کرنے میں ہمیں آئندہ زواج پر توجہ کرنی چاہیے نہ کہ وراثت پر۔ افزائش کرنے والے کے طریقہ عمل کا بہت دور اصل نسل کو بہتر

بنانا ہے۔ اس کا مقصد کسی ایک ایسی قسم کا حاصل کرنا ہے جس میں کارآمد خصوصیات کی زیادہ سے زیادہ تعداد اور ناکارہ خصوصیات کم سے کم تعداد میں ہیں۔ عمدہ خصوصیت اس کو ایک قسم سے یعنی چاہیے اور دوسری سے ایک اور پھر تیسری سے ایک اور ساتھ ہی ساتھ تمام ان کمزور خصوصیات کو نظر انداز کرنا چاہیے جو ان مختلف اقسام میں موجود تھیں۔ (۲۰۳)

یہ ظاہر ہے کہ سیرتوں کا نیتھلیٹیکل تحلیل جس کا انحصار ایسے معین عوامل پر ہے جو ایک خاص نظام کے ذریعہ منتقل ہوتے ہیں انسان کے لیے نہایت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ جب ان عوامل کا تعین کر لیا جائے تو ان کا انتشار قابو میں رکھا جاسکتا ہے۔ اور یہ افزائش کرنے والے کی مرضی کے مطابق آپس میں ملائے یا ایک دوسرے سے جدا کیے جاسکتے ہیں۔ جو کچھ تھوڑی محنت و درکار ہے وہ ان عوامل کے تعین کے لیے ضروری ہے جن پر مختلف سیرتوں کا انحصار ہے۔ اس لیے کہ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ایک سیرت جو سادہ معلوم ہوتی ہے تجزیہ کرنے پر بیک وقت کئی نمایاں عوامل کی موجودگی پر مبنی نظر آتی ہے۔ اس طرح ملایا مرغی اخروٹ یہ کلنی کے ساتھ مثل اصل افزائش کرتی ہے جیسے کہ لینگھارن ساوہ کلنی کے ساتھ عمل کرتی ہے اور جب خالص نسلوں کا ملاپ کرایا جائے تو تمام چورے اخروٹ یہ کلنی رکھتے ہیں۔ پہلی نظر میں یہ غیر ممکن نہ ہوگا کہ اس فرق کو ایک ہی عامل کی موجودگی یا عدم موجودگی پر منحصر خیال کیا جائے۔ پھر بھی جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں دو دوسرے نسلوں کی کلنی یعنی مٹریہ اور گلاپیہ جب نسل میں نمودار ہوتی ہے۔ تجزیہ ظاہر کرتا ہے کہ اخروٹ یہ اور ساوہ کلنی کے مابین فرق دو عوامل کا فرق ہے اور جب تک کہ اس کا تعین نہ ہو جائے ہم تعین کے ساتھ اخروٹ یہ سیرت کو ساوہ کلنی والی نسل میں منتقل نہیں کر سکتے۔ علاوہ ازیں اپنے تجزیہ کے عمل میں افزائش نسل کر نیوالے کو مختلف ایسے مظاہر سے دوچار ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے جن کو


ہم نے عوائل کے تفاعل اور رابطے کی سرخیوں کے تحت بیان کیا ہے اور ان مظاہر کا امتیاز لازمی طور پر اس کے طریقہ عمل پر اثر انداز ہوگا۔ یا پھر تجربات یہ ظاہر کریں کہ ایک سیرت جس کا وہ خواہشمند (۲۰۴) ہے اندیشی مرغی کے نیلے رنگ کی طرح ایسے فرد کی دیگر حقیقی نوعیت پر منحصر ہے جو اس کو ظاہر کرتا ہے اور اگر ایسی صورت ہو تو وہ عقلمندی کرے گا کہ اس کو قائم کرنے کی بیکار کوشش سے گریز کرے۔ اگر یہ لازمی ہو تو اس کو پھر سے ہر نسل میں بنالیا جائے اور وہ یہ تمیز کرے گا کہ اس کو کرنے کا نہایت سستا طریقہ یہ ہے کہ دو خالص نسلوں کو اس طرح ملا یا جائے کہ تمام بچوں میں حسب مرضی سیرت موجود ہو۔ تجربہ کی محنت اکثر پیچیدہ اور دقیق مسئلہ ہے۔ لیکن ایک مرتبہ کرنے کے بعد وہ آئندہ کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ جوں ہی ان مختلف عوائل کا تعین ہو جاتا ہے جن پر کسی فرد کی مختلف سیرتوں کا انحصار ہے اور جیسے ہی استعمال کیے جانے والے مواد کا صحیح طور پر تجربہ کر لیا گیا تو ضروری مجموعوں کی پیدائش اور ان کو ثبت کرنا بالکل سادہ ہو جاتے ہیں۔

مندیٹ اصولوں کو عملی طور پر استعمال کرنے کی ایک نہایت عمدہ مثال ان تجربات کے ذریعہ فراہم ہوتی ہے جو سمرو لینڈ یقین اور اس کے ساتھیوں نے کیمرج میں کیے ہیں۔ مجموعی حیثیت سے انگلستان کے گیموں اپنے اگنے کی صلاحیت کے لحاظ سے بیرونی پودوں کے مقابلے میں کافی اچھے ہیں۔ برخلاف اس کے ان میں دو اہم نقص ہیں وہ پھونڈی (Fungus) کے حلوں سے متاثر ہو کر بیماری پیدا کر لیتے ہیں اور ان کی روئی اچھی نہیں پکتی۔ یہ آخری خصوصیت گلوٹن کی مقدار کی موجودگی پر منحصر ہے اور یہ اس کے نسبت زیادہ تناسب کی وجہ سے کہ وہ بیرونی "سخت" گیہوں کے لیے ایک ایسی خوبی فراہم کرتی ہے جس کے باعث روئی تنور میں جانے کے بعد چھو لتی ہے۔ ایک زمانہ تک یہ تسلیم کیا جاتا تھا کہ زیادہ گلوٹن رکھنے والا "سخت" گیہوں انگلستان (۲۰۵)

کی آب و ہوا میں نہیں اگایا جاسکتا اور درحقیقت زیادہ تر سخت اقسام جو امتحان کے لیے درآمد کی گئیں نہایت ہی تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کمزور ہو گئیں۔ پروفیسر بفرن نے ایسے سخت گیہوں حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی جس نے انگلستان میں اگنے کے بعد اپنی خوبیاں برقرار رکھیں مگر باوجودیکہ نانباتی کے نقطہ خیال سے اس کا دانہ بہتر خوبی رکھتا تھا پھر بھی اس کی پیداوار نہایت کم تھی اور وہ انگلستان کے گیہوں کے مقابلہ میں اگانے کے لیے سودمند نہیں تھا دوسری بات یہ تھی کہ وہ پھیپھوندی کی بیماری سے بھی محفوظ نہ تھا۔ پروفیسر بفرن نے جو کئی اقسام جمع کیں اور مشاہدہ کے لیے اگائیں ان میں سے اس نے ایک ایسی قسم حاصل کی جو پھیپھوندی کے اثر سے محفوظ تھی حالانکہ دوسری خصوصیات کے لحاظ سے اس میں کوئی ایسی خوبی موجود نہ تھی جس کی وجہ سے اس کو بہتر خیال کیا جاتا۔ اب تحقیقات کے ایک نہایت عمدہ سلسلے کے نتیجے کے طور پر وہ یہ بتا سکا کہ زیادہ پیداوار کی صلاحیت ”دانے کی سختی“ اور پھیپھوندی سے حفاظت ایسی باتیں ہیں جن کو بینڈلی عوائل کی روشنی میں بیان کیا جاسکتا ہے۔ اپنے زیر تجربہ مواد کا تجزیہ کرنے کے بعد بقیہ عمل مقابلہ سادہ تھا اور چند سال میں وہ گیہوں کی ایک ایسی قسم تیار کرنے کے قابل ہو سکا جس میں انگلستان کے بہترین گیہوں کی زیادہ پیداوار اور بیرونی اقسام کی سختی بیک وقت موجود تھی اور ساتھ ہی ساتھ وہ پھیپھوندی سے بھی محفوظ تھی۔ اس گیہوں کے لیے ثابت ہوا کہ وہ کئی سال تک بغیر کسی تبدیلی کے اپنی خوبیوں کو قائم رکھ سکا اور اس سے حاصل شدہ پودوں کا کافی نمایاں اثر برطانیہ عظمیٰ میں گیہوں اگانے پر پڑ رہا ہے۔

یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ افزائش نسل کرنے والا بجائے بڑے اور زیادہ اہم انبیازات کے اکثر چھوٹوں سے سروکار رکھتا ہے۔ اسے اس کی کچھ زیادہ پروا نہیں کہ مٹر کے پھول کا رنگ ارغوانی یا سفید ہے۔

(۲۰۶) لیکن یہ بات قابل لحاظ ہے کہ پودا معمولی بیجوں سے بڑے یا تعداد میں زیادہ پیدا کرتا ہے۔ ایک چھوٹے سے فرق کا بھی جبکہ فصل کے ساتھ اضافہ کیا جائے تو کافی فرق منافع میں ہو جائے گا۔ بیج بچنے والوں اور دوسروں کا یہ عام تجربہ ہے کہ ایسی نوعیت کے فرق پر نسل میں احتیاط سے ساتھ انتخاب کے عمل سے ایک خاص حد تک ترقی دے کر پہنچائے جاسکتے ہیں۔ پہلی نظر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسے نہایت چھوٹے تغیرات کے تدریجی اجتماع سے کچھ مشابہ کوئی چیز ہے جو انتخابی عمل کے



انفرادی بیجوں کا وزن


شکل نمبر ۱

انتخاب کے اثر کو ظاہر کرنے کے لیے اخٹا

مسلل اثر سے پیدا ہوتے ہیں۔ کوہن ہیگن کے پروفیسر جوہانسن کے چند حالیہ تجربات نے اس معاملہ پر دوسرے طریقہ سے روشنی ڈالی ہے۔ اس کی ایک تحقیق کا تعلق سیم کے وزن کی وراثت سے ہے لیکن چونکہ ان تجربات کو بیان کرنے میں ہمیں کافی تفصیل میں جانا پڑیگا اس لیے ہم ایک فرضی مثال ان بیجوں کی نوعیت کو سمجھانے کے لیے لے سکتے ہیں۔

(۲۰۷) جن پر وہ پہنچا۔ اگر ہم بچوں کی تعداد کو پودوں کے کسی ایک گروہ سے اسی طرح جمع کریں جیسے کہ جو ہالشن نے بیج کے لیے کیا تھا تو معلوم ہوگا کہ وہ حسامت میں بہت زیادہ متخیر ہوں گے۔ ان میں سے زیادہ تر غالباً عام اوسط سے بہت زیادہ ہٹے ہوئے نہیں ہوں گے اور جوں جوں ہم اونچے یا نیچے سرے پر پہنچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بتدریج کمی ان افراد میں وزن کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ہم فرض کریں کہ ہمارے بچوں کا وزن ۴ اور ۲۰ گرین کے درمیان تھا یہ کہ سب میں زیادہ تعداد بچوں کے اوسط وزن یعنی ۱۲ گرین کی تھی اور یہ کہ جوں جوں ایک سرے یعنی ۴ یا ۲۰ کی طرف جاتے ہیں تو تعداد باقاعدہ طور پر کم ہوتی جاتی ہے۔ بچوں کے ایسے مجموعہ کے وزن کا تناسب شکل ۴۴ میں ظاہر کی ہوئی منحنی سے دکھایا جاسکتا ہے۔ اب اگر ہم بونے کے لیے صرف اس بیج کا انتخاب کریں جو ۱۲ گرین سے زائد ہو تو ہم دیکھیں گے کہ بعد کی نسل میں بیج کا اوسط وزن بڑھ گیا اور منحنی کچھ دائیں جانب ہٹ جاتی ہے جیسا کہ شکل ۴۴ میں دکھایا گیا ہے۔ مسلسل انتخاب کے ذریعہ ہم اپنی منحنی کو کچھ اور دائیں جانب شاکتے ہیں یعنی ہم بچوں کے اوسط وزن کو اس وقت تک بڑھا سکتے ہیں جب تک ہم اس حد پر آجائیں جس کے آگے مزید انتخاب کوئی اثر نہ ڈال سکے۔ یہ منظر بہت عرصہ سے معلوم تھا اور عموماً ان تغیرات کو مسلسل نوعیت کا خیال کیا جاتا تھا یعنی یہ کہ وہ تمام اتفاقی تبدیلیاں ایک ہمجنس مادہ میں ہیں اور انتخاب کے لیے یہ تصور کیا جاتا تھا کہ وہ یہ شہادت ہمارا کرتا تھا کہ چھوٹے مسلسل تغیرات اس عمل سے بڑھائے جاسکتے ہیں لیکن جو ہالشن کے نتائج ایک دوسرے مقصد کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہمارا مادہ ہمجنس ہو وہ غالباً کئی ایسی اقسام کا ایک آمیزہ ہے جن میں سے ہر ایک کے اوسط وزن کو ماحول کے متغیر حالات

بدلتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک قسم کو خالص لکیر کہتے ہیں۔
اگر ہم خیال کریں کہ ہمارے تصورہ مثال میں تین ایسی خالص لکیریں
ہیں جن کے وزن علی الترتیب ۱۰، ۱۲، ۱۴ گرین ہیں اور ان میں
سے ہر خالص لکیر کے تغیر کی حد ۱۲ گرین ہے تو ہماری منحنی کی نمائندگی
تین مشتقات سے ہونی چاہیے۔



انفسرادی بیجوں کا وزن

شکل ۴۹

ایک آبادی میں خالص لکیروں کے تخیل کو ظاہر کرنے کے لیے انحناء

۱ جو تغیر کرتا ہے ۴ اور ۱۶ کے درمیان اور اُس کا اوسط ۱۰ ہے
ب " " " " " " ۱۸ " ۶ " " " ایضاً ۱۲
ج " " " " " " ۲۰ " ۸ " " " ایضاً ۱۴
جیسا کہ شکل ۴۹ میں دکھایا گیا ہے۔ ایک بیج جو ۱۲ گرین کا ہو ان میں
سے کسی ایک قسم سے متعلق ہو سکتا ہے۔ وہ ب کا ایک اوسط بیج
یا ا کا نسبتاً بڑا یا ج کا نسبتاً چھوٹا بیج ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ب ہے

تعلق رکھتا ہے تو اس کے بچہ کا اوسط ۲ اگرین ہو گا اگر وہ ۱ سے
تعلق رکھتا ہے تو اس کا اوسط ۰ اگرین اور اگر ج سے متعلق ہے
تو وہ ۴ اگرین اوسط کا ہو گا۔ یکساں وزن کے بیج مختلف نتیجہ ظاہر
کر سکتے ہیں اس لیے کہ وہ مختلف خالص لکیروں کے تغیر ہیں۔ لیکن
خالص لکیر کے اندر کوئی بیج خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا اس لکیر کے لیے
اوسط نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ اس طرح سے ایک بیج لکیر ج کا جو ۲۰ اگرین
وزن ہے تقریباً ایسا ہی نتیجہ دکھائیگا جیسے کہ ایک بیج جو ۰ اگرین
وزن کا ہے۔

اس مشاہدہ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے بڑے بیج کا انتخاب
بعد کی نسل میں اوسط وزن کو بڑھا دیتا ہے۔ ہم زیادہ تعداد ج کی
اور کم ۱ اور ج کی چن رہے ہیں اور جوں جوں یہ عمل دہرایا جاتا
ہے ج کا تناسب بتدریج بڑھتا ہے اور ہم انتخاب کے ظہور کو
دیکھتے ہیں جو مسلسل متغیر ہونے والے سمجھنس ماؤں پر اثر انداز ہو کر
ایک مستقل تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ مختلف خالص
لکیروں کے اوسط وزن کے درمیان وقفہ بمقابلہ ماحولی تبدیلیوں کے
کم ہوتا ہے۔ لیکن کچھ بھی ہو وہ وہاں موجود ہے اور ان خالص لکیروں
کو جدا کرنے اور قائم کرنے کا راز پھر فرو سے جدا گانہ طور پر افزائش نسل
کرنا ہے جب کہ خالص لکیر جدا ہو جاتی ہے تو مزید انتخاب بے ضرورت
ہو جاتا ہے۔

ڈالون کے مشہور کام کی اشاعت کے بعد سے جو اس نے
بار بار وری اور خود بار وری پر کیا تھا یہ عام طور پر
قبول کیا گیا ہے کہ ایک بار وری کا اثر عموماً حالانکہ ہمیشہ نہیں۔ بیج
کے اندر تازہ طاقت داخل کرنا ہے جو غالباً ایسے عوامل کی تعداد
میں غالباً زیادتی کی وجہ سے ہے جن کے لیے تیار ہونے والے افراد
وگر جفتی ہیں مسلسل قریبی باہمی بار وری برخلاف اس کے آخر کار

انحطاط کا باعث ہوتی ہے جیسا کہ خود بارور پودوں میں ہوتا ہے
 حالانکہ کئی نسلوں کے گزرنے کے بعد ہی نمایاں طور پر یہ صورت
 ظاہر ہوتی ہے۔ باغبانوں کی ترکاریوں کی عمدہ اقسام کی نایاب
 خوبی غالباً اس امر پر منحصر ہے کہ وہ ایسے ملاپ سے صرف چند نسل
 پہلے ہی حاصل ہوتی ہیں اور یہ ممکن ہے کہ وہ اکثر پرانی اقسام کو مٹا دیتی
 ہیں اس لیے نہیں کہ وہ حقیقت میں ہی طور پر بہتر ہیں بلکہ پرانی اقسام میں
 مسلسل خود باروری کی وجہ سے بتدریج انحطاط ہو گیا ہے۔ زیادہ تر افزائش نسل
 کرانے والے ملاپ کے ان فائدہ مند نتیجوں سے پوری طرح واقف ہیں
 جن کا تعلق طاقت سے ہے لیکن وہ اکثر ایسا کرنے میں پس و پیش کرتے
 ہیں اس لیے کہ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اصل قسم کو پھر سے حاصل کرنے اور
 قائم کرنے میں نہایت طویل اور وقت طلب عمل کرنا پڑتا ہے حالانکہ اس
 عمل میں اصل قسم پوری طرح غائب نہیں ہو جاتی۔ اس اندیشہ کو منڈلیت
 نے دور کر دیا اور اب ہم جانتے ہیں کہ ان طریقوں پر کام کرنے سے
 تین یا چار نسلوں میں اصل قسم کو مستقل حالت میں ایسی زائد قوت کے
 ساتھ جو ایسے ملاپ سے حاصل ہوتی ہے پھر سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔
 یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جو کہ صرف خود بارور پودوں سے ہی تعلق
 رکھتا ہو۔ ایسے پودے جو غیر صنفی طور پر اپنی افزائش کرتے ہیں ان میں
 سے اکثر میں چند نسلوں کے بعد انحطاط ہونے لگتا ہے اگر ایک صنفی
 نسل داخل نہ کی جائے۔ مثلاً آلو کی نئی اقسام اکثر منڈی میں بھی جاتی ہیں
 اور ان کی نہایت عمدہ خوبیاں اس وقت ان کی پسندیدگی کا باعث
 ہوتی ہیں۔ ان سے بہت زیادہ توقع رکھی جاتی ہے لیکن زمانہ گزرنے
 کے ساتھ ہی ان میں غیر معمولی انحطاط ہوتا ہے اور آخر کار یہ منڈی
 میں آنا بند ہو جاتے ہیں۔ یہ غیر ممکن نہیں ہے کہ یہاں ہمارا تعلق
 ایسی مثال سے ہے جس میں پودے اپنی قوت بصلوں کے ذریعہ
 تولید کی چند غیر صنفی نسلوں کے بعد کھو دیتے ہیں اور وہ اس وقت ہی

دو بارہ حاصل ہو سکتی ہے جب کہ صنعتی نسل کے داخل کرنے سے اس میں نتیجہ پیدا کیا جائے۔ بد قسمتی سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قسم غائب ہو جاتی ہے اس لیے کہ بے قاعدہ طریقہ کی وجہ سے جس میں آلو کی نئی اقسام پھر پیدا ہوتی ہیں یہ ممکن ہے کہ زیادہ تر کاشت کی اقسام پیچیدہ طور پر دیگر جفتی ہوتی ہیں۔ اگر آلو کے پودے کا تجزیہ موشیاری سے کیا جائے اور ان مختلف عوامل کا تعین ہو جائے جن پر اس کے تغیرات کا انحصار ہے تو ہم از سر نو کسی بھی اچھے آلو کو بالکل کھونے کے اندیشہ کے بغیر مسلسل طور پر حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ اب اکثر کیا جاتا ہے۔

مینڈلی اصولوں کا استعمال بجائے جانوروں کے پودوں کے لیے زیادہ فوری طور پر فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اس لیے کہ ان کی بڑی تعداد ایک ہی فرد سے تیزی کے ساتھ اگائی جاسکتی ہے اور خود باروری کی موجودگی کی وجہ سے تجزیہ کا عمل بہت زیادہ سادہ ہو جاتا ہے۔ اس امر کے علاوہ بھی کہ دونوں صنفیں کبھی منتقل کرنے کی اہمیت میں مختلف ہو سکتی ہیں ان کے جدا رہنے کی صورت ان کی خصوصیات کے تجزیہ کو شکل تر بنا دیتی ہے۔ اور چونکہ فرد کی بناوٹ کا تعین اس کے بچہ کی نوعیت اور وصف سے ہوتا ہے اس لیے اس علم کا حاصل کرنا آسان نہیں ہے جہاں بچے جیسا کہ زیادہ تر جانوروں میں ہوتا ہے نسبتاً کم پیدا ہوتے ہیں۔ پھر بھی جیسا کہ کافی طور پر بتایا جا چکا ہے یہاں بھی وہی اصول عاید ہوتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں کہ تجزیہ کا عمل باوجود زیادہ وقت طلب ہونے کے اپنا کام صحیح طور پر کیوں انجام نہ دے ساتھ ہی ساتھ وہ افزائش نسل کرنے والے کو ایک معقول بنیاد جند عام لیکن پیچیدہ مظاہر کے لیے فراہم کرتا ہے۔ مثلاً یہ بات کہ چند سیریں اکثر ایک نسل پھلانگ جاتی ہیں صرف اس وجہ سے ہے کہ غلبیت کا اثر جب میں ہوتا ہے اور مغلوب سیرت بعد کی نسل میں

پھر نمودار ہو جاتی ہے۔ ”چکر گشت“ اور ”اسلافیت“ ایسے مظاہر ہیں جو اب عجیب نہیں رہے بلکہ ان کو مینڈلی اصولوں کے ذریعہ سادہ طریقہ پر سمجھایا جاسکتا ہے جیسا کہ باب ۶ میں بتایا گیا ہے۔ ایک اچانک تبدیلی کا کبھی کبھی ایک متصورہ نسل میں نمودار ہونا ایک مغلوب سیرت کے دوبارہ نمودار ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس طرح (۲۱۲) نہایت اعلیٰ قسم کے بے سینگ موشیوں مثلاً ابراہیم انیس میں بھی کبھی کبھی سینگ والے افراد نمودار ہو جاتے ہیں۔ بے سینگ سیرت بمقابلہ سینگ دار کے غالب ہے اور کبھی کبھی سینگ دار جانور کا پھر سے نمودار ہونا اس وجہ سے ہے کہ بے سینگ موشیوں میں سے چند اس سیرت کے لحاظ سے دیگر حقیقی ہوتے ہیں۔ جب دو ایسے افراد کا ملاپ کرایا جاتا ہے تو امکانات یہ ہیں کہ ہر ۴ میں سے ایک بچہ سینگ دار ہوگا۔ حالانکہ دیگر حقیقی افراد ظاہری شباهت میں خاص غالب جانوروں سے تمیز نہیں کیے جاسکتے مگر وہ افزائشی عمل کے ذریعہ فوراً جدا کیے جاسکتے ہیں۔ اس لیے کہ جب مغلوب سے باروری کرائی جائے (جو اس مثال میں سینگ دار جانور ہیں) تو خالص غالب صرف بے سینگ جانور پیدا کرتا ہے لیکن دیگر حقیقی جانور بے سینگ اور سینگ دار جانور مساوی تعداد میں پیدا کرتا ہے۔ اس خاص مثال میں تمام گائیوں کو سینگ دار میلوں سے بارور کرانے کے بعد غالباً چار گائیں نہ ہو سکے گی۔ اس لیے کہ ہر صورت میں یہ ضروری ہوگا کہ ہر ایک سے کئی بے سینگ بچے حاصل کیے جائیں قبل اس کے کہ وہ کافی وثوق کے ساتھ خالص غالب خیال کیے جاسکیں۔ لیکن اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ کوئی سینگ دار بچہ اچھے سے یہ کافی ہوگا کہ ایسے میل کا استعمال کیا جائے جو اس سیرت کے لیے خالص ہو۔ اس کی جانچ آسانی کے ساتھ اس کو تقریباً ایک درجن گائیوں سے ملانے پر کی جاسکتی ہے۔ اگر کوئی سینگ دار بچہ ان میں سے پیدا نہیں ہوتا تو اس کو

ایک خالص غالب خیال کرنا چاہیے اور اس کے بعد خود اس کی ہی قسم کی گالیوں سے اس کو ملانا چاہیے خواہ وہ سینگ دار ہوں یا بے سینگ ایسی حالت میں یہ یقین رہے گا کہ اس کے تمام پچھڑے بے سینگ ہوں گے۔

(۲۱۳) یا پھر یہ فرض کرو کہ ایک افزائش نسل کرنے والے کے پاس ایک کمیٹ گھوڑی ہے اور وہ یقینی طور پر اس سے سُرنگ بچہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سُرنگ بمقابلہ کمیٹ کے غالب ہے اور یہ کہ اگر ایک ہم جفتی گھوڑا استعمال کیا جائے تو ایک سُرنگ بچہ پیدا ہونا لازمی ہے۔ اس لیے افزائش نسل کرنے والے کو گھوڑے کے انتخاب میں جانور کے گزشتہ شجرہ سے مدد دینی چاہیے اور ایسا جانور پسند کرنا چاہیے جس سے کبھی سوائے سُرنگ کے کوئی دوسرے بچے حاصل نہیں ہوئے خواہ اس کا ملاپ سُرنگ یا کمیٹ گھوڑیوں سے کرایا گیا ہو اس طرح اسے یقین ہوگا کہ ایک سُرنگ بچہ کا جو وہ کمیٹ گھوڑی سے حاصل کر سکے گا لیکن اگر گھوڑے کا گزشتہ شجرہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے کمیٹ پیدا کیے ہیں تو وہ دیگر جفتی ہوگا اور ایک کمیٹ گھوڑی سے اس کے سُرنگ یا کمیٹ بچے حاصل کرنے کے امکانات مساوی ہیں۔ یہ غیر محکم نہیں کہ افزائش نسل کرنے والا اپنے جانوروں کی جانچ کرنے پر رضامند نہ ہو جو ایک مختلف قسم کی نسل سے ملاپ کرنے پر مبنی ہے اس خوف سے کہ اُن کا خالص پن اس طرح سے خراب ہو جائے گا اور یہ کہ پہلے ملاپ کا اثر بعد کی نسلوں میں ظاہر ہوگا مثلاً وہ اپنی بے سینگ گالیوں کو ایک سینگ دار بیل سے ملا کر جانچ کرنے میں پس و پیش کرے اس اندیشہ سے کہ جب بعد میں ان ہی گالیوں کو خود اُن کی نسل کے بے سینگ بیل سے بارور کرایا جائے گا تو سینگ دار پچھڑے پیدا ہوں گے۔ ایک گھوڑے کی قوت کے لیے یہ یقین کہ وہ بعد کی نسلوں پر بھی اپنا اثر ڈالے گی یا بعید پیدایش جیسا کہ

اس کو کہتے ہیں آجکل بھی عام طور پر تسلیم کی جاتی ہے۔ درآنحالیکہ احتیاط کے ساتھ جو تجربات ایک سے زائد بیرون ملک مشاہدہ کرنے والوں نے کیے ہیں ان سے یہ ثابت ہوا کہ ایک بھی باوثوق شہادت اس خیال کی تائید میں نہیں ملتی۔ جب تک ہمارے پاس تجربات پر مبنی کوئی شہادت موجود نہ ہو اور جو دہرائی جاسکتی ہو اس وقت تک ہم آسانی کے ساتھ بعید پیدائش کو وراثت کے ایک عامل کی حیثیت سے نظر انداز کر سکتے ہیں۔

دگر جفتی صورتیں بمقابلہ یودوں کے جانوروں کی افزائش مثل میں زیادہ حصہ لیتی ہیں اس لیے کہ کئی خوبیاں جن کی افزائش مثل کرنے والے کو تلاش رہتی ہے اسی نوعیت کی ہیں۔ ایسی صورت اندسی مرغی کی ہے اور پروفیسر ولشن کے مطابق شارٹھارن کی ابلق بھیڑ کی بھی یہی حالت ہے جو ایک دگر جفتی شکل ہے جو سفید اور سرخ کے ملاپ سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر کناری چڑیوں اور کبوتروں کی چند اقسام کی سرتوں کا انحصار ان کی دگر جفتی نوعیت پر ہے۔ دراصل ایسی اشکال کی کبھی بھی مثل اصل افزائش نہیں کی جاسکتی اور جہاں کئی عوامل کا تعلق ہے وہ آپس میں بارور کرانے اور افزائش کرنے پر مثل اپنے ایک نہایت چھوٹا تناسب بچوں کا پیدا کرتے ہیں۔ بہر حال جو بھی ان کی بناوٹ کا تجزیہ کر کے اس کو مینڈلی عوال کے لحاظ سے بتایا جائیگا تب خالص نسلیں تیار کی جاسکتی ہیں جو آپس میں ملاپ کرنے پر حسب خواہش صرف دگر جفتی قسم کے ہلکے دیں گی۔ شکات جن سے افزائش مثل کرنے والے کا تعلق ہے اکثر نہایت باریک ہوتے ہیں اور یہ سوائے مشاق لوگوں کے دوسروں پر ظاہر نہیں ہوتے۔ ایک محولی ولندیزی اور ایک تیز رفتار خرگوش کے درمیان یا ایک ایسے ہمہ گیر کی نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی کلنی کے درمیان ایک بندی کے لیے یہ فرق زیادہ نمایاں نہیں ہوتے۔

یہ بات کہ منڈلیت سے افزائش کرنے والے کو ان باریک نکات کے پیدا کرنے میں مدد ملے گی یا نہیں فی الوقت مذہب ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹے امتیازات وراثتی ہیں مثلاً وہ جن پر جواہر سن کی خاص لکیروں کے تجربات مبنی ہیں۔ اس صورت میں افزائش کے غوالے کی خواہش ہمت افزا معلوم ہوتی ہے۔ مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تغیرات جن کو وہ پھیلا نا چاہتا ہے خفیف تبدل کی قسم کے ہو سکتے ہیں جن کا انحصار فرد کی ابتدائی زندگی کے حالات پر ہے نہ کہ اُن زواجوں کی بناوٹ پر جن سے وہ بنا ہے۔ اگر صورت ایسی ہے تو وہ وراثت کے علم سے کوئی مدد حاصل نہ کر سکے گا اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی شہادت اس بارے میں نہیں جس سے ہم اس قسم کے تغیرات کے لیے یہ تصور کر سکیں کہ یہ کبھی بھی ثبوت کیے جا کر وراثتی بنائے جاسکتے ہیں۔

اٹھارھواں باب

انسان

انسان میں وراثت سے متعلق حالات کا مقابلہ دوسرے جانوروں کے زیادہ دلچسپی لی جاتی رہی ہے لیکن اس بارے میں ایسی شہادت حاصل کرنا نہایت مشکل ہے جو مکمل اور صحیح ہو۔ یہ نوع ایسی ہے جس میں امتیازی سیرتیں جو ایک فرد کو دوسرے سے جدا کرتی ہیں نہایت کثیر تعداد میں پائی جاتی ہیں بچوں کی تعداد نسبتاً کم ہوتی اور نسلوں میں بہت زیادہ فصل رہتا ہے۔ ان اسباب کی وجہ سے اگر یہ ممکن بھی ہو تو راستہ تجرباتی کام انسان کے بارے میں وقت طلب اور قیمتی ثابت ہوگا۔ بہر حال علاوہ راست طریقہ کے ایک دوسرا بھی موجود ہے جس سے کچھ معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔ یہ ان تمام ممکنہ شہادتوں کو جمع کرنے اور ان کو شجروں کی شکل میں ترتیب دینے پر مشتمل ہے اور تب ان کا ایسی تشلی صورتوں سے مقابلہ کرنا ہے جو جانوروں اور پودوں میں معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اس طریقہ پر انسان میں ایسی کئی سیرتوں کے لیے یہ بتانا ممکن ہو سکا کہ وہ سادہ میٹڈلی وراثت ظاہر کرتی ہیں۔ چونکہ سوائے طبیعوں کے

دوسرے لوگوں نے نہایت کم کام اس بارے میں کیا ہے اس لیے اس کی وراثت سے متعلق اب تک عملاً جو کچھ مواد ملتا ہے زیادہ تر اعضاء کے نقص یا بیماریوں تک ہی محدود ہے۔ اس لیے یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر شیجروں کا جو اب تک حاصل ہوئے ہیں ایسی سیرتوں سے



شکل ۵

طبعی اور کوچک انگشتی مائعہ مقابلہ کے لیے ایک ساتھ دکھائے گئے ہیں

(۲۱۶) تعلق ہے جن کو عموماً غیر معمولی کہتے ہیں ان میں سے چند میں وراثت نمایاں طور پر منڈلی ہے۔ ان میں سے ایک صورت جس پر نہایت تفصیل کے ساتھ کام ہو چکا ہے ایک ایسا نقص ہے جسکو کوچک انگشتیت

کہتے ہیں۔ کو چک انگشتی لوگوں میں پورا جسم بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔
اور انگلیوں اور پیر انگلیوں میں بجائے تین کے صرف دو جوڑی ہوتے
ہیں (دیکھو اشکال ۵۰ اور ۵۱) ڈاکٹر ڈرنکو اٹرنے نہایت احتیاط کیا تھا (۲۱۷)




شکل ۵۱

ایک کو چک انگشتی ہاتھ کا ریڈیو گراف

اس خصوصیت کی وراثت پر کام کیا ہے اور اس نے وہ تمام مواد جمع
کیا جو ایک بڑے خاندان کے افراد میں ملا۔ نتیجہ شجرہ کی شکل میں دکھایا گیا ہے۔
یہ تصور کیا گیا ہے کہ وہ جن کے بچے تھے تمام کی شادی طبعی افراد
سے ہوئی۔ شجرہ کا امتحان کرنے پر یہ امور واضح ہوتے ہیں (۱) کہ تمام
زیر اثر افراد کے والدین میں سے کسی میں یہ خصوصیت موجود تھی۔
(۲) کہ چھوٹی انگلی والوں میں سے کسی فرد کے ایسے بچے پیدا نہیں ہوئے
جن کی انگلیاں چھوٹی تھیں حالانکہ یہ خود ایسے ہی والدین سے پیدا ہوئے

ڈیوڈ ابراہیم کوچک (Brachydactylous) نکستی خاندان کا شجرہ - جن میں یہ خصوصیت موروثی وہ نسلوں سے دکھائے گئے ہیں یا طبی سالاہ و اثر و سلا سے

شکل ۵۲



تھے اور (۳) کہ ایسے خاندانوں میں جہاں دونوں چھوٹی انگلی والے اور طبعی موجود ہوں تو دونوں جماعتوں کی تعداد اوسطاً مساوی ہے۔ (پورے شجرہ میں ایسے خاندانوں کا مجموعہ سینتیس چھوٹی انگلی والے اور پچیس طبعی ہے)۔ یہ ظاہر ہے کہ حالات ایسے ہیں جو ایک سادہ مینڈلی صورت میں پورے ہو جاتے ہیں اور اس شجرہ میں اس کے متضاد کوئی بات نہیں کہ کوچک انگشتیت خواہ وہ کسی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو بہت ابلہ طبعی شکل کے ایک سادہ غالب کی طرح عمل کرتی ہے یعنی اس کا انحصار ایک ایسے عامل پر ہے جو طبعی شکل میں نہیں پایا جاتا (۲۱۸) مغلوب طبعی اس اثر کو منتقل نہیں کر سکتے ان کی وراثت چاہے کچھ بھی ہو۔ ایک دفعہ آزاد ہونے کے بعد وہ ہمیشہ آزاد رہتے ہیں اور دوسرے طبعی افراد سے اس پورے یقین کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں کہ ان کے کسی بچہ میں بھی یہ نقص ظاہر نہ ہوگا۔


شجروں سے جو شہادت حاصل ہوئی ہے اس سے ظاہر ہوا کہ مینڈلی وراثت کی سادہ ترین صورت کئی انسانی نقائص اور بیماریوں میں ظاہر ہوتی ہے جن میں آنکھوں کی قبل شبلی موتیا بند ہتھیلیوں اور تلوؤں کی کھال کا غیر معمولی طور پر موٹا ہونا جیسی کو انتہا سبب اجفان کہتے ہیں اور (جلدی ابھار) ایسی ڈرمولا بلیس بلوسا (Epidermolysis bullosa) ہیں۔ یہ بیماری ایسی ہے جس میں جلد متعدد پھٹنے والی پھنسیوں کی شکل میں ابھر جاتی ہے۔

تمام انسانی شجروں میں سے نہایت دلچسپ ایک ہے جس کو (۲۱۹) حال ہی میں مسٹر ٹلشپ نے ایک ایسے خاندان کے جمع کیے ہوئے مواد سے تیار کیا جس میں رتوند پائی گئی اور جو جنوبی فرانس کے ایک قصبہ میں مانت پیلے کے قریب رہتا تھا۔ رتوند والے لوگوں میں شبیکہ ایسی روشنی کے لیے جس ہوتا ہے جو ایک خاص تیزی سے کم ہوا اور اس لحاظ سے ایسے لوگ دن کی کم روشنی اور چاندنی

میں اندھے رہتے ہیں۔ چونکہ مانت پیلے کی مثال نے کچھ عرصہ تک لوگوں میں دلچسپی پیدا کر دی تھی اس لیے اس کے متعلق مواد غیر معمولی طور پر مکمل ہے۔ شجرہ جین نواگرے سے شروع ہوتا ہے جو ۱۹۳۷ء میں پیدا ہوئی تھی اور رتوند کی بیماری اور وہ فی الوقت ایسے بچوں پر ختم ہوتا ہے جو آجکل صرف چند سال کی عمر کے ہیں جین نواگرے کی ۲۰۰ سے زائد اولاد کی بابت تفصیلات معلوم ہیں۔ دس نسلوں اور تقریباً تین سو سال کے دوران میں اس بیماری نے مثل نینڈلی غالب کے عمل کیا ہے اور اس کی کوئی نشانی نہیں ہے کہ طبعی بصارت کے لوگوں سے عرصہ و راز تک مسلسل شادی نے رتوند میں کوئی کمی پیدا کی ہے۔

علاوہ ایسی مثالوں کے جہاں نینڈلی وراثت کی سادہ صورت ظاہر ہوتی ہے ایسی حالتیں بھی موجود ہیں جن کو سمجھنا زیادہ مشکل ہے۔ ان میں سے چند کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجموعی حیثیت سے یہ خصوصیت اس طرح عمل کرتی ہے جیسے کہ یہ ایک معمولی غالب ہو لیکن یہ کہ مستثنیات پائے جاتے ہیں جن میں یہ بیماری رکھنے والے بچے تندرست والدین سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ غیر ممکن نہیں کہ اس حالت کا انحصار میٹھے مرث کے رنگ کی طرح ایک سے زائد عامل کی موجودگی یا عدم موجودگی پر ہو۔ بہر حال ان صورتوں میں سے کسی کے لیے بھی اتنا کافی مواد موجود نہیں جس کی بنا پر یہ یقینی طور پر بتایا جائے کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں۔ غیر معمولی دلچسپی کی مثالوں کا ایک گروہ وہ ہے جس میں اس بیماری کی موجودگی حالانکہ زیادہ تر ایک ہی صنف تک ہی محدود نہیں ہے اور جہاں تک اب تک معلوم ہوا ہے یہ بارہمونا نر برداشت کرتا ہے۔ رتوند ایسی صورت ہے جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے اور اس کا حل ڈسوفائیلہ ہوتا ہے۔ اس قسم کی وراثت کی دوسری مثالیں نزلیت۔ رتوند (چند شجروں میں) چند چشمی نقابیں اور

عصبی نظام کی کئی بیماریوں میں ملتی ہیں۔ صنف محدود وراثت کی عجیب نوعیت ایسے شجروں سے ظاہر ہوتی ہے جیسا کہ شکل ۵۳ میں دکھایا گیا ہے۔



شکل ۵۳

ایک نرینی خاندان کا شجرہ۔ اثر زدہ (تمام نر) یاہ دکھائے گئے ہیں اور دونوں صنفوں کے طبی افراد سادہ و آسروں سے۔

شاذ صورتوں میں اثر زدہ مادہ ملتی ہے جو ایک اثر زدہ نر اور اثر زدہ مادہ کے ملاپ کا نتیجہ ہے ایسی مادائیں طبی نروں سے ملاپ کرنے پر صرف اثر زدہ بیٹے ہی پیدا کرتی ہیں برعکس ان کے لڑکیاں تمام دیگر جفتی ہونے کی وجہ سے اس سیرت کو منتقل کرنے والی ہیں (دیکھو شکل ۲۰)

حالانکہ انسان سے متعلق شہادت کا زیادہ تر حصہ غیر معمولی یا بیمار کی صورتوں سے سروکار رکھتا ہے لیکن طبی سیرتوں کے شجروں کے فراہم کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ جس آسانی کے ساتھ اس کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے اس لحاظ سے یہ توقع تھی کہ تحقیق کیلئے آنچھ کے رنگ کو پہلے پسند کیا جائے اور ہر سٹ اور دوسروں کے

کام نے یہ صاف طور پر بتایا کہ یہاں ایک مینڈلی عامل کارگر تھا۔
 آنکھیں کئی رنگ کی ہوتی ہیں اور رنگ کا انحصار غنہ کے لون پر
 ہے۔ بعض آنکھوں میں غنہ کی دونوں جانب لون رہتا ہے یعنی اس
 جانب جو شبیکہ کی سمت ہوتی ہے اور اس جانب بھی جو بیرونی
 رخ پائی جاتی ہے۔ دوسری آنکھیں صرف شبیکہ کی جانب ہی لون رکھتی ہیں۔
 اس نوعیت کی شبلی اور صاف بھوری آنکھیں ہیں۔ ان کے علاوہ
 جن کی بیرونی جانب لون رہتا ہے وہ بادامی۔ ہستی یا سبز رنگ کی
 یا ان کی مختلف ہلکی گہری حالتوں میں لون کی مقدار کے مطابق پائی
 جاتی ہیں۔ سفید یا بے لون جانوروں میں لون بالکل نہیں پایا جاتا
 اور جو کچھ چھوٹے دموی اوعیہ بالکل نمایاں رہتے ہیں اس لیے غنہ
 ایک خاص گلابی سرخ حالت اختیار کر لیتا ہے۔ وہ حالت جس میں
 لون غنہ کی بیرونی جانب پایا جاتا ہے اس حالت کے مقابلہ میں
 غالب ہے جس میں لون موجود نہیں ہوتا۔ سبز بھوری یا شبلی آنکھ والوں
 کو آپس میں ملانے پر اگر وہ دگر چھتی ہوں تو مخلوب نیلی آنکھ والے
 حاصل ہوتے ہیں لیکن بھوری قسم کے افراد کی نیلوں سے حاصل کیے ہوئے
 بچوں میں توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ بہر حال نیلوں میں ایسے عوالم
 موجود ہو سکتے ہیں جو بھوری آنکھ کو کچھ بدل سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی
 جس طرح سے کہ پیلا گلابی مائل میٹھے مٹر کا پھول (شکل ۹) کو
 جب ایک موزوں سفید سے ملایا جاتا ہے تو صرف ارغوانی ہی حاصل
 ہوتے ہیں اسی طرح ایک ایسی آنکھ والا جس میں نہایت کم بھورا لون
 موجود ہو جب چند قسم کے نیلوں سے ملایا جائے تو ایسے بچے پیدا
 ہوتے ہیں جن کی آنکھ گہری بھوری رہتی اور اپنے والدین کے
 مقابلہ میں زیادہ گہرے رنگ کی ہوتی ہے۔ نیلا ایسے عامل کو منتقل
 کر سکتا ہے جو بھورے لون کو گہرا کرتا ہے۔ بلاشبہ ایسے دوسرے
 عوالم بھی موجود ہیں جو بھورے رنگ کو بدلتے ہیں لیکن ہم اب تک

رنگ کی مختلف حالتوں کی وراثت کی بابت اتنا نہیں جانتے کہ سوائے اس بیان کے کوئی دوسرا دے سکیں کہ لون کی وراثت غلبہ کی بیرونی جانب (۲۲۲) ایسے عمل کرنی ہے جیسے کہ وہ کسی مینڈلی عامل پر مبنی ہو۔

یہ حقیقت بھی کافی اہمیت رکھتی ہے اس لیے کہ وہ فوراً یہ بتاتی ہے کہ آنکھ کے رنگوں کی درجہ بندی کے موجودہ نظام جن پر چند ماہرین انسانیات اتنا زور دیتے ہیں بالکل ہی فرضی اور غیر اطمینانی اساس پر قائم ہیں۔ رنگ کی شدت آجکل رائج کسوٹی ہے اور عام طور پر آنکھ کے رنگوں کو تدریجی طور پر بڑھتے ہوئے گہرے پن کے لحاظ سے ترتیب دیا جاتا ہے اس طرح سے کہ زرد بھوروں سے شروع کر کے گہرے ترین بادامی رنگ پر ختم کیا جاتا ہے۔ اس نظام کے لحاظ سے ہلکی سبز کوشتی آنکھوں کے درمیان رکھا جاتا ہے۔ لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ گہری بادامی سے نیلی صرف ایک ہی عامل کی عدم موجودگی کی وجہ سے اختلاف رکھتی ہیں برخلاف ان کے ایک نیلی اور سبز کے درمیانی فرق کا انحصار ایک سے زائد عوامل پر ہو سکتا ہے یہ بات بتانا ناممکن ہے کہ کس حد تک آنکھ کا رنگ ایک کارآمد امتیاز کسی قوم کا ہو سکتا ہے لیکن اگر کبھی ایسا ہو سکے تو وہ صرف اس وقت ہی ممکن ہو گا جب کہ جستجو کے بعد مینڈلی تجزیہ ان عوامل کو ظاہر کرے جن پر متعدد اقسام کا انحصار ہے۔

آنکھ کے رنگ پر بحث ایک دوسری قسم کے تصورات کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہ تسلیم کرنا مشکل ہے کہ لونیت کی نمایاں مختلف حالتیں جو ایک ہی نوع کے اندر پائی جاتی ہیں ان عمیق کیمیائی امتیازات سے کوئی تعلق نہیں رکھتیں جو کسی فرد کی سیرت اور رجحان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کیا لونیت کے یہ امتیازات مل جاسکتے اور کسی طور پر فہمی اور طبیعی خصوصیات کے لیے رہنما بن سکتے ہیں؟ لندن میں نیشنل پیچر گیلری میں مشہور آدنی اور عورتوں کو ان کے ان کاموں کے لحاظ سے یکجا رکھا گیا ہے جس میں وہ کامیاب رہے تھے۔ مشاہدہ کرنے والے نے غالباً یہ دیکھا ہو گا کہ

آنچھ کے رنگ کی کسی ایک خاص تمثیل کا میلان بڑے گروہوں میں سے
چند میں غالب پایا جاتا ہے۔ یہ شاید ہی ہوگا کہ سیاہیوں اور ملاحوں
میں سوائے نیلی آنچھ کے کوئی دوسری ملے گی لیکن اداکاروں، واعظوں
اور مقبروں کی آنچھ میں گہرا رنگ عام طور پر پایا جاتا ہے
حالانکہ عام آبادی میں مجموعی طور پر یہ بمقابلہ ملے رنگ کے نہایت
ہی کم ملتا ہے۔ یہ امور صرف کچھ اشارہ دیتے ہیں اور یہ ناممکن نہیں
ہے کہ آئندہ تحقیقات ایک بالکل قریبی تعلق لوئیت کی خصوصیات
اور دماغ کی عجیب حالتوں کے درمیان ظاہر کریں۔
دماغی سیرتوں کی وراثت کا اکثر دیکھنا وقت طلب ہے اس لیے
کہ ایک انسان کے میلان پر ابتدائی ماحول کے اثرات کا اندازہ لگانا
اکثر مشکل ہوتا ہے۔ اس میں کچھ شبہ نہیں کہ قابلیت منتقل ہوتی ہے
اس لیے کہ یہ عام تجربہ سے ثابت ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ قابل خاندانوں
کی متعدد مثالوں کے ذریعہ بھی اس کی موافقت میں ثبوت ملتا ہے
جن پر گالٹن اور دوسرے لوگوں نے کام کیا ہے۔ لیکن جب ہم زیادہ
تحقیق سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے جو منتقل ہوتی ہے تو ہم اس
کو یوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ ایک امتیاز رکھنے والا بیٹا اپنے قابل باپ
کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ کیا یہ کسی خاص ذہنی خوبی کی وراثت کی وجہ
سے ہے یا یہ ایک مثال عام ذہنی قابلیت کی ہے جو ایک ایسے میدان
میں ظاہر ہوتی ہے اس ابتدائی صحبت کی وجہ سے کافی دلکش ہو گیا ہو؟
ہرسٹ نے دراصل چند ایسی حقیقتیں پیش کی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ موسیقی
جس بعض اوقات ایک مطلوب سیرت کی طرح عمل کرتی ہے اور یہ ممکن
ہے کہ کسی ایک صاف اور نمایاں خصوصیت مثلاً ریاضیاتی سیرت کی بابت
تحقیق دلچسپ نتائج ظاہر کرے گی۔

بلاشبہ دماغی سیرتوں کا تجزیہ زیادہ مشکل نہیں ہوگا اور اس کو حل
کرنے کا بہترین طریقہ ان مثالوں کو تلاش کرنا ہے جہاں ان کا تعلق

کسی طبعی سیرت مثلاً لونیت سے ہو۔ اگر اس قسم کا ملاپ حاصل ہو جائے اور لونی عوامل کا تعین ہو سکے تو ظاہر ہے کہ ہمیں کچھ معلومات اُن اکائیوں کی نوعیت کی بابت حاصل کرنی چاہیے جن پر دماغی حالات کا انحصار ہے۔ یہ بھی نہ بھولنا چاہیے کہ دماغی صفات مثلاً تیزی سخاوت تلون وغیرہ ایسی صفات ہیں جن کو ہم روزانہ اُن مختلف دماغوں کی درجہ بندی کرنے میں بطور موزوں اکائیوں کے خیال کرتے ہیں جن سے ہمیں سابقہ پڑتا ہے۔ یہ صفات لازمی طور پر ایسی نہیں ہیں جو وراثتی اکائیوں سے مطابقت کریں۔ موثر دماغی قابلیت زیادہ تر مزاج پر منحصر ہے اور غالباً اس کا انحصار ایسے مختلف افرازوں پر ہے جن کو جسم کی مختلف بافتیں تیار کرتی ہیں۔ یکساں عصبی نظام رکھنے والے جن کے جگر مختلف قسم کے ہوں ایسے افراد بنا سکتے ہیں جن کی ذہنی قابلیت کے بارہ میں نہایت مختلف فیصلے دیے جاسکیں گے۔ دراصل یہ بالکل ناممکن نہیں ہے کہ ایک خاص قسم کی ذہنی قابلیت اپنے اظہار کے لیے عصبی نظام کی ساخت کے اہم فرق پر اتنی زیادہ منحصر نہ ہو جتنی کہ کسی دوسری بافت سے تیار کیے ہوئے ایسے مخصوص زہر پر جو عصبی نظام پر ایک معین طریقہ سے فعل انجام دینے کا باعث ہوتا ہے۔ ہم نے ان امکانات کو صرف اس وجہ سے بیان کیا ہے کہ مسئلہ کثرت زیادہ پیچیدہ ہو جاسکتا ہے۔ حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ذہنی قابلیت وراثتاً منتقل ہوتی ہے لیکن وہ کیا چیز ہے جو منتقل ہوتی ہے کیا وہ ایسے عوامل ہیں جو خود عصبی نظام کی صفت اور ساخت پر حاوی ہیں یا ایسے عوامل جن کا تعلق دوسری بافتوں کے ذریعہ مخصوص زہروں کی تیاری سے ہے یا دونوں یکجا عمل کرتے ہیں۔ یہ بات اب تک طے نہیں ہو سکی۔

(۳۲۵)

آج کل انسان کی وراثت کی بابت نہایت ہی کم علم ہے کہ وہ تھوڑی معلومات بھی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہیں۔ مرد اور عورتوں کی صفات

طبعی اور دماغی ابتداء ان زواجوں کی پوشیدہ خصوصیات پر مبنی ہیں جو ان کو بناتے ہیں۔ خاص حدود کے اندر یہ صفات لچکدار ہیں اور کم و بیش طور پر ان اثرات کی وجہ سے بدل سکتی ہیں جو بڑھتے ہوئے جفتہ پر اثر انداز ہوتی ہیں بشرطیکہ ہمیشہ وہ ضروری اساس موجود ہو جس پر یہ اثرات عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اگر ریاضیاتی خوبی زواجہ کے ذریعہ منتقل ہو تو جفتہ کی تربیت سے کافی فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر اساس موجود نہیں تو کتنی بھی تعلیم کیوں نہ دی جائے وہ جفتہ ایک ریاضیات داں میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک عام تجربہ کی بات ہے۔ یہ فرض کرنے کے لیے بھی کوئی وجہ نہیں کہ ایک ریاضیاتی جفتہ کی اعلیٰ تعلیم ان زواجوں کے ریاضیاتی میلان کو بڑھا سکے گی جو اس کے اندر رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زواجہ کا کوئی تعلق ایسی وراثت سے نہیں رہتا۔ یہ درست ہے کہ ایک قسم کی ترقی دنیا میں ہو رہی ہے اور یہ کہ اس ترقی کا انحصار زیادہ تر تعلیم اور حفظان صحت کی ترقیوں پر ہے۔ آجکل کے لوگ اپنے گرد و پیش کے حالات سے بہتر طریقہ پر منٹ سکتے ہیں بمقابلہ ان کے جو چند ہزار سال قبل موجود تھے۔ اور جوں جوں زمانہ گزرتا جا رہا ہے وہ دنیا کے ان کاروبار کو جن سے ان کا سابقہ ہے زیادہ بہتر طریقہ پر انجام دینے کے قابل ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ فرض کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ تعلیم کے اثرات وراثتی ہیں۔ انسان علم کو اسی طرح جمع کرتا ہے جس طرح سے کہ شہد کی مکھی شہد یا ایک گلہری اخروٹ ذخیرہ کرتی ہے۔ بہر حال انسان کا ذخیرہ زیادہ وسیع و پرامن قسم کا ہے۔ ہر نسل اس کو استعمال کرنے میں چنتی جمع کرتی، اور خارج کرتی اور بعد کی نسل کو زیادہ بہتر اور مکمل حالت میں منتقل کرتی ہے۔ جب ہم ترقی کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذخیرہ بہتر کروایا گیا اور اپنے ماحول پر قابو پانے کے لیے زیادہ فائدہ مند بنادیا گیا ہے۔ بعض اوقات اس جمع کیے ہوئے علم کو ورثہ کہتے ہیں جو ایک نسل

اُس سے حاصل کرتی ہے جو اس سے پہلے چلی گئی۔ یہ کچھ غلط فہمی پر مبنی ہے۔ ایسے علم کی منتقلی حیاتیاتی نقطہ نظر سے وراثت کے ساتھ اس سے زیادہ تعلق نہیں رکھتی جتنا کہ والدین سے بچوں کو ایک تصویر یا خطاب یا ایک جوڑ جوڑوں کی منتقلی سے ہے۔ یہ سب چیزیں حقیقت سے حقیقت کو نوع کی کسی خارجی چیز کی منتقلی سے متعلق ہیں۔ برخلاف اس کے وراثت کا تعلق کسی مخصوص داخلی چیز کی زواجہ سے حقیقت میں اور حقیقت سے زواجہ تک منتقلی سے ہے۔ اس عمل میں زواجہ کا حصہ لینا ایک ایسی کسوٹی ہے جس پر یہ جانچا جاسکتا ہے کہ وراثت کو منسی چیز ہے اور کوئی نہیں۔ تب بہتر حفظان صحت اور بہتر تعلیم حقیقت کے لیے اچھے ہیں اس لیے کہ وہ اس کو اپنی پوشیدہ صفات کو پوری طرح ترقی دینے میں مدد دیتے ہیں۔ لیکن جہاں تک زواجہ کا تعلق ہے یہ صفات بطل و خدو ایسی حالت میں بغیر کسی تبدیلی کے رہتے ہیں اس لیے کہ زواجہ کوئی توجہ اس حقیقت کے ذہنی نمو کی جانب نہیں کرتا جس میں کہ وہ رہتا ہو پھر بھی زواجہ پر ان پوشیدہ خوبیوں کا انحصار ہے جو حقیقت کو اس کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کے قابل بناتی ہیں اور جب تک کہ زواجہ ان کو حقیقت سے حاصل نہ کرے تعلیم کے مفاد بہت کم اہمیت رکھیں گے۔ اگر ہم ایک مستقل بہتری ہی پسند کرتے ہیں جس پر بیرونی حالات کا بالکل ہی اثر نہ ہو یعنی اگر ہم کسی قوم یا نسل کے لیے یہ خواہش کریں کہ وہ زیادہ طاقتور جسم اور دماغ کے لحاظ سے ہو جائے تناسلی طبعی کمزوری اور کمزور ذہنیت کے آواز ہو اور ایسے علم یا تجربوں کو سمجھنے اور ان سے بہتر کام لینے کے قابل بن سکے جو صدیوں کے دوران میں جمع ہوتے ہیں تو ہمیں زواجہ پر توجہ دینی چاہیے۔ تحفظی صلاحیت صرف زواجہ ہی میں ہے اور اس لحاظ سے زواجہ ہی کارآمد ہوگا۔

لوگ عموماً انسانی انواع کو دو قسم کے افراد یعنی نر اور مادہ تصور کرتے ہیں اور یہ ان کے لیے ہی ہے کہ عمرانیات والے اور قانون ساز

اپنے قواعد بناتے ہیں۔ بہر حال یہ ایک نامکمل تصور ہے جو ہم اپنے لیے رکھتے ہیں۔ دراصل ہم چار قسم کے ہیں یعنی نہ جفتے اور مادہ جفتے، بڑے زواجے اور چھوٹے زواجے اور وراثت ایک زنجیر ہے جو ہم کو آبس میں یکجا کرتی ہے۔ اگر ہماری زندگی مارہ پھیلی اور سمندری خارشیت (Sea-urchin) کی طرح ہوتی تو ہم اس کو غالباً زیادہ جلد محسوس کر سکتے۔ اس لیے کہ ان جانوروں کے زواجے آزاد رہتے ہیں اور اپنی شادی سمندر کے پانی میں کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے لحاظ سے یہ مختلف ہے اس لیے کہ ہمارے نصف کو دوسرے نصف میں رہنا یا مرجانا چاہیے طفیلی جو دوسروں پر رہتے ہیں اور اپنے میزبانوں کی غذا ایت پر بہت زیادہ بار ڈالتے ہیں وہ بھی ایک حد تک ان کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں جن کے اندر وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ دوزواجوں کے ملاپ کے وقت ایک دوسرے جفتہ کی سیرت کا تصفیہ ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ ایسے زواجوں کی آبادی کی نوعیت کا بھی جو اس کے اندر اپنا گھر بناتے ہیں۔ ایک مرتبہ ملاپ ہونے کے بعد ناگزیر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہم یعنی جفتوں میں کوئی طاقت اس کو بدلنے کی نہیں۔ ہم زواجوں کے ہاتھ میں ہیں خواہ پوری طرح نہ ہوں۔ اس لیے حالانکہ ہم ان کے طرز عمل پر اثر انداز نہیں ہو سکتے پھر بھی ان کے ملاپ پر اگر ہم چاہیں تو قابو رکھ سکتے ہیں۔ ان کی شادیوں کو ضبط میں اس طرح لاکر کہ صرف پسندیدہ آبس میں ملیں اور غیر پسندیدہ کو جدا رکھا جائے ہم کافی بہتر صورت پیدا کر سکتے ہیں دنیا سے اس غلاظت اور تکلیف کو دور کر کے جو ہمیں ساری کمزوری اور بدی سے وجود میں آتی ہیں۔ لیکن عمل کرنے سے پہلے غالباً سوائے سادہ ترین صورتوں کے ہمیں ان کی بابت بہت زیادہ معلومات حاصل کر لینی چاہئیں فی الوقت ہم دراصل اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے حالانکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ کسی چیز کی بابت مکمل طور پر علم حاصل کرنا وقت اور مواقع کا طالب ہے۔

(۲۲۸)

ایک نہ ایک دن ہم اس کو حاصل کر لیں گے اور یہ دن اتنا قریب تر ہو سکتا ہے جس کو لوگ ممکن خیال نہیں کرتے۔ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے یا نہیں اس کا انحصار بڑی حد تک اس بات پر ہو گا کہ آیا ہم حقیقتوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں گے اور ان چند رسومات اور روایات کو ختم کر دیں گے جن کو ہم اپنی معاشرتی زندگی کی بنیادیں خیال کرتے ہیں۔ نتیجہ کچھ بھی نکلے اس میں ہنایت کم شبہ ہو سکتا ہے کہ تمدن کا مستقبل غالباً مستقبل کا امکان بھی اگر کچھ ہے تو اس امتیاز کے ساتھ مخلوط ہو گیا ہے جو ہم ان کے لیے رکھتے ہیں اور جو خود ہمارے اندر پوشیدہ اور بے ربط حالت میں رہتے ہیں یعنی زواجوں کی تصفیہ کن نسل ہمارے ساتھ اٹل طور پر ان یا بند یوں میں قریب ترین بندھن کے ساتھ گتھی ہوئی ہے جس کو وراثت کہتے ہیں۔

ضمیمہ

(۲۳۹)

چونکہ ناظرین میں سے کچھ غالباً مینڈل کے تجربات کو بطور خود کرنا چاہیں گے اس لیے طریقوں کو جو استعمال کیے جائیں بیان کرنا بیکار نہ ہوگا۔ مٹر کا پھول مع اپنے معیار پنکھڑیوں اور وسطی خیزرانہ کے کافی عام ہیں اور ان کا ذکر یہاں ضروری نہیں ہے۔ زیادہ تر پھولوں کی طرح یہ خشکی مشکل ہے۔ نر اور مادہ دونوں اعضاء ایک ہی پھول کے اندر ہوتے اور خیزرانہ سے ڈھکے رہتے ہیں۔ نر و ان جو تعداد میں دس ہوتے ہیں مادگیں کے گرد ایک دائرہ کی شکل میں ترتیب دیے ہوئے ہوتے ہیں جوں ہی کہ یہ سخت ہو جاتے ہیں پھٹ کر اپنا زیرہ نئے پر چھڑک دیتے ہیں۔ زیرہ بلیاں تب کلنی کے اندر گھسٹی اور نئے میں سے جا کر آخر کار بیضدانوں تک پہنچتی ہیں جو مادگیں کے زیرین حصہ میں رہتے ہیں۔ باروری نہیں عمل میں آتی ہے۔ ہر بیضدان جس تک زیرہ نلی پہنچتی ہے پھوٹتا اور ایک بیج بن جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ملے ہوئے پھول کی پاست جو بیضدانوں کو گھیرے رہتے ہیں بڑے ہو کر پھل بناتے ہیں جب ایسا یعنی باروری کا طبعی طریقہ عمل میں آتا ہے تو پھول کو خود بارور کہتے ہیں۔

ملاحظہ کرنے میں یہ ضروری ہے کہ پودے پر ہی ایسے پھول کے نر اعضاء

(۲۳۰) نکال دیے جائیں جس کو مادہ پیر کھا بنانا مقصود ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک نو خیز پھول کو لینا چاہیے جس میں زردان ابھی پھٹے نہ ہوں۔ خیزرانہ دبی ہوئی ہوتی ہے اور زرد ریشے کو جن پر زردان رہتے ہیں ان کی جڑوں پر سے بار یک چمٹی کے ذریعے علیحدہ کر لینا چاہیے۔ غالباً یہ ضروری ہوگا کہ ایسا کرنے کے لیے خیزرانہ کو تھوڑا بھاڑنا پڑے۔ مادگین کو تب پھر خیزرانہ سے ڈھک دیا جائے اور پھول دوسرے دن تک موم کے کاغذ سے بند کر دیا جائے۔ تب کلنی کو نمایاں کرنے کے بعد اس پر پختہ زیرہ چھڑک دیا جائے جو پودے کے ایسے پھول سے حاصل کیا گیا ہو جس کو نثر پیر کھا ٹھنکا گیا ہو۔ ایسا کرنے کے بعد خیزرانہ کو درست کر دیا جائے اور پھول کو پھر موم کے کاغذ میں بند کر دیا جائے تاکہ وہ بیج کے تیار ہونے تک کیڑوں کی دستبرد سے محفوظ رہے۔ موم کے کاغذ کو باروری کے تقریباً ایک ہفتہ بعد ٹھا دینا چاہیے۔ یہ غالباً کہتیا غیر ضروری نہ ہوگا کہ باروری کے عمل کے دوران میں سختی کے ساتھ حیاتیاتی صفائی کا خیال رہے۔ یہ عمل سے پہلے انگلیوں اور ٹمٹی کو تھوڑی تیز اسپرٹ سے دھونے پر فوراً ہو سکتا ہے اور اس طرح اگر کوئی دوسرے بیرونی زیرہ وانی موجود ہوں تو وہ مر جائیں گے۔

یہ اوپر بیان کیے ہوئے طریقے مٹھے مٹر کے لیے بھی کافی ہیں اگر ان میں یہ تھوڑی تبدیلیاں کر لی جائیں۔ چونکہ اس نوع میں زرد ریشے مقابلہ جلد پختہ ہو جاتے ہیں اس لیے نر اعضا کا اخراج زیادہ ابتدائی درجہ پر کر دینا چاہیے۔ عموماً یہ زیادہ بہتر ہے کہ تین چوتھائی اگی ہوئی کلی کو لیا جائے۔ نر اعضا کے نکالے جانے اور باروری کے مابین وقفہ کچھ زیادہ ہونا چاہیے۔ دو یا تین دن عموماً کافی ہوتے ہیں۔ علاوہ اس سترے مٹھے مٹر پر پتے کاٹنے والی مکھی میگا کائل (Megachile) آتی ہے۔ جو بر خلاف شہد کی مکھی کے خیزرانہ کو دبا کر زیرہ جمع کرتی ہے۔ اگر اس کیڑے کی موجودگی کا شبہ ہو تو یہ مناسب ہوگا کہ بیرونی زیروں کے

اختلاط کے خطے سے حفاظت کی جائے اور وہ اس طرح ہو سکتی ہے کہ
 زیرگی کے لئے ایک ایسے چھول کا انتخاب کیا جائے جو پوری طرح
 نہ گھلا ہو۔ اگر چھول استدادہ نہیں ہوا ہے تو میگا کائل نے اس میں (۲۳۱)
 کوئی خرابی پیدا نہیں کی ہوگی۔ آخر میں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ اکثر
 ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا کٹر امیلی گنتھس (*Meligethes*) پینڈ پکھڑی
 کے اندر پایا جاتا ہے۔ ایسے چھولوں کو ملاپ کے تجربات کرنے میں روک دینا چاہیے۔



اسٹوری

مینڈلیٹ

(۱)

<i>Argynnis paphia</i> ,	۸۸	آسراگٹس پافیا
Free-martin,	۱۰۹	آزا و صنف بچہ
Oxidase,	۶۶	آکسیدیس
Potato,	۲۰۳	آلو
Onslow, H.,	۶۵	آنسلو - اٹیج
Eye-colour, in <i>Drosophila</i> ,	۱۰۲'۹۹'۸۸	آنکھ کا رنگ ڈروسوفائلا میں
in man,	۲۱۵	انسان میں
in rabbits,	۱۶۵	خرگوشوں میں
Albino mice,	۴۲	ابرص چوہے
Albino rabbits,	۴۳	ابرص خرگوش
<i>Abraxas grossulariata</i> ,	۸۵	ابریکسس گر اسیلیٹا
Walnut comb,	۲۸	اخروٹھ کلفی
Evolution,	۱۷۹'۷۷'۸	ارتقا

Sports,	۱۸۶	اسپورٹس
Sturtevant, A. H.,	۱۴۲	اسٹورٹوانٹ، اے۔ ایچ
Staples-Browne, R.,	۵۶	اسٹیلز - براؤن - آر
Ancestral Heredity, Law of.	۱۰	اسلامی وراثت کا قانون
Unit-characters,	۲۶	ایکائی سیرتیں
'Acquired' characters,	۱۱	اقتسابی خواص
Agouti mice,	۴۲	اگوتی جوئے
Agouti rabbits,	۴۳	اگوتی خرگوش
Criss-cross inheritance,	۸۱	الٹ پھیر وراثت
Amauris,	۱۸۳	امورس
Selection,	۱۹۹	انتخاب
Antirrhinums	۱۵۷	انٹروہینم
Andalusian fowls,	۱۹۷، ۱۶۱، ۵۹	اندلسی مرغیاں
Eggs,	۲۰	انڈے
Individuality,	۱۷۵	انفرادیت
Species, nature of,	۱۹۰	انواع کی سیرت
origin of,	۹	کا مبداء
East, E. M.,	۱۹۲	ایسٹ، ای ایم
Population, inheritance of characters in a,	۸۹	ایک آبادی میں سیرت کی وراثت
Amphibia, sex in,	۹۰	امفیپیا میں صنف

(ب)

Fertilisation,	۳	باروری
Reversion,	۲۰۵، ۵۰	پرجشت

in rabbits,	۵۱	خرگوشوں میں
in pigeons,	۵۵	بکوتروں میں
in fowls,	۵۵	مرغیوں میں
in sweet-peas,	۵۳	میٹھے مٹر میں
Sterility,	۱۹۱	بانجھ پن
Bridges, C. B.,	۱۰۶	برجس، سی۔ بی
Breda fowls,	۳۳	بریڈ امرغیاں
Telegony,	۲۰۶	بعید پیدائش
Biffen, R. H.,	۱۹۸، ۱۹، ۶۵	بفن، آر۔ ایچ
Cats,	۹۰	بلیاں
Bateson, W.,	۱۴۵، ۴۶، ۲۴، ۱۳	بیتسن، ڈبلیو

Seeds, nature of,	۳	بجوں کی سیرت
Albinism in man,	۱۸۹	بے لونیت انسانوں میں
Intersexes, in cattle,	۱۰۹	بین صنفیں، مویشیوں میں
in <i>Drosophila</i> ,	۱۰۴	ڈروسو فائیلا میں
in frogs,	۱۱۸	میتھکوں میں
in <i>Lymantria</i> ,	۱۱۰	لائمنٹریا میں

(پ)

Parkinson, J.,	۱۲۹	پارکنسن، جے
Peroxidase,	۶۶	پروآکسائیڈس
Currant moth,	۱۰۴، ۸۶	پروانہ
<i>Protenor</i> , chromosomes in.	۹۷	پروٹینورس میں لون جسد
<i>Primula</i> ,	۱۶۲، ۵۸، ۴۷، ۲۶	پریمولا

<i>Primula obconica</i> ,	۱۷۳	پریمولا آبکونیکا
Plymouth rocks,	۸۴	پلیمٹھ راک
Pellew, C.,	۱۵۵	پلیو، سی
Pin-eye in primulas,	۴۶	پین چشم پریمولا میں
Plants, sex in,	۱۱۹	پودوں میں صنف
Stocks, double,	۱۴۹	پھول، ڈبل
hoariness in,	۴۶	روئیں دار
<i>Papilio polytes</i> ,	۸۶	پاپیلیو پولائیٹس

(ت)

Variation,	۱۲	تغیر
Discontinuity in variation,	۱۳	تغیر میں عدم تسلسل
Purity of type,	۲۰۵، ۱۹۵	تمثیل کا خالص ہونا
Adaptation,	۱۸۲	توافق

(ط)

Hooded sweet-peas,	۱۲۷	ٹوپ دار میٹھے مٹر
--------------------	-----	-------------------

(ج)

Gipsy moth,	۱۱۱	جیپی پروانہ
Segregation,	۱۸	جدائی
Size, inheritance of,	۱۷۱	حسامت کی وراثت
Zygotes, nature of,	۴	جفتوں کی سیرت
Genes,	۱۴۲	جنس
Jungle fowl,	۷۸	جنگلی مرغی

(ج)

(乙)

(خ)

(5)

درمیانی صورتیں، ۱۶۱ Intermediates,

Repulsion between factors,	۱۲۶	دفع عوامل کے درمیان
Heterozygote, definition of,	۲۳	دگر جفتہ کی تعریف
Heterozygous forms,	۶۳	دگر جفتی شکلیں
Mental characters,	۲۱۸	دماغی سیرتیں
Barred plumage in fowls,	۸۴	دھاری دار پر مرغیوں میں

(ط)

Darwin, C.,	۱۸۵۹	ڈارون سی
Drinkwater, H.,	۲۱۱	ڈرنکواٹر ایچ
Drosophila,	۱۴۹	ڈروسوفا ایلا
chromosomes of,	۱۳۵	کے لون جسڈ
eye-colour in,	۱۰۲	میں آنکھ کا رنگ
vestigial wings in,	۱۳۶	میں باقیاتی پر
intersexes in,	۱۰۷	میں بین صنف
body-colour in,	۱۳۶	میں جسمی رنگ
Doncaster, L.,	۱۰۳	ڈنکاسٹر ال
Daffodils,	۱۷۴	ڈیفوڈل
De Vries, H.,	۱۸۰	ڈی وریس ایچ
Davenport, C. B.,	۱۶۹	ڈیونپورٹ سی بی

(س)

Linkage,	۱۳۵	رابطہ
Night-blindness,	۲۱۴	رتوند
Colour, in flowers,	۴۱	رنگ پھولوں میں
Colour-blindness,	۲۱۵	رنگ ناشناسی

Silver and gold, in fowls,	۸۰	روپہلی اور سنہری مرغیوں میں
Fritillary, silver-washed,	۸۸	روپہلی فریٹیلری
Ray, John,	۱۸۲	رے، جان
Silky fowls,	۱۶۱، ۲۵	ریشمیں مرغیاں

(ش)

Toe, extra in poultry,	۶۷	زائد انگلی مرغیوں میں
Yellow mice,	۱۳۷	زرد چوہے
Purity of gametes,	۱۹	زواجوں کا خالص ہونا
Gametes, nature of,	۴	زواجوں کی نوعیت
Pollen,	۱۳۱	زیرہ
in sweet-peas,	۱۳۱	سیٹھے پتھر میں

(س)

Single comb,	۲۷	سادہ کلنی
Horses, bay and chestnut in,	۲۰۶	سرنگ اور کیت گھوڑے
White fowls,	۶۲	سفید مرغیاں
Flax,	۱۵۴	سن
Linum,	۱۵۴	سن
Hamburghs, gold-pencilled,	۱۷۱	سنہری ہیمبورگ
Saunders, E. R.,	۱۵۳، ۱۵۱، ۴۶	سونڈرس، ای۔ آر
Pomace fly, see <i>Drosophila</i> ,		سیب کی مکھی، دیکھو ڈروسوفائلا
Satureia,	۱۵۶	سیٹوریا

Seiler, J.,	۱۱۳	سیلر جے
Beans,	۱۹۹	سیم
Savory,	۱۵۶	سیوری

(ش)

Tschernak, E.,	۲۴	تشرناک ای
Shiwago, P. J.,	۱۰۴	شواگو پی جے

(ص)

Sex, in Amphibia,	۹۰	صنف ایمفیڈیا میں
in man,	۱۰۵	انسان میں
in plants,	۱۱۸	پودوں میں
in fishes,	۹۰	پنچلیوں میں
in poultry,	۸۴	مرغیوں میں
Analysis of types,	۲۰۴	صنف کی تحلیل
Frogs, sex in,	۱۱۸	صنف میںڈ کوں میں

(ط)

Natural selection,	۱۸۰، ۹	طبعی انتخاب
--------------------	--------	-------------

(ع)

Factor, definition of,	۲۶	عامل کی تعریف
Crossing over,	۱۳۹، ۱۴۰	عمل کی ہجائیت
Factors and chromosomes,	۱۳۵	عوامل اور لون جسڈ
Factors, interaction of,	۳۶	عوامل کا باہمی عمل

Fractionation of factors,

۱۶۰، ۱۴۵

عوامل کی کسریت

Coupling of factors,

۱۴۶

عوامل کی مزدوجیت

(غ)

Dominant characters,

۱۶

غالب کردار

(ف)

Fryer, J. C. F.,

۸۶

فرائر جے سی ایف

(ق)

Fixation of varieties,

۱۹۴

قسموں کا قیام

Ring-dove,

۸۵

قمری

Doves,

۸۵

قمریاں

Vigour, increased from cross,

۲۰۳ اضافہ کے ذریعہ

(ک)

Pigeons,

۸۵، ۷۸، ۵۵

کبوتر

Multiple factors,

۱۶۰

کثیر عوامل

Multiple allelomorphs,

۱۴۳

کثیر متبادل اشکال

Chromogen,

۶۶

کروموجن

Cretin sweet-peas,

۱۴۶، ۷۵

کریٹن میٹھے مٹر

Crew, F. A. E.,

۱۱۸

ایف۔ اے۔ ای

Canaries,

۸۵

کاناری

Brachydactyly,

۲۱۰

کوچک انگشتی

Correns, C.,

۱۵۵-۲۴

کورینس، سی

Columba,

Cuenot, L.,

Cupid sweet-peas,

۷۸

۱۳۷۴۲۲

۵۳

لونا

کوئینو، ال
سیوٹ پیٹ میٹھے مر

(گ)

Galton, F.,

Rose comb,

Goldschmidt, R.,

Gairdner, A. E.,

Immunity in wheat,

Wheat, beard in,

experiments with,

۲۱۸۶۰

۲۷

۱۱۳۱۱۳۱۱۱

۱۵۴

۱۹۸

۶۴

۱۹۷۱۷

گالٹن، ایف

گلہبہ کلنی

گولڈ شمٹ، آر

گیرڈنر، اے۔ ای

گیہوں کا تحفظ

گیہوں میں بال

پر تجربات

(ل)

X chromosomes,

Lymantria,

Lychnis,

Lillie, F. R.,

Chromosomes,

in Abraxas,

in man,

in Protenor,

in Drosophila,

in Lychnis,

in fowls,

۹۸

۱۱۰

۱۱۸

۱۰۹

۱۰۳۹۶

۱۰۵

۱۰۵

۹۷

۱۳۴۹۸

۱۱۸

۱۰۴

لا لون جسڈ

لا یمنٹریا

لکینس

لیلی، ایف۔ آر

لون جسڈ

ابراکساس میں

انسان میں

پروٹینوس میں

ڈیرو سو فایلا میں

لکینس میں

مرغیوں میں

Chromosome theory of heredity, ۱۳۰	لون جسدی نظریہ وراثت
Chemistry of pigment, ۶۶	لون کی کیمیا
Lebistes, ۱۰۵	لیبیسٹس
(م)	
Environment, influence of, ۱۴۸	ماحول کا اثر
Morgan, T. H., ۱۳۰, ۱۲۸, ۹۸, ۹۵, ۱۳۳, ۱۳۲	مارگن، ٹی۔ ایچ۔
Y chromosomes, ۹۸	مالون جسد
Inhibitory factors, ۱۶۳, ۸۴, ۶۵, ۶۲	مانع عوامل
Peas, <i>Pisum</i> , ۲۳, ۶	مٹر، پی سیم
Pea comb, ۲۷	مٹریہ کلغی
Fishes, sex in, ۹۰	مچھلیوں میں صنف
<i>Mirabilis</i> , ۱۹۱	میرا بلیس
Combs of fowls, ۳۷, ۲۷	مرغیوں کی کلغیاں
Fowls, barred plumage in, ۸۲	مرغیوں میں دھاری دار پر
origin of domestic, ۷۸	پالتو کی اصل
size in, ۱۴۱	جسامت
extra toes in, ۶۸	زائد انگوٹھا
coloured from whites, ۶۲, ۴۲	سفید اور رنگین کا فرق
silver and gold in, ۸۰	سنبھری اور روپہلی
sex in, ۸۳	صنف
combs in, ۳۷, ۲۷	کلغی
chromosomes in, ۱۰۴	لون جسد
Nucleus, ۹۵	مرکزہ

Mimicry,	۱۸۴	مستوریت
Recessive characters,	۱۶	مغلوب سیرتیں
Muller, H. J.,	۱۴۲	مٹر، ایچ۔ جے
Mulattos,	۱۶۹	میلٹو (دو غلہ بشتی)
Spermatozoa,	۳	منوی حوین
Cattle, horns in,	۲۰۵، ۷۸	مویشیوں میں سینگ
intersexes in,	۱۰۹	بین صنف
Sweet-peas, colour in,	۷۰، ۳۷	میٹھے مٹر میں رنگ
size in,	۵۳	جسامت
linkage in,	۱۲۰	رابطہ
cretin,	۱۲۷، ۷۵	کریٹین
history of,	۷۳	کی تاریخ
Mendel, G.,	۱۸۶، ۲۳، ۱۴، ۶	میںڈل، جی
Ratios, Mendelian—		میںڈلی تناسب
3: 1,	۱۷	۱ : ۳
9: 3: 3: 1,	۲۸، ۲۱	۱ : ۳ : ۳ : ۹
9: 3: 4,	۴۴	۴ : ۳ : ۹
9: 7,	۴۱	۷ : ۹
Sheep, horns in,	۶۸	میںڈھوں میں سینگ

(ن)

Mutation,	۱۷۷	ناگہانی تبدل
Anisogeny,	۱۵۳	ناہم تولید
Protoplasm,	۹۵	سُخڑ مایہ

Hæmophilia,	۲۱۵	نزفی
Presence and Absence theory,	۱۴۳'۲۹	نظریہ حاضر و غائب
Nicotiana,	۱۹۲	نکوٹیا
Nilsson-Ehle, H.,	۱۴۰	نلسن - اہلی، ایچ
Nägeli, C.,	۲۲	نیگلے، سی
Nettleship, E.,	۲۱۳	نیٹلشپ، ای
Blue Andalusian fowls,	۱۶۱'۵۹'۱۹۷	نیلی اندلسی (مرغیاں)

(۹)

Witschi, E.,	۱۱۸	ویتچی، ای
Wood, T. B.,	۶۸	ووڈ، ٹی - بی
Wilson, J.,	۲۰۷	ولسن، جے
Dutch rabbits,	۲۰۷'۱۶۴'۵۱	ولندیزی خرگوش
Weismann, A.,	۱۱	ویزمان، اے

(۱۰)


Hardy, G. H.,	۱۸۸'۱۸۹	ہارڈی، جی - ایچ
Hormones,	۱۰۹	ہارمون
Heterochromia iridis,	۱۶۵	ہتروکرومیا ایریس
Hurst, C. C.,	۲۱۸'۲۱۵'۵۲	ہرسٹ، سی - سی
Lethal factors,	۱۵۳	لٹل فیکٹرز
Himalayan rabbits,	۱۴۴'۵۱	ہمالیا کی خرگوش
Homozygote, definition of,	۲۳	ہوموزیگوت کی تعریف
Homostyle primulas,	۴۷	ہوموسٹائل پرائمولا
Hunter, John,	۱۰۹	ہنٹر، جان
Hieracium,	۱۵۸'۲۲	ہیریشیم (نرل)

(ی)

یوسیلیا

Euralia,

۱۸۳




صحت نامہ

مینڈلیت

صحت	غلط	نہا	صحت	غلط	نہا
چینی سدا بہار	چینی سدا بہار	۱۵	ک	۱۴	۱
گریگری	گریگری	۱۶	ناور	نام	۲
زرد و ہالیائی	زرد و ہالیائی	۴	وضاحت	وضاحت	۶
ہم یہ	ہم یہ	۱۹	دو غلی	دو غلی	۱۵
سوچے	سوچے	۲۰	غالب	غائب	۱۶
(صفحہ ۱۶۲)	(صفحہ ۱۶۲)	۲۴	بارور	بارور	۲۰
پایا	پایا	۳	صفحہ ۱۵۸	صفحہ ۱۵۸	۲۱
پڑانا	پڑانا	۲۵	سفید (۶) ...	سفید (۶) ...	۲۲
انڈا	انڈا	۹	اگوٹی سیاہ ابرص	اگوٹی سیاہ ابرص	۳۸
انڈے	انڈے	۱۸	تب	تب	۳۳
اس کا بنیادی	بنیادی	۱۸	پودوں	پودوں	۳۵
فاریکو فیکس	فاریکو فیکس	۲۰			۳۶

صحیح	غلط	نہا	صحیح	غلط	نہا
بھورے	بھورے	۱۳	۱۶۳	بھورے	۱۳
مشتقات	مشتقات	۱۴	۱۶۳	مشتقات	۱۴
۱۶۲	۱۶۳	حاشیہ	۱۶۴	۱۶۲	حاشیہ
پودے کے	پودے کے	۲۳	۱۶۰	پودے کے	۲۳
کے لیے کیا گیا ہے	کے لیے کیا گیا ہے	۴	۱۶۱	کے لیے کیا گیا ہے	۴
ولندی	ولندی	۲۱	۱۸۰	ولندی	۲۱
کیمرج	کیمرج	۲۱	۱۸۵	کیمرج	۲۱
چ	چ	۲۱	۲۰۱	چ	۲۱
ولسن	ولسن	۱۱	۲۰۶	ولسن	۱۱
ولسن	ولسن	۱۱	۲۰۶	ولسن	۱۱
سیاہ رنگ	سیدہ رنگ	۲۱۲	۲۱۲	سیاہ رنگ	۲۱۲
جو اس ابتدائی صحت	اس ابتدائی صحت	۱۹	۲۱۸	جو اس ابتدائی صحت	۱۹





**ALLAMA
IQBAL LIBRARY**

**UNIVERSITY OF KASHMIR
HELP TO KEEP THIS BOOK
FRESH AND CLEAN**